

Tanino.....	„	5. 00
Alumbre.....	„	10. 00

Buches.

Dr. A. Aceves. Guadalajara.

Contra toda clase de dolor bucal.

Maceración en frío de ruibarbo	gram.	500. 00
Alcohol á 60°.....	„	30. 00
Éter sulfúrico.....	„	4. 00
Esencia de menta....	5 gotas.	

Buches.

Estrecheses.

Dr. E. Lier. México.

Tratamiento electrolytico.

Eupéptico.

Dr. Francisco Álvarez. México.

Sulfato de estriquina	gram.	0. 04
Cuasina.....	„	0. 08
Papaina.....	„	2. 00

Para 20 píldoras.

Una píldora con cada alimento.

Faringitis.

Dr. Pedro Peña. Zamora.

Ioduro de potasio.....	gram.	1. 50
------------------------	-------	-------

Para 3 papeles.

Dosis: uno cada ocho horas en un pozuelo de agua azucarada, tan caliente como se pueda tolerar.

Sus resultados son inmediatos.

Fiebres.

Dr. José B. López.

Campeche.

FIEBRE CATARRAL.

Cocimiento de flores pectorales.	gram.	300. 00
Acetato de amoniaco líquido...	„	6. 00
Alcoholaduro de acónito.....	„	2. 00
Jarabe c. b.		

Cucharadas.

Tres cucharadas cada hora.

Dr. Arcadio F. Ojeda.

Veracruz.

FIEBRE AMARILLA.

Agua.....	gram.	1000. 00
Licor de Van Swieter.....	„	20. 00
Bicarbonato de sosa.....	„	10. 00

Cucharadas.

Tres cucharadas cada hora.

Agua.....	gram.	150. 00
Antifebrina.....	„	1. 00
Jarabe de codeina.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Reyes G. Flores.

Guadalajara.

FIEBRE TIFOIDEA.

Vino rojo doble.....	gram.	500. 00
Jarabe corteza de naranja.....	„	30. 00
Infusión (en frío) de quina.....	„	720. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada hora.

Dr. F. Alvarez. México.

Previo tratamiento de la causa, como medicamento sintomático usa:

Sulfato de estriocina y
Aconitina de c. c. grm. 0. 01
Salicilato de quinina " 1. 00

Para 20 píldoras.

Una cada hora mientras haya calentura.

Dr. José Luna. Autlán.

FIEBRES REMITENTES.

Trata las fiebres remitentes acompañadas de catarro gástrico, no como una manifestación del paludismo, sino como una autrinfección, y los resultados que ha obtenido han sido muy brillantes.

Polvo de ipecacuana grm. 1. 50
Agua hirviendo " 200. 00
Sal de Vichy de 3 á " 4. 00
Jarabe de Melesa " 30. 00

4 tomas.

Una toma cada hora.

Agua saturada de sulfuro de carbono grm. 80. 00
Extracto de ruibarbo " 0. 30
Id. de hojas de sen " 0. 30
Vino rojo " 60. 00
Jarabe " 30. 00

50 gramos cada 2 horas.

Naftol (beta) grm. 1. 50
Aceite de ricino " 15. 00

Calomel. " 0. 10
Solución de goma " 100. 00
Jarabe " 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Fiebre-tifoidea.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe, E. de Zacatecas.

Infusión diaforética grm. 120. 00
Salicilato de sosa de 4. 00 á " 8. 00
Pilocarpina, de 0. 02 á " 0. 05
Jarabe simple " 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

PARA LA HIPERTERMIA.

Antipirina grm. 8. 00
Cafeína " 1. 00

Para 8 obleas Limousin.

Tomar una cada tres horas siempre que el termómetro marque más de 38° 5.

POCIÓN TÓNICA ESTIMULANTE.

Infusión de lúpulo grm. 80. 00
Tintura de quina de 20. 00 á " 30. 00
" " digital " 3. 00
" " nuez vómica " 2. 00
Eter nítrico " 3. 00
Vino cordial del Código
de 80. 00 á " 100. 00
Jarabe simple " 60. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Purgante cuando haya indicación.—Bebida.—Limónada.—Tártrico.—Vinosa—Alimentación.—Leche con cognac.—Jugo de carne y huevos.

Dr. Z. Páramo Rangel. México.

EN LA FORMA ATAXO ADINÁMICA.

Vino de las tres quinas..... grm. 120. 00
Tintura de nuez vómica..... „ 1. 00
Jarabe de tolú..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Fimosis.

Dr. Manuel Uribe. México.

Usa la anestesia local por la cocaína en solución al dos por ciento (el clorhidrato.) Empieza por poner media jeringa para observar la susceptibilidad del enfermo y pone varias inyecciones al rededor del lugar donde deben hacerse las incisiones hasta llegar á cuatro centígramos.

En lo general se forma un ligero edema que se reabsorbe poco á poco y permite operar sin dificultad y sin el menor dolor para el paciente.

El mismo procedimiento se puede emplear para todas las pequeñas operaciones.

Fístulas.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

En las fístulas que han resistido al nitrato de plata y tintura de iodo, han curado sin necesidad de debri-darlas, tratándolas por la glicerina fenicada.

Fotofobia.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

EN LAS OFTALMIAS ESTRUMOSAS.

Agua destilada..... grm. 10. 00
Ácido bórico..... „ 0. 20
Clorhidrato de cocaína..... „ 0. 30

Gotas para los ojos.

Dos gotas cada tres horas.

Tener cuidado de no sustituir el ácido bórico por el borato de sosa; porque esta sal precipita á la de cocaína.

Fracturas conminutas

DE LA TIBIA Y PERONEO CON HERIDA.

Dr. M. F. Ocampo. Pinos. E. de Zacatecas.

Reglas generales.

1ª Volver aséptica la herida en toda su extensión y profundidad, como también la pierna y muslo.

2ª Separar los fragmentos de hueso desprendidos y que se comprenda no puedan vivir á espensas del periostio que los une, procurando no desgarrar los tejidos.

3ª Poner los huesos y tejidos en una situación tan normal como sea posible por medio de suturas.

4ª Dejar libre escurrimiento á los líquidos de la herida por medio de la canalización con tubo de goma antiséptico.

5ª Poner en contacto con las heridas, polvo de iodoformo, protectivo de Lister, gaza iodoformada y maquintosch, todo bien humedecido, con la solución doble antiséptica.

6ª Rodear el miembro un poco más arriba de la rodilla, de un empaque algodónado, el que deberá ser sostenido por un bendaje de Scultet.

7ª Poner un aparato de cuero del Dr. Clement, con la modificación de poner el cuero antes de cortarle, durante dos horas, en la solución doble antiséptica.

SOLUCIÓN DOBLE ANTISÉPTICA.

Bicloruro de mercurio.....	gram.	1. 00
Acido fénico cristalizado.....	„	5. 00
„ tartrico.....	„	4. 00
Alcohol absoluto.....	„	10. 00
Agua hervida.....	„	1000. 00

Esta solución sirve para lavatorios y curaciones.

APARATO DE CUERO DEL DR. CLEMENT.

Con un lápiz serán trazados los puntos principales en la pierna, por su parte anterior, (después de hecho el bendaje y empaque algodónado); tírese una línea recta que divida al miembro en dos partes iguales, pasando por la rótula, la cresta de la tibia y el dorso del pie. Después dos líneas paralelas á ésta, y que limitarán los bordes del aparato; estas no son rectas enteramente, sino que siguen la forma del miembro.

Se trazan después las líneas transversales, una que limita el aparato, otra que pasa por la rótula, otras dos que limitan la pantorrilla y otra en la garganta del pie.

Se marcan además las eminencias que hacen los tobillos. Trazadas estas líneas se procura tomar dichos puntos para pasarlos al cuero y se obtiene un molde casi perfecto de la pierna; teniendo cuidado que en cualquier punto donde haya una eminencia, se haga

una incisión simple ó doble para que el cuero se amolde mejor á la pierna. Una vez trazado el miembro en el cuero y cortado éste, se sumerje en un baño caliente, teniendo bien disuelta una cantidad de bicarbonato de sosa, aproximadamente mayor que la mitad del peso del cuero ya cortado, y se deja unos dos ó cinco minutos: al fin de este tiempo la reacción ha terminado, se saca, se exprime fuertemente y está listo para aplicarse fijándolo con un bendaje.

Al cabo de diez horas está el cuero de buena consistencia y al cabo de veinte está como un carey.

Esté aparato es bastante fijo, su presión es suficiente, se amolda perfectamente al miembro, es sencillo de hacer y se puede quitar y poner cuantas veces se quiera sin hacer sufrir al paciente y sin deformarse el aparato. Los niños lo soportan bien y sus materiales se encuentran en todas partes.

Se puede desinfectar fácilmente y se puede impregnar de glicerina fenicada ó iodoformada. Se le pueden hacer ventanas para la curación de las heridas sin quitar el aparato.

Para mayores explicaciones véase la tesis del Dr. Vidal Torres y Tapia de Guadalajara.

Fricciones.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

FRICCIÓN METÁLICA.

Agua de colonia.....	gram.	30. 00
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 30
Eter acético.....	„	3. 00

Friega.

FRICCION ESTIMULANTE DURANTE LA EPIDEMIA DEL COLERA.

Alcohol.....	gram.	500. 00
Vinagre.....	"	500. 00
Alcanfor.....	"	20. 00
Harina de mostaza.....	"	20. 00
Pimienta en polvo.....	"	20. 00
Cantáridas en polvo.....	"	5. 00
Dos ajos machacados.		

*Friega.***Gastralgia.**

Dr. Federico Ábrego.	México.
Licór de Tower.....	gram. 15. 00
Tintura de cuasia.....	" 14. 00
" " nuez vómica.....	" 10. 00

Gotas.

Diez gotas un cuarto de hora antes de la comida principal.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

LAXANTE.

Polvo de cáscara sagrada..... gram. 5. 00

Para 10 papeles.

Un papel todas las mañanas.

POCION CALMANTE.

Infusión de raíz de angélica...	gram.	80. 00
Clorhidrato de cocaína.....	"	0. 10
Agua de laurel cerezo.....	"	15. 00
Jarabe de badiana.....	"	45. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Otra.

Agua de hinojo.....	gram.	120. 00
Carbonato de bismuto.....	"	4. 00
Extracto de belladona.....	"	0. 05
Clorhidrato de morfina.....	"	0. 05
Jarabe de menta.....	"	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Constancio Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Sulfato de quinina.....	gram.	1. 00
Iodoformo.....	"	0. 10
Narceína.....	"	0. 10

Para 10 píldoras.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe E. de Zacatecas.

INYECCION HIPODÉRMICA DE COCAINA.

Vaselina líquida.....	gram.	5. 00
Clorhidrato de cocaína.....	"	0. 10

Dosis: una jeringa durante el acceso.

Dr. Leandro Arroyo. San Angel D. F.

Bicarbonato de sosa.....	gram.	4. 00
Subnitrito de bismuto.....	"	4. 00
Extracto de belladona.....	"	0. 10

Para 12 papeles.

Un papel antes de cada alimento.

Dr. A. Martínez. México.

Agua de azahar.....	gram.	120. 00
Bromuro de sodio.....	"	2. 00