

Dr. J. Villagrán.	México
Infusión de hojas de naranjo... grm.	120. 00
Bromuro de potasio } " de sodio } " de amonio }	2. 00
Hidrato de clorol..... "	4. 00
Jarabe de corteza de naranja amarga..... "	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta el efecto sedante.

Dr. Emilio Polo.	Puebla.
Agua destilada..... grm.	120, 00
Tintura de gelsemium.....	8 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora. Es superior á los bromuros.

Dr. Francisco de P. Crespo.	Huamantla.
DURANTE EL ACCESO.	

Valerianato de amoniaco..... grm.	1. 00
Infusión de hojas de naranjo.... "	120. 00
Jarabe de éter..... "	30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Histeroepilepsia.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre,	Tehuacán.
Un gramo de nitrato de amila para tomarlo en el dia.	

Icteria catarral.

Dr. D. Molinar.	Parral.
Polvo de ruibarbo..... grm.	12. 00
Bicarbonato de sosa..... "	4. 00

En 6 papeles.

Uu papel tres veces al día.

Polvo de nuez vómica... de 0. 30 á grm.	0. 40
Extracto de ruibarbo..... "	4. 00
Corteza de naranja amarga..... "	2. 00

En 20 obleas.

Una oblea antes de cada comida.

Dr. Emilio Polo.	Puebla.
Tintura de acónito..... grm.	1. 00
Bicarbonato de sosa..... "	2. 00
Agua..... "	120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Sostener este tratamiento por 6 ú 8 días. Dieta y leche.

Dr. Benjamín Rosano.	Mineral del Monte.
Aloina..... grm.	1. 00
Podofilina..... "	0. 20
Extracto de belladona..... "	0. 05

En 10 píldoras.

Dos píldoras en la noche cada tercer día.

Dr. Lázaro Ortega.	México.
Subnitrato de bismuto..... grm.	4. 00
Bicarbonato de sosa..... "	4. 00

Magnesia calcinada..... „ 4. 00
 Extracto de belladona..... „ 0. 10

En 12 papeles.

Un papel antes de las comidas principales.

Ictiosis.

Dr. E. Lier. México.
 Azufre..... gm. 10. 00
 Ácido salicílico..... „ 2. 00
 Vaselina..... „ 90. 00
 Cloruro de calcio..... „ 0. 50

Uso externo.

Impétigo.

Dr. Eduardo Lamicq. México.
 Pomada benzoada..... gm. 30. 00
 Óxido de zinc..... „ 1. 00
 Aceite de cade..... „ 1. 00

Pomada.

Tres veces al día después de quitar las costras. Si hubiese mucha comezón se le puede agregar un poco de extracto de opio.

Incontinencia de orina.

Dr. Emilio Polo. Puebla.
 Tintura de cicuta..... 3 gotas
 Agua..... gm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Santonino gm. 0. 05
 Azúcar..... „ 1. 00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Gránulos de citrato de fierro y de estricnina al medio milígramo.—Dos en el día.

Indigestión.

Dr. Antonio C. Guzmán. Matamoros.
 Infusión de hojas de naranjo... gm. 120. 00
 Bicarbonato de sosa..... „ 6. 00
 Elixir paregórico..... „ 2. 00
 Jarabe de azahar..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Bicarbonato de sosa..... gm. 6. 00
 Carbonato de magnesia..... „ 6. 00
 Sulfato de morfina..... „ 0. 02

En 12 papeles.

Un papel despues de cada alimento.

Inflamaciones traumáticas.

Dr. Jesús H. Treviño. Monterrey.
 Empacar la parte inflamada con una capa de ácido salicílico en polvo.

INYECCIONES DE MORFINA.

Dr. José María Benitez. Guadalajara.
 Sulfato de morfina..... gm. 0. 20
 Acido fénico..... „ 0. 08
 Agua destilada..... { doce partes iguales has-
 Glicerina..... { ta completar 10 centí-
 metros cúbicos.

Disuélvase y fíltrese.

Esta inyección se conserva inalterable por un tiempo indefinido.

Cada centímetro cúbico contiene dos centígramos de morfina,

INYECCIONES DE QUININA.

Clorhidrato de quinina.....	gram. 0. 50
Ácido clorhídrico puro.....	2 gotas.
Agua.....	{ partes iguales hasta comple- tar 4 centímetros cúbicos.
Glicerina.....	
Ácido fénico.....	gram. 0. 03

Disuélvase y filtre.

Esta inyección es inalterable, acéptica, poco dolorosa y no produce flemones ni esfacila.

Cada centímetro cúbico contiene 12½ centigramos de clorhidrato de quinina.

INYECCIONES HIPODÉRMICAS DE QUININA.

Dr. T. Negrete.	Querétaro.
Agua destilada.....	gram. 1. 00
Clorhidrato de quinina.....	„ 0. 50
Antipirina.....	„ 0. 05

Inyección hipodérmica.

Esta inyección tiene la ventaja de permanecer líquida aun en frío, por consiguiente no se cristaliza la sal de quinina y no forma flemones ni escara y además no es dolorosa. Siempre debe aplicarse calentándola ligeramente.

Esta misma fórmula fué remitida por el Sr Dr. Ciro Santelices de Querétaro.

INFLAMACION DEL APARATO GÉNITO-URINARIO
DE LA MUJER.

Dr. F. Blazquez.	México.
Cápsulas de gram. 0. 20 de ictio sulfato de amoniac.	
co. Dos en la mañana y dos en la tarde.	
Aumentar una diaria hasta tomar dos en el día.	

Influenza.

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

FORMA CATARRAL FEBRIL.

Infusión de hojas de té.....	gram. 120. 00
Carbono de amoniaco de 4. 00 á ..	„ 8. 00
Cognac.....	„ 30. 00
Salicilato de sosa.....	„ 4. 00
Jarabe de opio.....	„ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

FRIEGAS GENERALES DE LINIMENTO TREMENTINADO.

FORMA NEURÁLGICA.

Agua de azahar.....	gram. 80. 00
Antipirina.....	„ 3. 00
Cafeina.....	„ 0. 50
Jarabe de codeina.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

FORMA GÁSTRICA.

Agua destilada.....	gram. 100. 00
Apomorfina de 0. 02 á.....	„ 0. 05
Ácido clorhídrico.....	X gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada cuarto de hora hasta el efecto.

PURGANTE.

Agua de azahar.....	gram. 100. 00
Sulfato de sosa de 30. 00 á.....	„ 45. 00
Alcohol.....	„ 8. 00
Cloroformo.....	„ 1. 00
Jarabe cfrico.....	„ 50. 00

FORMA INTERMITENTE.

Grageas de bromhidrato de quinina de grm. 0. 10
Una cada dos horas.

EN LA DECLINACION. POCIÓN TÓNICA (VEASE NEUMONÍA.)

Dr J. M. Dávila. Mazatlán E. de Sinaloa.

Antipirina..... grm. 2. 00

Extracto fluido de jaborandi... „ 4. 00

Polvo de Dower..... „ 1. 00

Infusión de borraja..... „ 100. 00

Jarabe de tolú..... „ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Francisco Fernández. Medellín E. de Veracruz.

Infusión de canela..... grm. 125. 00

Acetato de amoniaco..... „ 8. 00

Tintura de ipecacuana..... „ 1. 00

Cognac..... „ 40. 00

Jarabe de éter..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. R. López. México.

Infusión de jaborandi (grm. 4. 00

de polvo)..... grm. 150. 00

Acetato de amoniaco..... „ 10. 00

Tintura de ipeca..... „ 1. 00

Alcohol y jarabe de éter de c. c. „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

FORMA CATARRAL.

Infusión de digital..... grm. 120. 00

Antipirina..... „ 2. 00

Jarabe de opio..... „ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Infusión de borraja..... grm. 500. 00

Acetato de amoniaco..... „ 8. 00

Cognac ó catalán..... „ 45. 00

Jarabe de opio..... „ 30. 00

Id. simple..... „ 15. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada dos horas.

Linimento amoniacal..... grm. 60. 00

Bálsamo anodino..... „ 10. 00

Friega.

O bien.

Bálsamo tranquilo..... grm. 60. 00

Láudano Sydenham..... „ 8. 00

Cloroformo..... „ 8. 00

Friega.

Si la temperatura llega ó pasa de 40° ó la cefalal-
gia es muy extensa:

Antipirina..... grm. 0. 50

Bromhidrato de quinina..... „ 0. 20

[Para una oblea.

Dos ó tres obleas iguales repartidas en el día.

Dr. Guillermo R. Servín Triunfo Baja California.

FORMA CATARRAL.

Recina de benjuí pulverizada.....	gram.	2. 50
Azufre sublimado.....	„	1. 00
Oleosacaruro de hinojo.....	„	2. 50
Fenato de sosa.....	„	0. 10
Goma amoniaco.....	„	1. 00
Azufre dorado de antimonio.....	„	0. 10
Antipirina.....	„	1. 50
Malvavisco pulverizado.....	„	1. 00

En 35 píldoras.

Barnizadas con bálsamo de tolú disuelto en cloroformo.

Una píldora cada hora.

Cuando ya no haya calentura se suprime la antipirina, el azufre dorado de antimonio y el fenato de sosa y en su lugar se ponen 15 centígramos de kermes mineral.

Dr. D. Molinar. Parral.

Antipirina.....	gram.	2. 00
Azúcar.....	„	1. 00

En 4 papeles.

Un papel cada media hora.

Infusión de jaborandi.....	gram.	200. 00
Acetato de amoniaco.....	10 gotas.	
Jarabe de guayacán.....	„	30. 00

Bebida.

La bebida se tomará en la noche.

FRICCIONES CON LINIMENTO AMONIACAL ALCANFORADO.

Dr. J. M. Garza. San Pedro de las Colonias.
E. de Coahuila.

Salicilato de sosa.....	gram.	4. 00
Antipirina.....	„	2. 00
Polvo de Dower.....	„	1. 50

En 10 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. R. Ruiz. Salvatierra.

FORMA NEURÁLGICA.

Antipirina.....	gram.	1. 00
Salicilato de sosa.....	„	2. 00
Poción gomosa.....	„	120. 00
Jarabe de morfina.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Insomnio.

Dr. M. Valdéz y Diaz. Paso de Ovejas. E. de Veracruz.

Bromuro de potasio.....	gram.	2. 00
Antipirina.....	„	1. 00
Agua endulzada.....	„	120. 00
Láudano de Sydenham.....	X. V gotas.	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Antonio Butrón. Acapulco

EN LOS ALCOHÓLICOS.

Jarabe de cloral de Follet.....	gram.	80. 00
Bromuro de sodio.....	„	10. 00
Agua destilada.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta el efecto.

Otra.

Paraldeida..... grm. 3. 00

Poción gomosa..... „ 70. 00

Jarabe de azahar „ 30. 00

2 tomas.

Con una hora de distancia una de otra.

Intértrigo.

Dr. Miguel Cordero. México.

Glicerina neutra..... grm. 30. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 4. 00

Untura.

Dos veces al día previo lavado del lugar enfermo.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Tanino..... grm. 4. 00

Vaselina..... „ 30. 00

Pomada.

Involución uterina en el puerperio.

Dr. D. Mejía. México.

Cuando la matriz por falta de involución retiene sus loquios y se inician los accidentes de infección, se usan inyecciones calientes de solución fenicada ó boricada, tres ó cuatro veces al día y veinte gotas cada dos horas de solución de ergotina de Ivon.

Ioduro.

SU ADMINISTRACION.

Dr. J. Blazquez. México.

ACONSEJA LA FÓRMULA SIGUIENTE.

Agua..... grm. 20. 00

Ioduro de potasio..... „ 10. 00

Tintura de beleño..... „ 5. 00

Gotas.

Tomar veinte gotas en la comida.

Aumentar diez gotas diarias, hasta producir el catarro iódico, nazal ó intestinal.

Irritación.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzícuaró.

La enfermedad conocida vulgarmente con este nombre y caracterizada por una excitación de la piel acompañada de prurito.

Ácido arcenioso..... grm. 0 05

Azúcar..... „ 5. 00

Para 24 papeles.

Dos papeles diarios.

Protocloruro de mercurio..... grm. 0. 20

Recina de guayacán..... „ 1. 00

Extracto de opio..... „ 0. 10

En 20 píldoras.

Una píldora en la noche.

Iritis.

Dr. Agustín Chacón. México.

Agua destilada..... grm. 10. 00

Sulfato de atropina de 0. 02 á.. „ 0. 05

Colirio.

Se usa también esta fórmula en las congestiones del iris, sinequias, espasmos del músculo ciliar, úlceras centrales de la cornea y blefarospasmo.

Otra.

Agua destilada..... grm. 10. 00

Sulfato neutro ó salicilato de du-
boisina de 0.02 á..... „ 0.03
Colirio.

Se debe preferir al anterior cuando hay que conti-
nuar su empleo por largo tiempo.

Jaqueca.

Dr. E. Gutiérrez, Guadalupe E. de Zacatecas.
Antipirina..... grm. 4.00
Cafeína..... „ 1.00

En 3 papeles

Un papel cada dos horas hasta el efecto.
Salicilato de sosa..... grm. 4.00

En 4 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. Aurelio Pérez, La Piedad, Michoacán.
Salicilato de sosa..... grm. 2.00

Para 2 papeles.

Tomarlos con una hora de distancia.

Dr. F. Fernández, Medellín E. de Veracruz.
Podofilina..... grm. 0.02
Jabón medicinal..... „ 1.00
Esencia de canela..... X gotas.

Para 10 píldoras.

Una píldora cada media hora.

Dr. F. Blázquez, México,

FORMA NERVIOSA.

Cafeína y benzoato de sosa de c. c. grm. 1.00

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. J. López Tello, Amecameca E. de México.
Antipirina..... grm. 2.00

Para 4 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. J. Villagrán, México.

Infusión de tilia..... grm. 120.00

Elixir de garuz..... „ 40.00

Antipirina..... „ 4.00

Jarabe de azahar..... „ 15.00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora hasta quitar el do-
lor; despues retárdese su empleo.

Dr. Juan N. Campos, Toluca.

JAQUECA REUMATISMAL.

Agua..... grm. 100.00

Salicilato de sosa..... „ 1.00

Valerianato de amoniaco de

Prilloot..... „ 2.00

Jarabe c. b.

2 tomas.

Con media hora de distancia.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid, México.

Hidrolado de menta..... grm. 120.00

Clorhidrato de amoniaco..... „ 0.60

Licor de Hoffman..... „ 0.50

Jarabe de azahar..... „ 30.00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.