

Lumbago.

Dr. Manuel Villaseñor.—Pénjamo E. de Guanajuato.

Colodión elástico grm. 30. 00

Tintura de iodo..... „ 30. 00

Ámoniaco..... „ 8. 00

Uso externo.

Para aplicarlo violentamente con un pincel sobre la región enferma.

Lúpus eritematoso.

Dr. E. Lier México.

Acido pirogálico grm. 5. 00

Id. salicílico..... „ 2. 00

Vaselina..... „ 43. 00

Ungüento.

Ácido láctico y ácido salicílico

de c.c..... grm. 2. 00

Resorsina..... „ 3. 00

Ictiol..... „ 2. 00

Óxido de zinc..... „ 5. 00

Vaselina..... „ 36. 00

Ungüento.

LÚPUS VULGAR.

Dr. E. Lier México.

Ácido arsenioso..... grm. 1. 00

Cinabrio..... „ 3. 00

Ácido salicílico..... „ 0. 30

Cocaina..... „ 1. 00

Epidermina ó vaselina..... „ 30. 00

Ungüento.

Para ponerlo por tres días; después.

Iodo puro..... grm. 0. 50

Dermatol..... „ 2. 50

Vaselina..... „ 47. 00

Uso externo.

Dr. Miguel Cordero. México.

Agua alcoholizada..... grm. 200. 00

Fenol absoluto..... „ 2. 00

Pulverizaciones.

Con pulverizador de vapor una vez cada 24 horas por 15 minutos sobre el lugar enfermo.

Mal de Bright.

Dr. M. Mucél. México.

Dieta láctea.—Sudoríficos.—Limonadas minerales.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Ergotina de Bonjean..... grm. 4. 00

Extracto de nuez vómica..... „ 0. 10

Para 12 cápsulas.

Una cápsula cada dos horas.

Mal olor y sudor de los pies.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

Alumbre finamente pulverizado c. b.

Para poner un poco de polvo dentro de las medias y del calzado.

Lavar los pies cada tres ó cuatro días.

El resultado es casi inmediato.

Mal del pinto.

Dr. Ramón Martínez Carriedo. México.

Agua tibia..... grm. 40,000. 00

| | | |
|------------------------|---|--------|
| Acido clorhídrico..... | „ | 30. 00 |
| Tintura de canela..... | „ | 10. 00 |

Uso indicado.

Para darse baños cada tercer día, alternando con el siguiente:

| | | |
|------------------------|-------|------------|
| Agua..... | gram. | 40,000. 00 |
| Ioduro de potasio..... | „ | 30. 00 |

Para un baño.

Al interior.

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| Clorhidrato de pilocarpina..... | gram. | 0. 10 |
| Iodoformo..... | „ | 0. 20 |

Para 20 píldoras.

Dos píldoras diarias al acostarse.

Baño de aseo cada ocho días, resguardar al enfermo del aire y de los rayos directos del sol.

Dr. J. M^e Irys. San Juan Bautista E. de Tabasco.

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| Proto-ioduro de mercurio..... | gram. | 1. 00 |
| Extracto de opio..... | „ | 0. 05 |

Para 40 píldoras.

Dos píldoras diarias.

| | | |
|-------------------------------|-------|---------|
| Agua..... | gram. | 400. 00 |
| Bicloruro de mercurio..... | „ | 2. 00 |
| Alcohol c. b. para disolverlo | | |
| Sulfato de zinc..... | „ | 4. 00 |
| Acetato de amoniaco..... | „ | 4. 00 |

Loción

Estas lociones se darán con lienzo fino en las partes manchadas y se deja que sequen espontáneamente. Agitando la botella antes de usarla.

Este tratamiento es muy conocido por sus buenos resultados en el Estado de Tabasco y en el de Chiapas.

Su autor aconseja usarlo hasta tocar la encía y emplear entónces además de los medios apropiados para curar la estomatitis, purgantes de sulfato de sosa ó de magnesia calcinada, dos ó tres. Si al aparecer la estomatitis no han desaparecido las manchas, se espera que cure la inflamación de la boca para repetir el mismo método.

Hay que recordar que las manchas blancas no se quitan y que sólamente se consigue que no aumenten más.

Mal de San Lázaro.

Dr. P. Gama

México.

FORMA TUBERCULOSA.

Cocimiento de madera de rascavieja por agua de uso.

Ioduro de potasio en dosis progresivas de 0. 05 á 1. 00 gramo diario.

Baños tibios, de solución al milésimo de cloruro de sodio y aplicación de la siguiente:

| | | |
|--------------------------|-------|--------|
| Bicarbonato de sosa..... | gram. | 8. 00 |
| Tintura de iodo..... | „ | 10. 00 |
| Manteca..... | „ | 40. 00 |

Pomada.

Este tratamiento se debe continuar por dos ó tres meses administrando gránulos de arceniato de estricina.

Meningitis cerebral.

Dr Benjamín Rosano

Mineral del Monte.

De 30 á 40 centígramos diarios de ioduro de po-

tasio y una gota de tintura de gelcemiu cada hora los primeros días y después dos gotas cada hora.

Menorragia.

Dr. M. Mucél. México.

Extracto fluido de *Hidrastis Canadensis*: diez gotas cada dos horas al empezar el tratamiento, y desde el segundo día la misma dosis cada cuatro horas en vino jerez.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias, Coahuila.

Ergotina de Bonjean..... grm. 2. 00

Extracto de comelina..... „ 2. 00

Para 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.

Goma..... grm. 15. 00

Agua hervida..... „ 1000. 00

Maceración.

Para tomar un pozuelo diario.

O bien.

Polvo de goma de Sonora..... grm. 4. 00

„ „ azúcar..... „ 4. 00

En 16 papeles.

Un papel tres veces al día.

Metritis.

Dr. A. Diaz. San Antonio Tejas.

Aristol..... grm. 2. 00

Iodol..... „ 2. 00

Ácido félico..... „ 2. 00

Uso indicado.

Para hacer aplicaciones internas con algodón hidrófilo después de haber limpiado perfectamente el conducto cervical.

Si hay alguna escoriación en el cuello se cubrirá con el polvo y un tapón de algodón. Pasadas seis horas de la curación se pondrán inyecciones vaginales de 500 gramos de agua caliente y una cucharadita de la siguiente fórmula:

Naftol (beta)..... grm. 6. 00

Alcohol á 90°..... „ 120. 00

Cucharaditas para las inyecciones.

Si la enferma necesita tratamiento general, se le administrará emulsión de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos y con hierro.

El lactofosfato de cal obra muy bien en las personas debilitadas.

Metritis crónica.

Dr. M. Mucél. México.

En la forma más común que aquí se observa, la consecutiva á partos mal cuidados, detensión de la metamórfosis segresiva del útero ó congestiones repetidas del mismo, ha usado con buen éxito el tratamiento de Schreder, por medio de escarificaciones locales en el cuello del útero, siguiendo todos los detalles que él aconseja. En los intervalos, inyecciones de iodo iodurado bien caliente.

Metritis del cuello.

CON EXULCERACIÓN Ó CON ULCERACIÓN Y CUANDO EL CUELLO ESTÁ FUNGOSO Y SANGRANTE.

Dr. D. Mejía. México.

Además del tratamiento general emplea como tópico

| | | |
|--------------------------|-------|--------|
| Vaselina..... | gram. | 50. 00 |
| Ácido bórico..... | " | 4. 00 |
| Bicarbonato de sosa..... | " | 6. 00 |

Pomada.

Pulverícese perfectamente antes de mezclar la vaselina y se incorpora perfectamente de manera que frotando la pomada entre los dedos no se perciba grano.

Un tapón de algodón salicilado bien empapado de la pomada.—Cada tercer noche.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

METRITIS ULCEROSA.

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| Agua destilada..... | gram. | 5. 00 |
| Clorhidrato de hidrastina..... | " | 0. 10 |

Inyecciones.

Una inyección hipodérmica cada tres días hasta que se modifique la ulceración y cedan las hemorragias

Tónicos y tópicos desinfectantes.

Metrorragia.

Dn. Francisco Alvarez México.

En la sala ginecológica "González Echeverría" usa con el nombre de píldoras hemostáticas y en general con muy buen resultado la fórmula siguiente:

| | | |
|----------------------------|------|-------|
| Sulfato de estriquina..... | gram | 0. 01 |
| Hidrastina..... | " | 0. 04 |
| Ergotina de Bonjean..... | " | 2. 00 |

Para 20 píldoras.

Una cada hora mientras haya hemorragia.

Dr. Ricardo Egea y Galindo México.

| | | |
|------------------------|-------|--------|
| Sulfato de fierro..... | gram. | 20. 00 |
| Id de cobre..... | " | 20. 00 |
| Alumbre..... | " | 20. 00 |
| Sulfato de zinc..... | " | 10. 00 |

En 10 papeles.

Un papel en un litro de agua caliente, lo más caliente que pueda tolerarla la enferma, para inyección vaginal. Teniendo cuidado de untar la vulva de vaselina para evitar que se produzcan quemaduras si el agua está muy caliente.

Dr Benjamín Rosano Mineral del Monte.

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| Ergotina de Bonjean..... | gram. | 2. 00 |
| Extracto de cannabis índica..... | " | 0. 10 |

En 20 píldoras

Una píldora cada hora

Inyecciones vaginales de agua caliente.

Mordeduras de vívora.

Dr. J. M. Irys. San Juan Bautista. E. de Tabasco

| | | |
|-------------------------------|-------|--------|
| Vino blanco..... | gram. | 60. 00 |
| Polvo de hojas de cedrón..... | " | 1. 00 |

Amoniaco de 12 á 20 gotas.

Para 2 tomas.

Una distante de la otra, dos horas.

Incisiones en el lugar de la mordedura y cubrirlas con defensivos de solución de fenól.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

Impedir, si la región lo permite, por la ligadura la

absorción del veneno. En los primeros momentos hacer una aspiración con una ventosa ó la succión con los labios. Cauterizar con ácido fénico. En el lugar de la mordedura se aplicarán cataplasmas de una planta que se dá silvestre en la Baja California y que se conoce con el nombre de golondrina; y como tratamiento interno:

Cognac..... grm. 100. 00
Tintura dn guayaco..... „ 6. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Agua hervida..... grm. 150. 00

Planta fresca de la golondrina

de 10. 00 á..... „ 15. 00

En 2 tomas.

Como la ponzoña se elimina por los salivares y sudoríparas ha dado buen resultado la poción siguiente:

Agua..... grm. 120. 00

Hojas de jaborandi..... „ 5. 00

Cocimiento

Una Toma.

Nefritis.

Dr. M. Mucél.

México.

POR PROPAGACIÓN DEL CATARRO VECICAL.

Cocimiento de cebada perla... grm. 900. 00

Benzoato de sosa..... „ 5. 00

Éter nítrico..... „ 2. 50

Jarabe de grosella..... „ 100. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada dos ó cada cuatro horas.

Dr. Juan N. Campos

Toluca.

Agua destilada..... grm. 10. 00

Clorhidrato de pilocarpina... „ 0. 05

Gotas.

De 10 á 20 gotas tres veces al día.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

NEFRITIS PASENQUIMATOSO.

Bromuro de estroncis..... grm. 4. 00

Agua destilada..... „ 100. 00

Jarabe simple..... „ 10. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Neumonía fibrinosa.

Dr. R. Martínez Carriedo.

México.

Tres indicaciones hay que llenar principalmente limitando el camino trazado por la naturaleza:

1.^a Favorecer hasta cierto punto la elevación de la temperatura. Se sabe que los microbios que producen generalmente la enfermedad, mueren á una temperatura de 40°. Esto se consigue con los excitantes de la nutrición y tónicos generales.

2.^a Favorecer la eliminación del exudado; respetando la tos y favoreciéndola cuando no sea suficiente; fluidificar el exudado para ser fácilmente eliminado y

3.^a Ayudar la acción del corazón, pues si éste se cansa los enfermos mueren por un síncope. Para esto tenemos la digital, la cafeína, la esparteina y la estronfantina, medicamentos heróicos en sus resultados, lo mismo que las sales de quinina á pequeñas dosis.