

absorción del veneno. En los primeros momentos hacer una aspiración con una ventosa ó la succión con los labios. Cauterizar con ácido fénico. En el lugar de la mordedura se aplicarán cataplasmas de una planta que se dá silvestre en la Baja California y que se conoce con el nombre de golondrina; y como tratamiento interno:

Cognac..... grm. 100. 00
Tintura dn guayaco..... „ 6. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Agua hervida..... grm. 150. 00

Planta fresca de la golondrina

de 10. 00 á..... „ 15. 00

En 2 tomas.

Como la ponzoña se elimina por los salivares y sudoríparas ha dado buen resultado la poción siguiente:

Agua..... grm. 120. 00

Hojas de jaborandi..... „ 5. 00

Cocimiento

Una Toma.

Nefritis.

Dr. M. Mucél.

México.

POR PROPAGACIÓN DEL CATARRO VECICAL.

Cocimiento de cebada perla... grm. 900. 00

Benzoato de sosa..... „ 5. 00

Éter nítrico..... „ 2. 50

Jarabe de grosella..... „ 100. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada dos ó cada cuatro horas.

Dr. Juan N. Campos

Toluca.

Agua destilada..... grm. 10. 00

Clorhidrato de pilocarpina... „ 0. 05

Gotas.

De 10 á 20 gotas tres veces al día.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

NEFRITIS PASENQUIMATOSO.

Bromuro de estroncis..... grm. 4. 00

Agua destilada..... „ 100. 00

Jarabe simple..... „ 10. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Neumonía fibrinosa.

Dr. R. Martínez Carriedo.

México.

Tres indicaciones hay que llenar principalmente limitando el camino trazado por la naturaleza:

1.^a Favorecer hasta cierto punto la elevación de la temperatura. Se sabe que los microbios que producen generalmente la enfermedad, mueren á una temperatura de 40°. Esto se consigue con los exitantes de la nutrición y tónicos generales.

2.^a Favorecer la eliminación del exudado; respetando la tos y favoreciéndola cuando no sea suficiente; fluidificar el exudado para ser fácilmente eliminado y

3.^a Ayudar la acción del corazón, pues si éste se cansa los enfermos mueren por un síncope. Para esto tenemos la digital, la cafeína, la esparteina y la estronfantina, medicamentos heróicos en sus resultados, lo mismo que las sales de quinina á pequeñas dosis.

Para llenar las indicaciones, pueden usarse las siguientes fórmulas:

Nº 1	Vino de uva de primera clase..	gram.	150.	00
	Sulfato de estricnina.....	„	0.	04
	Sulfato de esparteina.....	„	0.	10
	Jarabe simple.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Nº 2	Cocimiento de hojas de naranjo..	gram.	100	00
	Benzoato de sosa.....	„	4.	00
	Ioduro de potasio.....	„	2.	00
	Jarabe simple.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día y tres veces en la noche, si el enfermo no duerme.

Por agua á pasto, cocimiento de violetas y pasas terciado con cognac.

Dr. F. Blazquez.	México.		
Calomel.....	gram.	0.	20
Fosforo de zinc y			
Sulfato de estricnina de c. c.....	„	0.	01

Para 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Esta fórmula sirve también en todas las afecciones inflamatorias de las vías respiratorias.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.	Tehuacán.		
NEUMONIA CATARRAL EN LOS NIÑOS.			
Acido benzoico sublimado.....	gram.	0.	60
Almiscle.....	„	0.	10

Polvo de altea.....	„	1.	00
---------------------	---	----	----

En 10 papeles.

Un papel cada tres horas.

Dr. E. Gutierrez Guadalupe E. de Zacatecas.

Agua de azahar.....	gram.	120.	00
Salicilato de sosa.....	„	6.	00
Tartrato de potasa y antimonio.	„	0.	30
Jarabe gomoso ...	„	45.	00
Láudano de Sydenham.....	„	XV	gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Goma amoniaco.....	gram.	3.	00
Kermes mineral.....	„	1.	00
Codeina.....	„	0.	10

Para 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Fenacetina.....	gram.	2.	00
Cafeina.....	„	1.	00

Para 10 obleas Limousin.

Una oblea cada dos horas.

Infusión de corteza de quina... gram.	120.	00
Extracto blando de quina roja.	„	4. 00
Cognac.....	„	40. 00
Vino cordial del Código.....	„	80. 00
Digitalina amorfa de 0. 05 á..	„	0. 08
Jarabe de grosella.....	„	45. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Vegigatorio de cantaridato do sosa; dieta láctea, tisanas emolientas.

Dr. F. Abrego México.

El primer día 3. 00 grm. de ipeca en tres tomas.

Una cada diez minutos.

Dos horas después empezará á tomar el enfermo cada dos horas las píldoras siguientes:

Hidrastina..... grm. 0. 30

Extracto tebaico..... „ 0. 05

Para 6 píldoras.

Desde luego aplicar un amplio vegigatorio volante sobre la pared costal del lado de la inflamación.

Bebida á pasto

Agua de grama..... grm. 500. 00

Clorato de potasa..... „ 6. 00

Bebida.

Régimen lácteo.

Durante el periodo de estado.

Infusión de café..... grm. 120. 00

Cognac..... „ 30. 00

Licor de Hoffman..... „ 4. 00

Jarabe de éter..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

En el periodo de eliminación se limita á sostener las fuerzas del enfermo, y si la expectoración es difícil, pequeñas cantidades de ioduro de potasio.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.
Vegigatorio amplio supurado y al interior, (según el caso.)

Vino de quina..... grm. 20. 00

Cognac..... „ 60. 00

Cucharadas.

En la neumonia de los viejos.

Jarabe de ipeca..... grm. 20. 00

Jarabe de tolú..... „ 30. 00

Extracto de orozuz..... „ 4. 00

Tintura de nuez vómica..... „ 2. 00

Extracto de opio..... „ 0. 10

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Antonio Carreón. Chalchicomula.

POCIÓN ALCOHÓLICA.

Infusión de canela..... grm. 120. 00

Cognac..... „ 30. 00

Jarabe de naranja..... „ 30. 00

Cucharadas.

Dr. D. Molinar Parral.

Calomel, vegigatorios y alcohólicos.

Dr. José B. López Campeche.

Kermes mineral..... grm. 2. 00

Extracto de digital..... „ 0. 10

Jabón medicinal c. b.

En 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. Miguel Cordero. México.

Fosforo de zinc puro..... grm. 0. 12
 Polvo fino de azúcar..... „ 6. 00

En 12 papeles.

Dos papeles diarios.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

En los individuos vigorosos, empezar por prescribir la poción contraestimulante de Laennec por cucharadas dos cada dos horas, y cuando la frecuencia y plenitud del pulso, así como la temperatura han bajado, se darán los siguientes pozuelos.

Infusión de hojas de coca..... grm. 500. 00
 Acetato de amoniaco..... „ 8. 00
 Cognac ó catalán..... „ 45. 00
 Jarabe de opio..... „ 30. 00
 „ simple..... „ 15. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada dos horas.

En los viejos se alternarán estos pozuelos, con la poción de digital de Jacoud ó con otro quermetizada.

Dr. Reyes G. Flores. Guadalajara.

Veratrina..... grm. 0. 01
 Goma c. b.

En 4 píldoras.

Una píldora cada tres horas.

Su aplicación tiene por objeto bajar el pulso y la temperatura.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Cocimiento de hojas de digital. grm. 120. 00
 Jarabe tebaico..... „ 20. 00
 Vino de Málaga..... „ 40. 00
 Acetato de amoniaco..... „ 4. 00
 Ergotina..... „ 2. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. José M^a Bandera. México.

Cuando usa la poción de Todol, la modifica de la manera siguiente:

Mezcal de 80. 00 á..... grm. 100. 00
 Agua..... „ 120. 00
 Jarabe simple..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Lázaro Ortega. México.

EN INDIVIDUOS ROBUSTOS.

Agua destilada..... grm. 120. 00
 Tártaro emético..... „ 0. 05
 Jarabe de goma..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Ricardo Egea y Galindo. México.

En los casos muy graves, cuando toda medicación fracasa y que la enfermedad avanza, se han tenido brillantes éxitos con la fórmula siguiente:

Hojas de digital.....	grm.	0, 50
Infúndase en agua.....	„	100. 00
Extracto de orozúz.....	„	4. 00
Acetato de plomo cristalizado..	„	0. 30
Jarabe de tolú.....	„	30. 00
Láudano Sydenham.....		20 gotas.

Cucharadas grandes.

Una cucharada cada hora, y aumentar diariamente 0. 10 de acetato de plomo hasta llegar á dar 0. 50 ó 0. 60 en el día. Empleando para sostener las fuerzas, inyecciones hipodérmicas de estricnina ó de cafeína.

Contra todo lo conocido *jamás* el acetato de plomo produce síntomas de intoxicación ni estreñimiento, por el contrario se produce diarrea; el pulso se hace duro y lleno, hay sudores *muy abundantes* y el enfermo acusa un apetito exagerado.

Dr. Ciro M. Santelices,	Querétaro.
Calomel.....	grm. 0. 30
Kermes.....	„ 0. 30
Polvos de digital.....	„ 0. 30

En 12 cápsulas

Una cápsula cada dos horas.

NEUMONÍA EN LOS ALCOHÓLICOS.

Infusión de polígala.....	grm.	120. 00
Carbonato de amoníaco.....	„	2. 00
Cognac.....	„	40. 00
Kermes.....	„	0. 30
Jarabe de estricnina.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Antonio Matienzo. Tampico E. de Tamaulipas.

SIN COMPLICACIÓN.

Dieta y leche.—Caldo si el enfermo es débil.—Limónada vinosa como bebida.

Si el dolor es muy intenso, un centígramo de morfina en inyección subcutánea, y dos ventosas escarificadas, si el enfermo es robusto.

Durante los tres ó cuatro primeros días.

Clorhidrato de amoníaco.....	grm.	1. 00
Jarabe de goma.....	„	15. 00
„ „ diacodión.....	„	10. 00
Infusión de polígala.....	„	95. 00

Cucharadas.

Para consumir la dosis en veinticuatro horas.

Desde el cuarto día si hay indicios de una resolución lenta emplea la digital, siguiendo la práctica de Picot.

Agua hirviendo.....	grm.	120. 00
Polvo de hojas de digital.....	„	0. 60
Hágase infusión durante media hora, fíltrese y agrégese Jarabe de azahar.....	„	15. 00

Cucharadas.

Para consumir en veinticuatro horas.

Repítase la fórmula al día siguiente.

Desde el sexto día si la crisis no se presenta y si el pulso es irregular.

Cafeína.....	grm.	1. 50
Benzoato de sosa.....	„	1. 50

Para 12 píldoras.

Consumirlas en el día. Al mismo tiempo cuatro mi-

lígramos de extricnina en el día, en gránulos y en inyecciones hipodérmicas.

Cognac en té.*

El vegigatorio solamente del quinto al sexto día tiene efectos favorables.

Dr. R. López,

México.

PRIMER PERIODO.

Infusión de hojas de digital 1 para 150.....	gram.	150. 00
Acetato de amoniaco.....	„	10. 00
Alcohol.....	„	40. 00
Jarabe de ipecacuana.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Vicente Sierra.

Apam, E. de Hidalgo.

El primer día de la enfermedad.

Agua hirviendo :..... gram. 150. 00

Una dosis de javorandi del Dr. Coutinho. (1)

Hágase infusión, endulcése y tómese en una sola vez.

El segundo y tercer día:

Infusión de flor de tilia.....	gram.	120. 00
Tártaro emético.....	„	0. 15
Agua de laurel cerezo.....	„	0. 60
Jarabe de diacodión.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

(1) La dosis que recomienda el Dr. Coutinho, es de 5. 00 por 150.00 de agua hirviendo.

Los días siguientes infusión pectoral de liquen ó polígala y una que otra vez que el dolor moleste mucho al enfermo, un vegigatorio.

Dr. F. D. Maldonado.

Aguascalientes.

En el primer periodo en individuos no debilitados.

Calomel..... gram. 2. 00

Azúcar..... „ 3. 00

Para 2 papeles.

Se dará el segundo papel á las tres horas despues del primero, si éste no produce efecto purgante.

Alimentación sin sal.

Dr. J. López Tello.

Amecameca E. de México.

Calomel..... gram. 0. 15

Extracto de opio..... „ 0. 05

Polvo de azúcar..... „ 3. 00

Para 15 papeles.

Un papel cada hora, hasta tocar la encía. Vegigatorio en el lugar enfermo. Plan, tónico.

Dr. J. M. Arroyo.

Irapuato E. de Guanajuato.

Infusión de hojas de naranjo... gram 120. 00

Alcoholado de raíz de acónito... „ 2. 00

Jarabe de digital é

Id. „ codeina de c. c..... „ 15. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. Antonio J. Carbajal.

México.

En el periodo asfíxico ha obtenido buen resultado con la siguiente:

Infusión de café torreficado grm. 500. 00

Valerianato de amoniaco " 4. 00

Lavativas.

Una lavativa de medio pozuelo cada dos ó tres horas, ayudado de pequeñas dosis de café con cognac. Si el caso no es muy apremiante se reduce á gramos 2. 00, la cantidad de valerianato de amoniaco para evitar su efecto exitante sobre los intestinos.

Neuralgia.

Dr. Lorenzo Cantú. C. Porfirio Diaz E. de Coahuila.

NEURALGÍA CONGESTIVA.

Antipirina grm. 0. 60

Cocaina " 0. 03

En 3 papeles

Un papel cada hora.

Dr. Guillermo R. Servin. Triunfo. Baja California.

Alcoholado de menta grm. 20. 00

Exalgina " 2. 00

Bromhidrato de cafeina " 0. 10

Alcoholado de anís " 20. 00

Clorhidrato de cocaina " 0. 10

Alcohol c. b.

Gotas.

Diez gotas en una cucharada de agua cada media hora, hasta seis veces.

Dr. Benjamín Rosano. Mineral del Monte.

Butilcloral grm. 1. 00

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Otra.

Antipirina grm. 2. 00

Butilcloral " 1. 00

Para 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Pomada de belladona grm. 30. 00

Alcanfor " 4. 00

Veratrina " 0. 10

Cianuro de potasio " 2. 00

Cloroformo " 6. 00

Pomada.

Dos veces al día.

Dr. Alberto B. Orduña.

Tehuacán.

Bromhidrato de quinina grm. 0. 50

Masa de Meglin " 0. 50

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora, por dos ó tres días.

Dr. Jesús H. Treviño.

Monterrey.

Cafeina grm. 0. 50

Extracto acuoso de colchico " 0. 05

Narceina " 0. 25

Alcanfor " 0. 25

En 10 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. Miguel Cordero.

México.

Extracto de beleño grm. 0. 15

Id. de belladona „ 0. 15
 Clorhidrato de morfina „ 0. 05
En 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Otra.

Valerianato de quinina grm. 1. 00
 Id. de zinc „ 1. 00
 Extracto de belladona 0. 0. 10
Para 10 píldoras.

Cuatro píldoras repartidas en el día.

Aceite esencial de menta grm. 0. 50
 Agua alcoholicada c. b. para disolverla.
Inyecciones hipodérmicas.

De uno á cinco miligramos locodolenti bastan para quitar el dolor cuando la neuralgia es periférica.

Dr. Jesús B. López, Campeche.

Sal de Pellétier grm. 1. 20
 Extracto de estramonio „ 0. 15
En 12 píldoras.

Una píldora cada hora.

Otra.

Sal de Pellétier grm. 1. 20
 Extracto de opio „ 0. 10
En 12 píldoras

Una píldora cada dos horas.

Aceite de olivo grm. 250. 00
 Esencia de trementina „ 90. 00
 Láudano Sydenham „ 30. 00
 Alcanfor „ 60. 00

Friega.

Dr. Alberto Aizpuru, México.

Amoniaco líquido á 25° grm. 15. 00
 Cloroformo „ 10. 00
 Tintura de opio „ 5. 00
 Alcohol á 90° „ 75. 00

Uso externo.

Empátese un pedazo de franela en este líquido y aplíquese sobre el lugar doloroso y cúbrase con gutapercha laminada.

Dr. Fernández Ortega, Tacubaya D. F.

Contra las neuralgias congestivas de cualquier origen, da un magnífico resultado, la tintura al quinto de Baptisia tintórea á la dosis de diez gotas tres veces al día, en el adulto.

Dr. E. Gutiérrez, Guadalupe. E. de Zacatecas.

Agua destilada de azahar grm. 80. 00
 Bromuro de potasio „ 4. 00
 Cianuro de potasio „ 0. 05
 Jarabe simple „ 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta la sedación.

Otra.

Agua destilada grm. 1. 00
 Acido ósmico de 0. 005 á „ 0. 01

Inyección.

Para una jeringa.

Al exterior:

Aceite alcanforado grm. 20. 00
 Lanolina „ 20. 00