

Mentol.....	„	5. 00
Cloroformo.....	„	4. 00
Tintura de castor.....	„	25. 00
Id. „ nuez vómica.....	„	8. 00
Éter acético.....	„	15. 00

Friega.

Dr. Guillermo Senisson,	México.
Sal de Pellétier.....	gram. 1. 00
Salipirina.....	„ 2. 00
Aconitina.....	„ 0. 03

Para 12 píldoras.

Una píldora cada tres ó cuatro horas, según la intensidad del dolor.

Dr. J. Villagrán,	México.
Valerianato de quinina.....	gram. 1. 00
Aconitina cristalizada.....	„ 0. 01
Extracto de belladona.....	„ 0. 40

Para 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas hasta calmar el dolor, retrazando su administración si hubiere mejoría.

Otra.

PRÉVIO TRATAMIENTO INTERIOR.

Bálsamo de opodeldoc.....	gram. 40. 00
Láudano de Rousseáu.....	„ 4. 00
Cloroformo.....	„ 4. 00

Friega.

Píldoras antineurálgicas de Moussette, dos ó tres en el día.

Dr J. López Tello.	Amecameca. E. de México.
Antipirina.....	gram. 2. 00

En 8 papeles.

Un papel cada hora.

Agua de laurel cerezo.....	gram. 10. 00
Clorhidrato de morfina.....	„ 0. 10
Sulfato de atropina.....	„ 0. 01

Inyecciones.

Una inyección subcutánea de diez gotas y repetir las una hora después si es necesario. No pasar de esta cantidad.

Dr. J. M. Arroyo.	Irapuato E. de Guanajuato.
Extracto de beleño y extracto	

tebaico de c. c.....	gram. 0. 05
Valerianato de quinina.....	„ 0. 25
Óxido de zinc.....	„ 0. 30
Polvo de almizcle.....	„ 0. 05

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Alcohol.....	} de c. c..... gram. 15. 00
Éter sulfúrico.....	
Cloroformo.....	

Cianuro de potasio.....	„ 0. 20
-------------------------	---------

Uso externo.

Úsese en fomentos, en los lugares dolorosos.

Dr. J. M. Irys.	San Juan Bautista E. de Tabasco.
Masa de Meglin.....	gram. 1. 50
Bromhidrato de quinina.....	„ 1. 50

Para 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. G. J. Chávez. Tasco.

Extracto de beleño..... grm. 0. 15
Valerianato de zinc..... „ 0. 60

Para 12 píldoras.

Una cada dos horas hasta calmar el dolor.

Dr. P. Gama. México.

Aceite morfinao..... grm. 30. 00
Jabón alcanforado..... „ 15. 00
Tintura de acónito..... „ 10. 00
Id. de opio..... „ 15. 00
Esencia de menta..... „ 10. 00
Cloroformo..... „ 10. 00

Friega.

Al lugar del dolor.

Dr. A. Higareda Huejotzingo E. de Pueblal

Usa el bromuro de potasio á alta dosis asociado a almizcle.

Muchas veces ha visto ceder las neuralgias; sobre todo de los nervios raquidianos, con la friega siguiente:

Bálsamo tranquilo..... grm. 20. 00
Tintura de valeriana..... „ 20. 00
Éter acético... .. „ 20. 00
Alcanfor..... „ 4. 00
Extracto de estramonio..... „ 4. 00

Friega.

Se aplica en frio y si media hora después no se cal-

ma el dolor, se aplica caliente; es raro tener que usarla una tercera vez.

Dr. Salvador F. Alcalá Tecolotlán.

Extracto de opio..... grm. 0. 10
„ „ belladona..... „ 0. 05
„ „ acónito..... „ 0. 05

Para 6 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. M. Villaseñor. Pénjamo. E. de Guanajuato.

NEURALGÍA INTERCOSTAL.

Pomada alcanforada..... grm. 30. 00
Extracto de acónito..... „ 0. 10
Tintura de opio..... „ 5. 00

Pomada.

Para aplicarla frecuentemente.

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.

NEURALGÍA INTERCOSTAL.

Bromhidrato de quinina y Anti-
pirina de c. c..... grm. 2. 00

Para 4 cápsulas.

Una cápsula cada veinticuatro horas.

Dr. Alberto Aizpuru. México.

NEURALGIA POR CARIE DENTARIA.

Creosotina iodada..... grm. 2. 00
Ácido fénico medicinal..... „ 2. 00
Clorhidrato de cocaina..... „ 0, 20

Uso indicado.

Para empapar pequeños algodones é introducirlos en la picadura, cubriéndolos con cera ó chicle.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.

NEURALGÍA DENTARIA.

Cloroformo.....	gram.	6. 00
Ácido fénico.....	„	2. 00
Esencia de menta é		
Id. „ clavo de c. c.....	„	II gotas.

Uso indicado.

Limpiar la picadura de la muela y poner un algodón empapado en el líquido, y si es posible una gota.

Dr. Joaquín L. Vallejo. México.

Idrato de cloral y		
Alcanfor de c. c.....	gram.	5. 00
Clorhidrato de cocaina.....	„	0. 05

Uso indicado.

Un algodón empapado en el líquido, é introducido en la carie dentaria hace desaparecer el dolor muy rápidamente.

Dr. Gonzalo Farías San Luis Potosí.

Alcohol.....	gram.	30. 00
Polvo de raiz de pelitre....	„	60. 00

Hágase macerar por 4 ó 6 días filtrese y añádase:

Cloroformo.....	„	30. 00
-----------------	---	--------

Uso externo.

Para tocar el diente ó muela careado con un algodón mojado en el líquido.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Polvo de simaba cedrón..... gram. 30. 00

Alcohol c. b. para hacer una pasta que se aplicará en la picadura.

Neuralgia facial y hemicránea.

Dr. A. Martínez. México.

Bromuro de alcanfor..... gram. 0. 30

Valerianato de zinc..... „ 0. 60

Extracto de belladona..... „ 0. 10

Sulfato de morfina..... „ 0. 05

Para 12 píldoras.

Una píldora cada tres horas hasta quitar el dolor.

Tintura de belladona y

Éter acético de c. c..... gram. 30. 00

Cloroformo..... „ 15. 00

Acetato de morfina..... „ 0. 10

Friega.

Para ponerla en las partes dolorosas.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Bromhidrato de quinina..... gram. 1. 00

Aconitina de Duquesnel..... „ 0. 0005

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora. Debe continuarse su uso por ocho días.

Ó bien

Bromhidrato de quinina..... gram, 0. 25

Cafeina..... „ 0. 15

Para 5 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.
 Valerianato de zinc grm. 0. 60
 Extracto de beleño " 0. 30
 Id. de ópio " 0. 15

Para 12 píldoras.

Tres píldoras en el día.
 Glicerina grm. 15. 00
 Cloroformo " 15. 00

Friega.

Al lugar del dolor.

NEURALGIAS DEL TRIGÉMINO.

Dr. Guillermo Parra. Tacubaya D. F.

Usa con buen resultado la fórmula siguiente:

Valerianato de quinina grm. 2. 00
 Masa de meglín " 1. 00
 Picrato de amoniaco " 0. 05

Para 12 píldoras.

Tomar tres píldoras repartidas en el día. (dosis para adulto.)

Dr. F. Fernández. Medellín E. de Veracruz.

Extracto de ópio grm. 0. 05
 Id. „ estramonio " 0. 10
 Id. „ valeriana " 0. 30

En 10 píldoras

Una píldora cada media hora.

Dr. M. Mucél. México.

NO SINTOMÁTICAS DE UN ESTADO GENERAL.

Croton-cloral grm. 1. 00
 Clorhidrato de morfina " 0. 03

Para 12 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. A. J. Carbajal. México.

Valerianato de quinina grm. 0. 60
 Id. „ zinc " 0. 40
 Extracto de beleño " 0. 20
 Acetato de morfina " 0. 05

Para 12 píldoras.

Una píldora cada dos ó tres horas, hasta quitar el dolor; continuar una en la mañana y otra en la tarde, por cuatro ó cinco días.

Sulfato de cobre grm. 0, 20
 Subnitrato de bismuto " 1. 00

Para 10 píldoras.

Una píldora cada cuatro horas [tres ó cuatro en el día] según la tolerancia gástrica.

Ha usado el Dr. Carbajal con buen éxito el tratamiento local siguiente: Aplicar un vegigatorio amoniacal en el lugar del dolor por medio de un dedal en cuyo fondo se pone una bolita de algodón, encima otra impregnada con amoniaco concentrado; bastan cinco minutos para obtener su efecto. Se frota la epidermis con un lienzo suave para desprenderlo y se ponen 0. 005 ú 0. 008 miligramos de clorhidrato de morfina. Al otro día se repite igual operación; al tercero es inútil porque está muy seca la superficie. Pero basta con lo anterior en muchos casos.

Dr. M. Mucél. México.

NEURALGÍA INTERCOSTAL.

Los casos más rebeldes los ha visto dominarse con aplicación de sanguijuelas en el principal punto doloroso.

Dr. A. Matienzo Tampico.

ESPECIALMENTE DE ORIGEN PALÚDICO.

Bromhidrato de quinina..... grm. 1. 00
 Clorhidrato de morfina..... „ 0. 05
 Extracto de belladona..... „ 0. 05

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora ó cada dos horas.

Dr. David Peña. Monterrey.

Antipirina de Knor..... grm. 3. 00
 Bromuro de sodio..... „ 5. 00
 Agua destilada de laurel cerezo. „ 15. 00
 Hidrolado de azahar..... „ 110. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. J. Páramo Rangél. México.

Anticamnia..... grm. 1. 00
En 3 papeles.

Un papel diario.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Tintura de spigelia..... 6 gotas.
 Id. de aconitina..... 6 gotas.
 Agua..... grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.
 Tintura de gelcemiun..... 10 gotas.

Solución oficial de trinitrina al centésimo 8 gotas.

Agua..... grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia.

Sal de Knor..... grm. 2. 00
 Bromuro de sodio..... „ 4. 00
 Agua de Sedlz..... „ 125. 00
 Elixir de Garuz..... „ 8. 00
 Jarabe simple..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Cafeina..... grm. 1. 30
 Benzoato de sosa..... „ 1. 30

En 15 píldoras.

Una píldora cada dos ó tres horas.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Masa oficial de Meglin..... grm. 0. 50
 Aconitina..... „ 0. 002
 Clorhidrato de morfina..... „ 0. 02

En 10 píldoras.

Dos ó tres píldoras en el día.

NEURALGIAS DEL TRIGEMINO.

Dr. Federico Cota. La Paz Baja California.

Aplica la electricidad haciendo pasar la corriente por la mano del operador y empleando á la vez la malaxación siguiendo el trayecto de las ramificaciones nerviosas.

Bromhidrato de quinina.....	gram.	1. 00
Clorhidrato de morfina.....	"	0. 05
Extracto de belladona.....	"	0. 10

En 10 píldoras.

Se distribuyen según el caso.

Agua destilada.....	gram.	1. 00
Analgesina.....	"	0. 50
Clorhidrato de morfina.....	"	0. 01

Una inyección hipodérmica.

NEURALGIA ESPECIALMENTE EN LA CIÁTICA.

Dr. F. Blazquez. México.
Trementina á alta dosis en los intervalos de los accesos. Doce perlas diarias repartidas en las principales comidas.

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.
Aconitina criztalizada..... gram. 0. 002
Para 8 píldoras.
Dos ó tres píldoras en las veinticuatro horas.

Dr. Emilio Polo. Puebla.
Valerianato de amoniaco..... gram. 0. 60
Aconitina..... " 0. 003
Extracto de belladona..... " 0. 30
Valerianato de quinina..... " 0. 60
En 6 píldoras.

De tres á seis píldoras en el día.

Vegigatorios en el tayecto del nervio, curadas con pomada de morfina.

Dr. D. Molinar. Parral.
Salicilato de quinina..... gram. 2. 00
En 20 cápsulas.
Dos cápsulas tres veces al día.

Dr. M. Medal. Tacámbaro. E. de Michoacán.
Tintura de iodo..... }
" " cantáridas.. } de cc. gram. 10. 00
Bálsamo anodino..... }
Esencia de trementina.. }
Morfina ó atropina..... " 0. 05
Friega.

Para aplicarla sobre los puntos dolorosos cubriéndolos con algodón.

Neurastenia.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.
En la neurastenia y debilidad genésica además de la hidroterapia y la electricidad.
Sulfato de estriquina..... gram. 0. 01
Fosfuro de zinc..... " 0. 01
Tintura de jengibre..... 30 gotas.
Extracto de genciana..... " 1. 00
Para 30 píldoras.

Comenzar por una píldora diaria.

Oclusión intestinal.

Dr. Ricardo Egea y Galindo México.
Dar cada hora un centígramo de calomel y uno de belladona hasta producir los síntomas de la salusación de la belladona.
Una vejiga con hielo constantemente en el vientre.
Una pequeña taza de café bien concentrada cada tres horas.