

Bromhidrato de quinina.....	gram.	1. 00
Clorhidrato de morfina.....	"	0. 05
Extracto de belladona.....	"	0. 10

En 10 píldoras.

Se distribuyen según el caso.

Agua destilada.....	gram.	1. 00
Analgesina.....	"	0. 50
Clorhidrato de morfina.....	"	0. 01

Una inyección hipodérmica.

NEURALGIA ESPECIALMENTE EN LA CIÁTICA.

Dr. F. Blazquez. México.
Trementina á alta dosis en los intervalos de los accesos. Doce perlas diarias repartidas en las principales comidas.

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.
Aconitina criztalizada..... gram. 0. 002
Para 8 píldoras.
Dos ó tres píldoras en las veinticuatro horas.

Dr. Emilio Polo. Puebla.
Valerianato de amoniaco..... gram. 0. 60
Aconitina..... " 0. 003
Extracto de belladona..... " 0. 30
Valerianato de quinina..... " 0. 60
En 6 píldoras.

De tres á seis píldoras en el día.

Vegigatorios en el tayecto del nervio, curadas con pomada de morfina.

Dr. D. Molinar. Parral.
Salicilato de quinina..... gram. 2. 00
En 20 cápsulas.
Dos cápsulas tres veces al día.

Dr. M. Medal. Tacámbaro. E. de Michoacán.
Tintura de iodo..... }
" " cantáridas.. } de cc. gram. 10. 00
Bálsamo anodino..... }
Esencia de trementina.. }
Morfina ó atropina..... " 0. 05
Friega.

Para aplicarla sobre los puntos dolorosos cubriéndolos con algodón.

Neurastenia.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.
En la neurastenia y debilidad genésica además de la hidroterapia y la electricidad.
Sulfato de estriocina..... gram. 0. 01
Fosfuro de zinc..... " 0. 01
Tintura de jengibre..... 30 gotas.
Extracto de genciana..... " 1. 00
Para 30 píldoras.

Comenzar por una píldora diaria.

Oclusión intestinal.

Dr. Ricardo Egea y Galindo México.
Dar cada hora un centígramo de calomel y uno de belladona hasta producir los síntomas de la salusación de la belladona.
Una vejiga con hielo constantemente en el vientre.
Una pequeña taza de café bien concentrada cada tres horas.

Lavativas de solución de jabón.

Dieta absoluta.

Tan luego como venga escremento en pequeña cantidad con el uso de los lavatorios, administrar la fórmula siguiente:

Aceite de ricino.....	gram.	40. 00
Cognac supremo.....	„	10. 00
Glicerina.....	„	10. 00
Calomel.....	„	0. 30
Jarabe de limón.....	„	15. 00

Purgante.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.

Obstrucción por invaginación.

Agua de azahar.....	gram.	120. 00
Valerianato de amoniaco.....	„	0. 60
Extracto de belladona.....	„	0. 05
Jarabe de éter.....	„	32. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. Leonardo Gómez V. Tenango E. de México,

Provenida por endurecimiento de las materias fecales, por cordones ó filamentos pseudomembranosos, por vólvulo ó por imbaginación.

(1) Raíz de pipiztráhuac de 4 á 8 y

(1) El pipiztráhuac (*Frixitis furticosa* compuestas) se da en el estado silvestre en el cerro de Tenango. El Dr. Gómez es el primero que le ha empleado en medicina con brillantes resultados.

El Sr. Profesor de Farmacia Don Severiano Perez extrajo de esta planta un ácido, el ácido pipitzaico, purgante activo á la dosis de 20 á 30 gramos.

hasta..... gram. 16. 00
 Agua hirviendo..... „ 250. 00
 Hágase infusión.

Lavativa.

Repítase la fórmula cuantas veces sea necesario.
 Está contra indicada en los casos de peritonitis, hernia y parálisis intestinal de origen central.

Dr. M. Villaseñor. Pénjamo E. de Guanajuato.

Al interior 250. 00 gram. de aceite de olivo y otra cantidad igual en lavativas con sonda para ponerla lo más alta posible. Inmediatamente después se pone al enfermo en un baño de agua caliente, lo más que el enfermo lo pueda soportar, por espacio de quince á veinte minutos.

Para calmar los vómitos, dolor, etc. se usará de los medios aconsejados comunmente, usando de preferencia la aconitina, la hiosciamina y la codeina, ya sea al interior ó al exterior; excluyendo el opio y las sales de morfina.

Oftalmia.

Dr. P. Gama. México.

Agua de laurel cerezo.....	gram.	5. 00
Bórax y clorato de potasa de cc. „	„	0 50
Agua de rosas.....	„	150. 00

Lavatorio.

Para usarlo tibio cada dos horas.
 Purgante de aceite; evitar la luz y dieta moderada.

Dr. L. Castro. México.

OFTALMÍA BLENORRÁGICA Ó LEUCORREICA.

Agua destilada..... grm 30. 00
Nitrato de plata..... „ 0. 30

Gotas para los ojos.

De tres á cuatro gotas en los ojos enfermos previo lavado con solución bórica al 2 por ciento y anestesia por la cocaina para evitar el dolor.

OFTALMÍA PURULENTA.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

Despues que han pasado los 12 ó 14 días sin accidente por parte de la córnea ó cuando éstas han venido á pesar del tratamiento clásico y sigue un abundante escurrimiento pusulento.

Agua esterilizada..... grm. 500. 00
Ácido bórico..... „ 2. 00

Lavatorio.

Labatorio intrapalpebral hecho con jeringa y cada dos horas cuando menos.

Agua destilada.... :..... grm. 30. 00
Tanino c. b. hasta la saturación

Gotas para los ojos.

Dos ó tres gotas en cada ojo despues de cada lavatorio.

OFTALMÍA PURULENTA.

Dr. E. Gutierrez Guadalupe E. de Zacatecas.

Cocimiento de semillas de lino. grm. 250. 00
Agua destilada de laurel cerezo „ 10. 00
Salol..... „ 5. 00

Lavatorio.

Agu de rosas..... grm. 15. 00
Nitrato de plata cristalizado.... „ 0. 15
Clorhidrato de cocaina..... „ 0. 10

Colirio.

Dos gotas tres veces al día.

Dr. Agustin Chacón. México.

Agua destilada..... grm. 10. 00
Nitrato de plata de 0. 10 á..... „ 0. 20

Toques.

Lavar primero el ojo con el lavatorio de ácido bórico, voltear los párpados y tocar la conjuntiva por medio de un pincel. En seguida se neutraliza el exeso de nitrato de plata con el colirio de cloruro de sodio.

Agua destilada..... grm. 10. 00
Cloruro de sodio..... „ 1. 00

Colirio.

Para neutralizar el exceso de nitrato de plata del anterior.

Opacidades de la córnea.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe E. de Zacatecas.

Calomel al vapor..... grm. 15. 00
Azúcar finamente pulverizada.. „ 15. 00
Sulfato de zinc..... „ 0. 15

Insuflaciones.

Para poner pequeñas insuflaciones:

Orquitis.

Dr. Eduardo Lamicq. México.

ORQUITIS BLENORRÁGICA.

Además del tratamiento local clásico

Agua..... grm. 120. 00
 Extracto fluido de pulsatila 5 gotas
 Jarabe simple..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. A. Diaz. San Antonio Tejas.

ORQUITIS BLENORRÁGICA.

Nitrato de plata..... grm. 4 00
 Éter nítrico alcoholizado..... „ 30. 00

Uso externo.

Para aplicar con un pincel sobre el escróton del testículo enfermo. Cuando se ha secado la solución, se cubre de algodón hidrófilo y se pondrá el suspensorio.

En las personas delicadas debe usarse antes una solución de nitrato de cocaina para evitar el dolor.

Si 24 horas después la enfermedad no ha cedido, se hará una nueva curación.

Después que ha caído la piel:

Acetato de plomo líquido..... grm. 30. 00
 Láudano Sydenhám..... „ 30. 00
 Agua destilada..... „ 440. 00

Fomentos.

Estos fomentos se aplicarán con algodón hidrófilo, cuidando de no dejarlos secar.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Tintura de gelcemiun..... 10 gotas
 Id. de acónito..... 10 gotas

Id. de amamelis..... grm. 1. 00
 Agua..... „ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora,

Otra.

Tintura de pulsatila..... 6 gotas.

Id. de anémona praten.... 6 gotas.

Agua..... grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otitis externa.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias, Coahuila.

OTITIS ULCEROSA.

Agua de alquitrán..... grm. 500. 00

Lavatorios.

Después insuflar polvos finos de ácido bórico.

Curación tres veces al día.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Agua..... grm. 200. 00

Sulfato de alumina..... „ 12. 00

Lavatorio.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe E. de Zacatcas.

Cocimiento de hojas de nogal.. grm. 250. 00

Ácido bórico..... „ 5. 00

Creolina..... „ 2. 50

Inyecciones.

Para poner inyecciones en la oreja.

Dr. Manuel Uribe

México.

EN LOS ESCROFULOSOS,

Agua destilada..... grm. 10. 00
 Ácido láctico..... „ 1. 00

Gotas para los oídos.

Dos gotas por la mañana y dos por la tarde, previo lavado antiseptico.

Oxiuros.

Dr. Pablo Amoris.

Tabasco.

Con un tubo de goma de Foucher de los que se usan para el lavado del estómago, se introducen cuatro ó cinco centigramos por el ano del enfermito que debe estar acostado, y por el embudo se hace entrar la mayor cantidad posible de agua tibia, hasta que el enfermo sienta dolores y gran necesidad de evacuar. Como el recto y una parte del intestino grueso han sido distendidos de una manera exagerada; al venir la contracción muscular del intestino se hace de una manera violenta la expulsión del agua y con ella de una gran cantidad de oxiuros. A continuación se pone una lavativa con dos ó tres cucharadas de aceite de hígado de bacalao y por la noche un supositorio con dos y medio ó cinco centigramos de unguento doble.

El lavado intestinal así como los otros medios pueden repetirse diariamente hasta que no existan ya pavantos en el intestino. El resultado con este tratamiento ha sido siempre muy satisfactorio.

Dr. Carlos Amezcua,

Tehuacán.

EN NIÑOS DE 1 Á 7 AÑOS.

Calomel..... grm. 0. 15
 Santonina..... „ 1. 00
 Azúcar..... „ 4. 00

En 10 papeles.

Un papel al levantarse y otro al acostarse.

Para mayores de 20 años, un papel más en la tarde

Ozena.

Dr. Guillermo Parra,

Tacubaya D. F.

Losiodol sódico en insuflaciones en la nariz y ioduro de fierro al interior.

Dr. Santos Medina.

Juchipila E. de Jalisco.

Agua destilada..... grm. 10. 00
 Ioduro de potasio..... „ 2. 00
 Glicerina redestilada..... „ 20. 00
 Ácido fénico..... „ VI gotas.
 Tintura de iodo..... „ V gotas.

Gotas para uso externo.

Aplíquese de tres á cinco gotas en cada fosa nasal, dos veces al día.

Dr. P. Gama

México.

Esperma de ballena..... grm. 1. 00
 Manteca de cacao..... „ 4. 00
 Óxido rojo y calomel de c. c..... „ 1. 50
 Aceite de cade verdadero..... „ 0. 50

Pomada..

Esta pomada se hará en forma de barra y se forra de estaño.

Antes de usar esta pomada, se lavarán las fosas nasales con solución de permanganato de potasa al 1 por ,000.

Dr. Ciro M. Santelices.	Querétaro.
Alcohol.....	gram. 100. 00
Ácido fénico.....	„ 5. 00
Naftol [beta].....	„ 5. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita en 500 gramos de agua para gerin-gatorios en las fosas nazales. Subiendo ó bajando la concentración del lavatorio según la tolerancia del enfermo.

Ácido bórico.....	gram. 3. 00
Polvo de café tostado.....	„ 3. 00
Cubeba.....	„ 3. 00
Alcanfor.....	„ 8. 00

Rapé.

Dr. Miguel Cordero.	México.
Bisulfato de quinina.....	gram. 1. 00
Salisina.....	„ 1. 00

En 3 Cápsulas.

Una cápsula cada 24 horas después del acceso.

En los niños la mitad de la dosis, aplicada en lava-tiva, en medio pozuelo de agua que debe contenerse.

Dr. Alfredo Higareda. Huejotzingo Puebla.
Ha visto que en Huatusco y pueblos comarcanos, los habitantes se curan las intermitentes con una plan-ta llamada *Tlancuaya* y ha visto enfermos que habían

sido tratados por las sales de quinina y las arsenica-les sin obtener resultados y que se han curado usan-do esta planta tomada en infusión ó cocimiento.

Dr. Luis L. Cordero.	San Luis Potosí.
Infusión de té verde.....	gram. 125. 00
Elixer de picosa.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Tintura de quina.....	gram. 30. 00
Vinagre aromático.....	„ 30. 00

Lociones frescas después del sudor.

Dr. Reyes G. Flores.	Guadalajara.
Bromhidrato de quinina.....	gram. 0. 20
Ácido tártrico.....	„ 0. 10
Agua destilada.....	„ 0. 20

Disuélvase al calor. Inyección que se conserva inal-terable.

Desinféctese la jeringa en solución de ácido bórico al 4 por ciento,

Una ó dos inyecciones diarias bastan para curar las intermitentes ordinarias.

En las formas perniciosas habrá que subir la dosis.

Dr. Carlos Amezcua. Tehuacán.

En la forma intermitente durante el acceso y cuan-do la temperatura sube á 40° 40°5 y 41°

Agua simple.....	gram. 600. 00
Bicarbonato de sosa.....	„ 45. 00

Acido cítrico..... „ 30. 00
 Jarabe de grosella c. b.

Pozuelos.

Un pozuelo cada media hora.

Agua de colonia..... grm. 60. 00
 Alcohol alcanforado..... „ 60. 00
 Tintura de mostaza..... „ 60. 00

Friega.

Friega en todo el cuerpo cada dos horas humedeciendo abundantemente todo el cuerpo con excepción de los órganos genitales y cubriendo al enfermo con cobertores de lana para provocar una sudación abundante que hace bajar la temperatura á 37°5 ó 37°

Dr. José Terrés. México.

En las calenturas palustres, usa siempre el clorhidrato de quinina, en dosis de un gramo diario para los adultos dividido en dos cápsulas. Tomar una cápsula en la mañana y otra en la tarde, cualquiera que sea la hora del acceso.

Rara vez doy grm. 1. 50 en tres cápsulas.

En las fiebres continuas palustres (tifo, malaria de algunos autores) doy cada dos horas ó cada una, según el caso, una cápsula que contiene grm. 0. 25 de antipirina y grm. 0. 25 de clorhidrato de quinina.

Dr. Antonio Butrón. Acapulco

En la combalecencia del paludismo.

Vino de genciana..... grm. 150. 00
 Extracto fluido de eucaliptus.. „ 10. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres horas.

Extracto de genciana..... grm. 1. 00
 „ „ nuez vómica..... „ 0. 10

En 10 píldoras.

Dos píldoras antes de la comida y dos antes de la cena.

Dr. José Luna.

Autlán.

FORMA TERCIANO Y CUARTANO.

Sulfato de magnesia..... grm. 40. 00
 Ácido tártrico..... „ 0. 50
 Sulfato de quinina..... „ 1. 00
 Agua..... „ 350. 00
 Jarabe de melizo..... „ 30. 00

100 gramos en ayunas.

Tintura de iodo..... grm. 10. 00
 Ioduro de potasio..... „ 0. 30
 Agua..... „ 100. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita tres veces al día en cocimiento de corteza de naranja.

PARA LA HIPERTERMIA.

Dr. Antonio Butrón.

Acapulco.

Antipirina..... grm. 2. 00
 Sulfato de quinina de Pelletier... „ 1. 20

En la forma ecláptica por hipertermia.

Jarabe de cloral de Follet..... grm. 60. 00
 Bromuro de potasio..... „ 6. 00
 Agua destilada..... „ 6. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora en los adultos, cucharadita en los niños.