

Dr. A. Matienzo. Tampico E. de Tamaulipas.

En los casos de impaludismo de forma intermitente normal, se siguen los preceptos de toda enfermedad aguda, reposo en la cama, bebidas aromáticas y dieta. Pero observa frecuentemente que el estado de calor se prolonga, que la piel permanece seca y el dolor de cabeza intenso; en este caso la intervención se hace necesaria y nada dá mejores resultados que los diaporéticos para favorecer el tercer periodo de sudor con que termina el acceso.

Acetato de amoniaco.....	gram.	1. 00
Jarabe de menta.....	„	15. 00
Infusión de serpentaria.....	„	60. 00
Láudano de Sidenham.....	XV gotas.	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora en una taza de té ó de borraja, con un poco de cognac.

Esta fórmula se puede emplear en todos los estados febriles donde se presenta la misma indicación.

Cuando el estado de calor se prolonga, se hace indispensable la administración de la quinina, que como mejores resultados dá, es asociada á la antipirina en esta forma.

Sulfato de quinina.....	gram.	1. 00
Antipirina.....	„	0. 50
Dower (polvo de).....	„	0. 30

Para 2 cápsulas.

Una cada hora sin parar de esta dosis en 24 horas.

Repitiendo la fórmula al día siguiente si fuere necesario.

Dr. J. M. Irys. San Juan Bautista E. de Tabasco.

Agua.....	gram.	200. 00
Sulfato de quinina.....	„	2. 00
Ácido cítrico.....	„	2. 00
Ioduro de potasio.....	„	2. 00

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día.

Esta fórmula da muy buenos resultados en la forma crónica de impaludismo con infarto notable del vaso y del hígado.

Dr. Rafael Zapien. Tonalá Chiapas.

FORMA REMITENTE.

Calomel al vapor.....	gram.	0. 10
Polvos de Dower.....	„	0. 50
Azúcar de leche.....	„	1. 00

En 10 papeles

Un papel cada hora.

En los niños se reduce á la mitad el calomel y el polvo de Dower según la edad.

Cuando hay hipertermia,

Ácido salicílico.....	gram.	3. 00
Antipirina.....	„	1. 00
Acetato de amoniaco líquido....	„	10. 00
Agua.....	„	75. 00
Jarabe.....	„	10. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada media hora y cuando la temperatura ha bajado á 38° se darán cada hora.

Vinagre.....	} de c. c. partes iguales.
Alcohol á 21°.....	
Agua.....	

Lociones calientes en todo el cuerpo hasta que baje la temperatura.

- Cuando toma la forma intermitente se darán las sales de quinina.

Dr. P. Peña. Zamora E. de Michoacán.

EN LA FORMA REMITENTE.

Baños salados de 5 á 10 minutos de duración, y de 20° á 25° centígrados de temperatura diariamente. La cantidad de sal común (cloruro de sodio) por baño, es de 6 litros para la cantidad de agua que comunmente se usa para un baño.

Dr. M. J. Ocampo. Pinos E. de Zacatecas.

FORMA INTERMITENTE.

Extracto fluido de pambotano.. grm. 30. 00
Tres tomas.

La primera procurando que sea antes del acceso. Las tomas se darán en un poco de té limón.

Dr. F. Blazquez. México.

Además de los medios conocidos, usa el pambotano en cocimiento: tres posillos en el día, ó en tintura, tres cucharadas en el día.

Dr. Manuel Valdés y Díaz. Paso de Ovejas E. de Veracruz.

TUMEFACIÓ DEL VASO.

Ferrocitrato de quinina. grm. 4. 00
Extrato de genciana. „ 4. 00

Para 60 píldoras.

Cuatro píldoras antes de las comidas.

Dr. Guillermo Parra. Tacubaya D. F.

Especialmente en las formas neurálgicas rebeldes á los otros tratamientos.

Agua..... grm. 250. 00

Extracto fluido de gelcemiún.. XV gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Extracto fluido de contrayerba.. grm. 15. 00

Gotas.

Quince gotas tres veces al día.

Dr. R. Ruiz.

Salvatierra.

FORMA INTERMITENTE.

Clorhidrato ó sulfato de quinina

de 0. 80 á..... grm. 1. 00

Extracto tebaico..... „ 0. 05

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora durante el acceso y en sus intervalos.

CAQUEXIA PALÚDICA.

Clorhidrato ó sulfato de quinina. grm. 1. 00

Arceniato de sosa..... „ 0. 003

Extracto de opio..... „ 0. 05

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. R. Martínez Carriedo.

México.

FORMA INTERMITENTE.

Cocimiento de hojas de naranjo grm. 150. 00

Cognac..... „ 20. 00

Sulfato de quinina.....	„	1. 00
Tintura de quina.....	„	2. 00
Láudano de Sydenham.....	X gotas.	
Jarabe de limón ó de naranja..	grm.	30. 00

2 tomas.

Una en ayunas y otra al acostarse.

Hágase vomitar antes al paciente.

Dr. F. M. Arroyo. Irapuato E. de Guanajuato.

REBELDE.

Agua destilada.....	grm.	100. 00
Arseniato de sosa.....	„	0. 05

Cucharadas.

Dos á tres cucharadas en el día.

PALUDISMO.

Dr. Francisco Fernández.—Medellín E. de Veracruz.

Sulfato de quinina.....	grm.	2. 00
Polvo de ruibarbo.....	„	2. 00
Fierro reducido al hidrógeno....	„	1. 00
Polvo de opio.....	„	0. 20

En 40 píldoras.

Dos píldoras en la mañana y dos en la tarde.

Dr. Ramón Ponce de León. Culiacán E. de Sinaloa.

FORMA INTERMITENTE COMÚN.

Clorhidrato de quinina.....	grm.	1. 20
Acido arsenioso.....	„	0. 003 ^{mligrs.}

Para 12 píldoras.

Cuatro píldoras despues del acceso y cuatro dos horas antes del nuevo.

Forma remitente ó intermitente de forma subintrante.

Se usa la misma fórmula y solamente se varía la forma de administrarla, dando dos píldoras cada tres horas hasta vencer la fiebre cualquiera que sea la duración de la enfermedad.

Dr. L. Arroyo.

San Angel D. F.

FORMA INTERMITENTE.

Cocimiento fuerte de fresno: medio pozuelo endulzado al empezar el acceso y otro medio pozuelo al terminar.

Sacar todos los días al enfermo al aire libre, con buen tiempo y á buena hora.

Para adultos, dosis doble.

Dr. M. Mucél.

México.

EN LOS NIÑOS.

Jarabe de diacodión de 5. 00 á..	grm.	10. 00
„ „ azahar de 10. 00 á.....	„	20. 00
Bromhidrato de quinina de 0. 20 „	„	0, 60

3 tomas.

Para tomarlo en veinticuatro á treinta y seis horas.

Cuando la quinina no es tolerada ó es infiel, dá el elixir de picosa del Sr. Lazo de la Vega, siguiendo las indicaciones de su autor.

Los pozuelos laxarán un poco el vientre.

Por alimento té con leche cada dos horas.

Reposo en la cama y abrigo.

Al día siguiente:

Floritzina.....	gram.	1. 00
Bromhidrato de quinina.....	„	1. 20
Polvos de Dower.....	„	1. 00

Para 12 píldoras.

Cuatro píldoras al levantarse, cuatro á las once de la mañana y cuatro á las cinco ú ocho de la noche.

Limonada vinosa á pasto.

Reposo en la cama.

El enfermo repetirá las píldoras dos ó tres días y s el acceso se repite, tomará á las once de la mañana ó á las cuatro de la tarde.

Agua.....	gram.	180. 00
Ácido cítrico.....	„	15. 00
Bicarbonato de sosa.....	„	25. 00
Jarabe de grosella.....	„	60. 00

Bebida.

Para tomarla en una sola vez.

Cuando el enfermo está minado en su constitución por la repetición de los accesos y que sus funciones digestivas están debilitadas.

Sulfato de quinina.....	gram.	1. 00
Carbonato de fierro.....	„	0. 50
Polvos de Dower.....	„	0, 30
„ de ruibarbo.....	„	0. 30

Para 20 píldoras.

Seis píldoras en el día.

En la combalecencia.

Vino de quina.....	gram.	90. 00
Tintura alcohólica de nuez vómica.....	„	2. 00

Licor arcenial de Towler.....	„	2. 00
Tintura de canela.....	„	4. 00

Cucharaditas.

Dos ó tres cucharaditas repartidas en el día.

Cuando se asocian el paludismo y el alcoholismo.

Agua.....	gram.	400. 00
Sal de Seignette.....	„	45. 00
Bitartrato de potasa.....	„	35. 00

Jarabe c. b.

2 tomas.

Una toma en la mañana y otra en la tarde. En las formas anómalas y rebeldes si no ceden con la floritzina y sales de quinina asociadas con las laxantes y bebidas alcalinas. Sin dejar éstas se usará de la solución arsenical de Towler 10 gotas una vez al día, aumentando una gota cada día hasta llegar á 15 ó 20 gotas si el enfermo las tolera.

En la forma intermitente franca y que no ha cedido con los medios anteriores, ha dado buen resultado lo siguiente.

Jarabe de menta.....	gram.	90. 00
Extracto de ruibarbo.....	„	5. 00
Tintura de alves.....	„	10. 00
„ „ genciana.....	„	8. 00
„ „ cuasia.....	„	8. 00

Cucharaditas.

Tres cucharaditas en el día.

Agregando en algunos casos el licor de Towler. La alimentación debe reducirse en todo caso á dieta de

leche con té ó café, hojas de naranjo ó té limón. Se debe prohibir el uso de las grasas.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

FORMA INTERMITENTE.

Extracto de quina.....	gram.	0. 75
Sulfato de quinina.....	"	0. 60
Extracto de valeriana.....	"	0. 10
Alcanfor pulverizado.....	"	0. 05

Para 12 píldoras.

Una píldora cada dos horas con una cucharada de vino de Málaga.

Otra.

Cocimiento de hojas de euca- liptus.....	gram.	150. 00
Jarabe de azahar.....	"	30. 00
Sulfato de quinina.....	"	1. 50
Ácido tártrico.....	"	0. 75

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Erasmo O. Romero. Ozuloama.

FORMA PERNICIOSA ATAXODINÁMICA.

Agua destilada.....	gram.	3. 00
Clorhidrato de quinina.....	"	1. 20
Licor de Towler.....	"	0. 15

Una inyeccion hipodérmica.

Dr. Antonio G. Guzmán. H. Matamoros.

Sal de Pelletier.....	gram.	1. 00
Antipirina.....	"	0. 50

Para 6 cápsulas.

Una cápsula cada hora.

Otra.

Sal de Pelletier.....	gram.	1. 00
Extracto de opio.....	"	0. 02

En 4 cápsulas

Una cápsula cada media hora.

Dr. David Peña. Monterrey.

Cloruro de quinina.....	gram.	1. 00
Salicilato de cinchonidina.....	"	1. 00
Codeina.....	"	0. 05

En 12 cápsulas.

Dr. José B. López. Campeche.

Sal de Pelletier.....	gram.	4. 00
Subcarbonato de fierro.....	"	4. 00
Ruibarbo en polvo.....	"	4. 00

En 40 píldoras.

Dos píldoras diarias.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Polvo de simaba cedrón.....	gram.	1. 50
Vino jeréz.....	"	40. 00

2 tomas.

Una toma en la mañana y otra en la tarde.

Debe continuarse su uso por ocho días.

Es tan eficaz como la quinina si se tiene cuidado de usar semillas bien maduras. Si el enfermo es delicado

del estómago debe añadirse tres ó cuatro gotas de láudano.

Otra.

Cedrina..... gm. 0. 005
Extracto de opio..... „ 0. 01

En 5 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. Ramón Velasco. Tequila.

FORMA CRÓNICA.

Extracto de genciana..... gm. 1. 00
Ferrocitrato de quinina..... „ 1. 20
Acido arsenioso..... „ 0. 015

En 10 píldoras.

Una píldora diaria en la comida.

Dr. E. M. González. Tequila.

PRESERVATIVO.

Extracto fluido de quebracho... gm. 10. 00
„ „ „ quina..... „ 10. 00
Licor de Towler..... „ 10. 00

Gotas.

De 10 á 20 gotas diarias.

Dr. Arcadio F. Ojeda. Veracruz.

FORMA PERNICIOSA.

Agua destilada..... gm. 2. 00
Clorhidrato de quinina..... „ 1. 00

Inyecciones hipodérmicas.

Disolverla por el calor en el momento de usarla, para consumirse en tres inyecciones que se reparten

en las 24 horas del día. Las inyecciones deben ser intramusculares.

EN LOS NIÑOS.

Agua..... gm. 60. 00
Alcohol..... „ 60. 00
Acido tártrico..... „ 3. 00
Sulfato de quinina..... „ 2. 00

Friega.

Friega cada cuatro horas.

Esta fórmula es útil hasta dónde lo permite la poca absorción de la piel.

En la forma remitente es útil desinfectar el intestino con purgante y lavativas.

Agua..... gm. 120. 00
Creolina..... „ 0. 20

Lavativa.

Palpitaciones.

Dr. Valdéz y Díaz.—Paso de Ovejas E. de Veracruz.

Polvo de digital..... gm. 0. 60
Valerianato de cafeina..... „ 1. 00
Extracto tebaico..... „ 0. 05

En 12 píldoras

Tres píldoras en el día.

Dr. D. Molinar Parral.

Agua de azahar..... gm. 120. 00
Acetato de amoniaco..... „ 4. 00
Láudano de Sydenham..... 20 gotas.
Jarabe de éter..... gm. 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora: