

del estómago debe añadirse tres ó cuatro gotas de láudano.

Otra.

Cedrina..... gm. 0. 005  
Extracto de opio..... „ 0. 01

*En 5 píldoras.*

Una píldora cada dos horas.

Dr. Ramón Velasco.

Tequila.

FORMA CRÓNICA.

Extracto de genciana..... gm. 1. 00  
Ferrocitrato de quinina..... „ 1. 20  
Acido arsenioso..... „ 0. 015

*En 10 píldoras.*

Una píldora diaria en la comida.

Dr. E. M. González.

Tequila.

PRESERVATIVO.

Extracto fluido de quebracho... gm. 10. 00  
„ „ „ quina..... „ 10. 00  
Licor de Towler,.. „ 10. 00

*Gotas.*

De 10 á 20 gotas diarias.

Dr. Arcadio F. Ojeda.

Veracruz.

FORMA PERNICIOSA.

Agua destilada..... gm. 2. 00  
Clorhidrato de quinina..... „ 1. 00

*Inyecciones hipodérmicas.*

Disolverla por el calor en el momento de usarla, para consumirse en tres inyecciones que se reparten

en las 24 horas del día. Las inyecciones deben ser intramusculares.

EN LOS NIÑOS.

Agua..... gm. 60. 00  
Alcohol..... „ 60. 00  
Acido tártrico..... „ 3. 00  
Sulfato de quinina..... „ 2. 00

*Friega.*

Friega cada cuatro horas.

Esta fórmula es útil hasta dónde lo permite la poca absorción de la piel.

En la forma remitente es útil desinfectar el intestino con purgante y lavativas.

Agua..... gm. 120. 00  
Creolina..... „ 0. 20

*Lavativa.*

### Palpitaciones.

Dr. Valdéz y Díaz.—Paso de Ovejas E. de Veracruz.

Polvo de digital..... gm. 0. 60  
Valerianato de cafeina..... „ 1. 00  
Extracto tebaico..... „ 0. 05

*En 12 píldoras*

Tres píldoras en el día.

Dr. D. Molinar

Parral.

Agua de azahar..... gm. 120. 00  
Acetato de amoniaco..... „ 4. 00  
Láudano de Sydenham..... 20 gotas.  
Jarabe de éter..... gm. 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora:

**Parálisis intestinal.**

Dr. F. Blasquez.	México.
Podofilina.....	gram. 0. 20
Extracto de nuez vómica.....	„ 0. 20
„ „ belladona.....	„ 0. 05

*Para 20 píldoras.*

Una píldora cada hora.

**Papilomas corneas.**

VULGARMENTE LLAMADOS MEZQUINOS.

Dr. Fernández Ortega Tacubaya D. F.

Las berrugas, los condilomas ó vegetaciones en general contra todas las afecciones neoplásicas que tienen su asiento anatómico en las capas superficiales de la piel, se obtienen los mejores resultados, usando bajo la forma de extracto fluido las semillas de stafiragra, á la dosis de diez gotas tres veces al día en el adulto.

Dr. Leonardo Gómez.	Tenango E. de México.
Agua.....	gram, 500. 00
Semillas de estafiragra.....	„ 5. 00
Hacer un cocimiento hasta reducirlo á	gram, 400. 00

*Cucharadas.*

(1) Una cucharada en la mañana y otra en la noche

Dr. L. Longitud. Tenancingo.

Agua destilada.....	gram. 2. 00
Acido crómico.....	„ 2. 00

*Toques.*

Un toque diario hasta que se convierta en escara.

(1) Esta formula la usó por primera vez el Dr. Ignacio Berruero, y su eficacia la ha podido comprobar el Dr. Gómez en el pueblo de Jalapa en la que la mayor parte de sus habitantes tenían mezquinos.

Dr. Antonio J. Carbajal.

México.

Aceite de cade c. b.

*Toques.*

Un toque cada tercer día. Suele bastar con uno solo. Este medicamento es seguro y tiene las ventajas siguientes: es indoloro. No se reproducen las escresencias. Hay que estar seguro de la pureza del aceite para garantizar su éxito.

**Parálisis agitante.**

Dr. M. Mucél.

México.

Usa el hava del Calavar á dosis convenientes.

**Parásitos.**

Dr. Tobías Núñez.

México.

El alcanfor como parasitífida.

El alcanfor sin tener los inconvenientes de las preparaciones mercuriales, destruye eficazmente los parásitos que atacan al hombre y que se fijan de preferencia en los lugares en los que la piel está cubierta de polvo, tales como la piel de la cabellera, la del plubio y escroto, así como de las oxilas. Incorporado el alcanfor con un cuerpo graso, tal como la manteca lavada, la vaselina, la lanolina etc. en la proporción de diez partes de alcanfor por cien partes de grasa, se obtiene una preparación eficaz para destruir los parásitos. Para que el alcanfor obre con más prontitud se deberá recomendar que las personas se laven antes las partes en donde se vá á aplicar la medicina con agua tibia y jabón, dando la preferencia al jabón fenicado si les es fácil conseguirlo. El mudarse la ropa

interior es otra precaución que debe tomar la persona, para verse pronto libre de estos parásitos. Empleando este tratamiento en dos ó tres días queda la persona enteramente curada.

El unguento doble es una de las preparaciones mercuriales mas usadas como microbicida, no solo por el vulgo, sino aún muy frecuentemente recomendada por los médicos. Es un hecho que obra eficazmente destruyendo á los parásitos, pero al mismo tiempo tiene los inconvenientes de producir la hidrargiria, sobre todo en la piel fina del escroto y axilas, así como la estomatitis cuando se aplica en personas en las que con facilidad se hace la absorción del mercurio. Las preparaciones de alcanfor son muy útiles para emplearlas en los Hospitales, Asilos, Colegios, Cuarteles etc. para mantener á los asilados en un estado de aseo satisfactorio siendo al mismo tiempo estas preparaciones muy poco costosas, pudiendo ser hechas en los mismos establecimientos.

### **Parescias.**

Dr. M. Mucél. México.

Emplea con éxito la tintura alcohólica de polvo de palo del mulato al interior y al exterior. Aún en la parálisis de origen central, las ha visto mejorarse notablemente.

La tintura se prepara con el leño y su corteza en la proporción de 1 á 4.

Al interior de diez á ochenta gotas aumentando progresivamente, y al exterior en fricciones tres veces al día sobre las partes paralizadas.

### **Pediculi pubis.**

Dr. M. Carmona y Valle. México.

Manteca lavada ..... grm. 60. 00

Alcanfor ..... „ 10. 00

*Pomada.*

Fricciones dos veces al día en los puntos invadidos y baño diario, cambiando la ropa. En uno ó dos días desaparecen los parásitos.

### **Pelagra.**

Dr. F. Valdéz. Batopilas E. de Chihuahua.

Lociones al uno por mil de bicloruro de mercurio en alcohol y en seguida vaselina fenicada al 2%

Curación diaria.

Al interior medicación arsenical y tónica.

### **Peritonitis.**

Dr. C. Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Embrocaciones en el vientre con ictiol á la dosis de grm. 30. 00 por embrocación.

Dr. M. Mucél. México.

Combatir la causa si es posible.

Al interior calomel á dosis refracta, unido al extracto de opio. Hielo al interior y al exterior sin suspenderlo para nada: pomada narcótica y en último extremo vegigatorio de cantaridato de sosa.

Dr. Jesús H. Treviño. Monterrey.

Empacar el vientre con una capa de ácido salicílico en polvo.

**Piquete de alacranes y en general de todo animal ponzoñoso.**

Dr. Francisco M. Palacios.—Bramador E. de Jalisco.

Agua destilada.....	gram.	150. 00
Ioduro de potasio.....	„	1. 00
Bromuro de potasio.....	„	4. 00
Licor de Vanswieten.....	„	20. 00

Tómese la mitad de una sola vez, ó en cucharadas continuadas y al cabo de quince minutos, si no hay mejoría notable, tómese un sudorífico de infusión de hojas de jaborandi. Terminando el sudor aplíquese la otra mitad de la poción de una vez ó en cucharadas continuadas.

Hay más de 300 casos en que se ha usado ésta fórmula, y la estadística dá el 1 % de mortalidad.

Hay que recordar que la estadística de los otros procedimientos, dá el 20 ó 25% de mortalidad.

En estos 300 casos, están comprendidos niños, algunos recién nacidos y otros menores de 7 años y las observaciones son tomadas en las costas del Pacífico, en donde abundan y son tan temibles los animales ponzoñosos.

**Piquetes de alacran.**

Dr. R. Ortega. C. Porfirio Díaz.

Un centígramo de clorhidrato de pilocarpina en inyección hipodérmica.

Dr. Alfredo Higareda. Huejotzingo Puebla.

Ha usado con éxito la fórmula del Dr. Isauro Guerrero.

Agua de azahar.....	gram.	120. 00
Bromuro de potasio y sodio de c. c.....	„	4. 00
Almizcle.....	„	0. 30
Morfina.....	„	0. 05

*Cucharadas.*

Una cucharada cada cuarto de hora, despues cada media hora y despues cada hora según vayan mejorando los síntomas.

Dr. Márcos Mozari. Mineral de Huautla E. de Morelos.

Agua.....	gram.	120. 00
Bromuro de potasio.....	„	4. 00
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 05
Jarabe de cloral...	„	40. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora hasta que el enfermo se duerma.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Polvo de simava cedrón.....	gram.	2. 00
Agua destilada.....	„	400. 00
Hágase infusión y añádase Jarabe simple.....	„	30. 00

*Medios pozuelos.*

Un medio pozuelo cada hora.

**Pitiriaris.**

PITIRIARIS DEL CUERO CABELLUDO.

Tirrol puro.....	gram.	1. 00
------------------	-------	-------

Biborato de sosa .....	„	6. 00
Agua de colonia .....	„	200. 00

*Lociones.*

Dos veces al día.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

PITIRIARIS VERSICOLOR.

Protoioduro de mercurio .....	gm.	0. 15
Extracto de guayacan .....	„	0. 30
Id. de opio .....	„	0. 05

*Para 8 píldoras.*

Una píldora tres veces al día.

Nitrato de potasa .....	gm.	8. 00
-------------------------	-----	-------

*En 8 papeles.*

Un papel en la mañana y otro en la tarde.

Como tópico pomada de calomel.

**Placas mucosas.**

Dr. Eduardo Lamicq.

México.

Agua destilada .....	gm.	30. 00
Ácido crómico .....	„	1. 00

*Toques.*

Tres veces al día.

No causan dolor, se limpian y cicatrizan rápidamente las placas.

Aplicar el tratamiento interior antisifilítico.

Dr. Federico Cota. La Paz Baja California.

Papaina .....	gm.	2. 00
Glicerina neutra .....	„	10. 00

Alcohol alcanforado .....	„	5. 00
Ácido fénico .....	„	3. 00

*Toques.*

Tocar las placas con un pincel.

**Pleuresía.**

Dr. Vicente Sierra. (1).

Apam.

EL PRIMER DIA.

Agua hirviendo .....	gm.	150. 00
----------------------	-----	---------

Hojas de javorandi .....	„	5. 00
--------------------------	---	-------

Hágase infusión, fíltrese y endúlcese para tomarla de una sola vez.

Si el enfermo suda abundantemente se puede asegurar que no había derrame en la pleura.

Si el dolor es muy agudo, sanguijuelas en el lugar del dolor y preparaciones opiadas al interior.

Dr. G. Chávez.

Tasco.

Extracto de digital .....	grm.	0. 20
---------------------------	------	-------

Infusión de sauco y guayacan .....	„	125. 00
------------------------------------	---	---------

Jarabe de éter .....	„	30. 00
----------------------	---	--------

*Cucharaditas.*

Una cucharadita cada hora.

Dr. E. Gutiérrez.

Guadalupe, E. de Zacatecas.

Para el dolor y accesos disneicos, inyecciones subcutáneas de morfina de 0. 01 á 0. 02 centigramos: vengigatorio de cantaridato de sosa. Purgante en la declinación de la enfermedad.

(1) El Doctor Sierra ejerce en un lugar en que la pleuresía es muy frecuente y en 31 años no ha visto formarse un derrame aplicando su tratamiento.

Dieta láctea.—Punción en los vastos derrames.

Infusión pectoral.....	gram.	120. 00
Acetato de potaza.....	"	12. 00
Salipirina.....	"	4. 00
Tintura de digital.....	"	4. 00
Jarabe gomoso.....	"	30. 00

*Cucharadas.*

Una cada hora.

EN EL SEGUNDO PERIODO.

Infusión de polígala.....	gram.	100. 00
Ioduro de potasio.....	"	3. 00
Jarabe de codeína.....	"	30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Dr. José B. López	Campeche.
Polvo de Dower.....	gram. 1. 20
Kermes mineral.....	" 0. 30

*En 12 papeles.*

Un papel cada hora.

Dr. Emilio Polo.	Puebla.
------------------	---------

DOLOR PLEURAL.

Tintura de asclepias tuberosa.....	12 gotas
Agua.....	gram. 120. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Dr. Federico Cota.	La Paz, Baja California.
--------------------	--------------------------

PLEURESÍA CON DERRAME.

Vegigatorio amplio.—Sudoríficos.—Dieta láctea.—  
Ioduro de potasio y régimen tónico.

### **Pleuroneumonía.**

Dr. M. Medal.	Tacámbaro. E. de Michoacán.
Polvo de ipecacuana de 1. 30 á..	gram. 2 00
Agua.....	" 500. 00

*En tres tomas*

Una cada cinco minutos.

Cocimiento fuerte de tabachín y tilia.....	gram. 350. 00
Clorato de potasa de 0. 30 á...	" 1. 20
Jarabe tebaico.....	" 30. 00

*Cucharadas.*

Cuatro cucharadas cada media hora hasta la sudación y si es necesario ventosas escarificadas.

### **Pleurodinia.**

Dr. E. Gutiérrez.	Guadalupe. E. de Zacatecas.
Agua de azahar.....	gram. 100. 00
Ioduro de potasio de 2, 00 á...	" 3. 00
Salicilato de sosa.....	" 5. 00
Jarabe de codeína.....	" 50. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Exteriormente friegas narcóticas.

Dr. David Peña.	Monterrey.
Salicilato de sosa.....	gram. 6. 00
Ioduro de sodio.....	" 4. 00
Tintura de hojas de jaborandi...	" 20. 00
Hidrolado de menta.....	" 100. 00

*Cucharadas.*

Tres cucharadas por día durante 8 ó 15 días á lo más.

Dr. Emilio Polo.	Puebla.
Tintura de cemífuga recamosa.. grm. 0. 50	
Id. ranúnculas vulbosus..... „ 050	
Agua destilada..... „ 120. 00	

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

**Podredumbre de hospital.**

Dr. Tobias Núñez. México.

Esta complicación de las heridas se presenta bajo dos formas: la pulposa y la ulcerosa; la primera es la más frecuente. Aun cuando varios factores contribuyen á su desarrollo, no cabe la menor duda que la falta de aseo en las curaciones, es el factor principal para su desarrollo. Antes de que se emularan las curaciones anticépticas actualmente en uso, era en los servicios atendidos por malos practicantes y médicos abandonados en los que con más frecuencia se veía la podredumbre.

Esta complicación es fácil de diagnosticar: basta haberla visto una sola vez para no desconocerla.

El empleo de la anticéptica quirúrgica ha hecho desaparecer este complicario.

Entre los muchos agentes terapéuticos recomendados para combatir, tenemos tres muy eficaces, que siendo bien empleados curan prontamente esta complicación. Estos son: el aceite esencial de trementina, el nitrato ácido de mercurio y el cauterio actual.

El aceite esencial de trementina es el que debe emplearse generalmente, sobre todo cuando la podredumbre ha invadido el tejido celular subcutáneo é in-

termuscular, produciendo vastos desprendimientos de la piel, é infiltrándose en los intersticios musculares.

Debe cuidarse que el aceite se ponga en contacto con todos los tejidos atacados por la podredumbre, lavando bien la herida con este líquido y empapando en él las piezas de la curación que se han de aplicar inmediatamente sobre ella. Unas cuantas curaciones hechas con el aceite esencial de trementina, son suficientes en el mayor número de casos para que esta complicación desaparezca.

En los casos en que el aceite no diere resultado después de unas cuatro ó cinco aplicaciones, se podrá recurrir al nitrato ácido de mercurio que obra con más energía. Esta preparación tiene el inconveniente de absorberse con facilidad el mercurio y de producir la estomatitis y otras manifestaciones de su absorción. Esto se observa cuando el nitrato se aplica sobre superficies estensas que han sido invadidas por la podredumbre. En estos casos su empleo lo creo contraindicado debiendo emplearse el aceite esencial de trementina, ora solo ó bien ayudado del termocauterio.

En cuanto á este último agente raras veces está indicado, pues sólomente en los casos rebeldes que no cedan á los dos primeros medios recomendados, estará indicada su aplicación, ya sea solo ó bien ayudando con su empleo, la aplicación de cualquiera de los otros dos agentes terapéuticos.

*El aceite esencial de trementina* bien manejado, rara vez falla, por consiguiente el empleo de los otros dos agentes, tiene que ser excepcional.

Debe tenerse presente que para obtener el resultado favorable que se expresa de estos dos líquidos, es necesario separar primero las falsas membranas, lo que se consigue desprendiéndolas por medio de una espátula ó de una legra.

### Polvos dentríficos.

Dr. Alberto Aizpuru.	México.
Carbonato de magnesia.....	gram. 10. 00
Carbón porfirizado.....	„ 30. 00
Polvo de quina roja.....	„ 30. 00
Esencia de menta c. b.	

#### *Polvos dentríficos.*

En las enfermedades parasitarias de la boca.

Dr. Adrian de Garay.	México.
Carbón de tortilla finamente pulverizado.....	gram. 10. 00
Quina roja pulverizada.....	„ 2. 00
Clorato de potasa en polvo.....	„ 2. 00
Carbonato de cal.....	„ 2. 00
Salol.....	„ 1. 00
Esencia de menta.....	6 gotas.

#### *Polvos dentríficos.*

### Porriño de calvans.

Dr. Lázaro Ortega.	México.
Vaselina.....	gram. 30. 00
Veratrina.....	„ 0. 10
Óxido rojo de mercurio.....	„ 1. 00

#### *Pomada.*

### Postemillas.

Dr. M. Villaseñor. Pénjamo. E. de Guanajuato.

Se curan violentamente con aplicaciones locales de bicarbonato de sosa en polvo.

### Pomada antioftálmica.

Dr. F. Zárraga	México.
Pomada de nitrato de mercurio..	gram. 30 00
Óxido rojo de mercurio porfirizado.....	„ 2. 00
Aceite de almendras dulces c. b. para mezclar.	

#### *Pomada.*

### Pociones.

Dr. F. Zárraga	México.
POCIÓN GALACTÓGEGA.	
Infusión de borraja.....	gram. 300. 00
Extracto acuoso de galega oficial.....	„ 2. 00
Jarabe simple.....	„ 40. 00

#### *Tres tomas.*

Una toma en la mañana otra en la tarde y otra en la noche.

### Preservativo.

Dr. Luis R. Ruiz. Texcoco. E. de México.

Recomienda como preservativo en general, para las enfermedades contagiosas, el extracto de cucalíptus en aspiraciones.

### Pruritu.

#### GENERAL Y PARCIAL.

Dr. E. Lier.	México.
Lanolina.....	gram. 50. 00
Vaselina.....	„ 20. 00

Agua.....:	.....	”	30. 00
Mentol.....	.....	”	5. 00

*Pomada.*

## PRURITO DE LA VULVA.

Dr. Ciro M. Santelices.	Querétaro.
Bicloruro de mercurio.....	gram. 1. 00
Agua.....	” 1000. 00
Alcohol.....	” 40. 00

*Defensivos.*

Dr. David Peña.	Monterrey.
Ácido salicílico.....	gram. 6. 00
Carbonato de potasa.....	” 2. 00
Agua de Florida.....	” 200. 00

*Fricciones.*

Dr. Adrian de Garay.	México.
----------------------	---------

## PRURITO DE LA VULVA Y EL ESCROTO.

Aceite de almendras dulces....	gram. 16. 00
Aceite de cade.....	” 4. 00
Clorhidrato de cocaina.....	” 0. 50

*Uso externo.*

Lavar dos veces al día las partes enfermas con agua y jabón de ictiol y después untarse el aceite marcado uso externo.

**Prúrrigo.**

Dr. E. Lier.	México.
Alquitrán y	
Espíritu de éter de c. c.....	gram. 25. 00

*Uso externo.*

Baños con sal y al interior. Antipirina 0. 50 por día.

**Pulmones débiles.**

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

## EN LAS PERSONAS PROPENSAS A LA TÍISIS.

Calomel. ....	gram. 1. 00
Polvol de azúcar c. b.	

*En 20 papeles.*

Ioduro de sodio.....	gram. 5. 00
Infusión de corteza de naranja... ..	” 500. 00
Jarabe de id. id. ....	” 40. 00
Láudano Sydenham.....	” 1. 00

*Cucharadas núm. 1*

Jarabe de maguey manso.....	gram. 150. 00
-----------------------------	---------------

*Cucharadas núm. 2.*

Tintura de iodo iodurada.....	gram. 100. 00
-------------------------------	---------------

*Uso externo.*

Comenzar con los papeles uno todos los días hasta acabar los 20 ó hasta que se toquen las encías. Se dejan pasar tres ó cuatro días sin tomar medicina y el cuarto ó quinto día se empiezan á tomar las cucharadas marcadas con el núm. 1, cuatro cucharadas todos los días hasta terminar la dosis prescrita. Luego se comienzan las cucharadas marcadas con el núm. 2, una todas las noches á la hora de acostarse, hasta terminar la dosis. Se dejan cuatro ó cinco días de descanso y se vuelve á repetir el método.

Todo el tiempo del tratamiento debe aplicarse la fórmula. Uso externo en las partes débiles ó amenazadas.

**Purgantes.**

Dr. M Alfaro

México.

PURGANTE PARA NIÑOS DE UN AÑO EN ADELANTE.

Emulsión de almendras dulces y  
 jarabe de azahar de c. c. .... grm. 40. 00  
 Aceite de cróton ..... 1. gota.  
*Cucharaditas.*

Cucharadita cafetera cada hora hasta obtener el efecto.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

PURGANTE PARA NIÑOS.

Aceite de ricino ..... grm. 45. 00  
 Alcohol ..... " 15. 00  
 Glicerina neutra ..... " 10. 00  
 Esencia de menta ..... 3 gotas.

*Purgante.*

Purgante para los Campesinos pobres.

Dr. Gonzálo Farias.

San Luis Potosí.

De 15 á 30 gramos de semillas de datil reducidas á polvo grueso para hacer un cocimiento que se filtra y endulza.

**Púrpura.**

Dr. M. Mucél.

México.

Cocimiento de hojas de nogal y cocimiento de quina. Estricnina y limonadas vegetales.

**Pústula maligna.**

Dr. D. Molinar.

Parral.

Cataplasmas de hojas de nogal, despues de haber cauterizado á la profundidad de uno y medio centímetros toda la pústula.

Dr. Octaviano León Navarro.

Tangantzicuaró.

En cuanto el diagnóstico es posible, se hará la cauterización con una lente por medio de los rayos solares, dirigiendo el foco al centro gangrenoso hasta carbonizarlo y en seguida se aplicará:

Alcohol á 60° ..... grm. 120. 00  
 Alcanfor ..... " 30. 00  
 Ácido fénico ..... " 7. 00

*Uso externo.*

En lienzos de lino empapados en este líquido, se aplicarán directamente sobre la pústula y se cubre todo con cataplasmas de zanahoria ó de malva ó de yerba mora. La curación se repite varias veces al día.

Al siguiente día se repite la cauterización respetando los tejidos sanos. Lo mismo se hace el tercer día.

Como en estos días empiezan las manifestaciones generales, debe usarse la siguiente medicación interna.

Clorato de potasa ..... grm. 4. 00  
 Agua destilada ..... " 100. 00  
 Jarabe de goma arábica ..... " 20. 00  
 Jugo de limón ..... 10 gotas.

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Aceite de olivo ..... grm. 30. 00  
 Bicloruro de estaño ..... " 0. 05

*Fricciones á los músculos.*

Mejorados los fenómenos generales, se usará localmente el siguiente tratamiento: