

Vaselina pura.....	gram.	30. 00
Alcanfor.....	,,	2. 00
Protóxido de plomo.....	,,	1. 00
Láudano.....	10 gotas.	

*Pomada.*

En algodón hidrófilo para curación tópica y poniendo encima

Cal pura.....	gram.	30. 00
Agua destilada.....	,,	400. 00

*Uso externo.***Quemaduras.**

Dr. E. Gutiérrez.                      Guadalupe. E. de Zacatecas.

Cocimiento de quina.....	gram.	600. 00
Salol.....	,,	12. 00
Ácido fénico.....	,,	3. 00
Láudano de Rousseau.....	,,	20. 00

*Lavatorios.*

Vaselina alcanforada.....	gram.	50. 00
Aristol.....	,,	5. 00
Cocaina.....	,,	1. 00

*Pomada.*

Lavar cuidadosamente con el lavatorio, aplicar luego la pomada en hilas fenicadas y cubrir con algodón salicilado.

Dr. E. Lier.

México:

Aristol.....	gram.	2. 00
Éter sulfúrico.....	,,	5. 00
Colodión.....	,,	25. 00

*Uso externo.*

Dermatol.....	gram.	5. 00
---------------	-------	-------

Cocaina.....	,,	1. 00
Manteca de cacao.....	,,	44. 00

*Pomada.*

Dr. Federico Cota.                      La Paz. Baja California

En las quemaduras en las manos ó en los piés, para calmar el dolor, provocar el enfriamiento por el hielo ó por el éter en el miembro opuesto.

**Queratitis.**

Dr. Agustin Chacón.                      México.

Agua destilada.....	gram.	500. 00
Bicloruro de mercurio.....	,,	0. 20

*Lavatorio.*

Ó bien.

Agua destilada.....	gram.	300. 00
Licor de Van Swieter.....	,,	200. 00

*Lavatorio.*

Vaselina.....	gram.	10. 00
Óxido rojo de mercurio de 0.10 á.....	,,	0. 20

*Pomada.*

Dr. L. Castro.

México.

QUERATITIS INTERSTICIAL DE ORIGEN SIFILÍTICO.

Agua destilada.....	gram.	30. 00
Bicloruro de mercurio.....	,,	0. 03

*Inyecciones subcutáneas.*

Se inyecta un milígramo diario en la región interescapular, teniendo cuidado de suspender tan luego como aparesca la estomatitis.

## QUERATITIS COPÉTICA.

Agua destilada de rosas.....	gram.	30. 00
Biborato de sosa.....	"	0. 60
Extracto de crameria de 0. 10 á ..	"	0. 15

*Gotas para los ojos.*

Seis gotas tres veces al día.

QUERATITIS CIRCUNFERENCIAL Y ÚLCERA ATÓNICA  
DE LA CÓRNEA.

Agua destilada.....	gram.	30. 00
Bórax.....	"	1. 00
Sulfato de atropina.....	"	0. 02

*Gotas para los ojos.*

De dos á tres gotas tres veces al día en el ojo enfermo. Se suspende tan luego como haya dilatación del iris; de lo contrario se originan dolores intensos.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Aristol.....	gram.	1. 00
Sulfato de atropina.....	"	0. 05
Vaselina.....	"	20, 00

*Pomada.*

Curación ocluciba cada tres días.

Otra.

Agua destilada.....	gram.	10, 00
Sulfato de atropina.....	"	0. 05
Cocaína.....	"	0, 20

*Colirio.*

Dos gotas dos veces al día en el ojo enfermo.

NOTA.—Las soluciones de nitrato de plata jamás se deben aplicar cuando la córnea ha perdido siquiera el epitelis.

## QUERATITIS ULCEROSA.

Dr. Manuel Carmona y Valle, México,  
En las úlceras agudas, subagudas y crónicas en la oftalmía estrumosa.

Aceite de bacalao claro.....	gram.	28. 00
Calomel.....	"	4. 80

*Colirio núm. 1.*

Aceite de bacalao claro.....	gram.	28. 00
Calomel.....	"	4. 80
Precipitado rojo.....	"	0, 40

*Colirio núm. 2.*

Aceite de bacalao claro.....	gram.	28. 00
Aceite de cade.....	"	7. 00
Calomel.....	"	4. 80
Precipitado rojo.....	"	0. 40

*Colirio núm. 3.*

Su aplicación como la de todos los colirios.

**Queratitis flictenular.**

Dr. A. Chacón. México.

Aceite de vaselina.....	gram.	10. 00
Calomel al vapor.....	"	1. 00

*Gotas.*

Dos gotas dos veces al día en el ojo enfermo. Agítese antes de usarlo.

Otra.

Vaselina.....	gram.	10. 00
Óxido amarillo de mercurio de 0. 10 á.....	"	0. 20
Sublimado.....	"	0. 002

*Pomada.*

Se coloca en la mucosa del párpado inferior, una cantidad igual en volúmen á un chicharito.

Esta fórmula se usa también en las úlceras de la córnea.

Dr. L. Castro. México.

EN LOS ESCROFULOSOS.

Aceite de almendras dulces le- gítimo.....	gram. 30. 00
Calomel al vapor.....	" 1. 00
Bicloruro de mercurio.....	" 0. 01
Láudano de Sydenham.....	" 1. 00

*Gotas para los ojos.*

De cinco á seis gotas en el ojo enfermo acompañadas del tratamiento interno aconsejado en estos casos.

**Queratitis linfática.**

Dr. A. Chacón. México.

Vaselina.....	gram. 10. 00
Óxido amarillo de mercurio de 0. 10 á.....	" 0. 20
Bicloruro de mercurio.....	" 0. 002

*Pomada.*

Con un papel se pone en el saco conjuntival una cantidad de pomada igual en volumen á un chicharito se cierra el ojo y se hace un ligero massage con objeto de repartir la pomada por toda la superficie del globo ocular.

**Quinina.**

Dr. E. Herrera Moreno. Córdoba E. de Veracruz.

Las dosis de quinina que recomiendan los autores, no hacen efecto en los climas cálidos; generalmente se

dá en estos lugares grm. 1. 50 por dosis y grm. 4. 00 por día en el adulto.

En los niños una dosis proporcionada á su edad.

**Raquitismo.**

Dr. M. Mucél. México.

Fosfatina de Falieres.

Alimento Wagner.

**Rectitis ulcerosa.**

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Iodoformo..... grm. 2. 00

Extracto de crameria..... " 6. 00

" " opio..... " 0. 20

Manteca de cacao c. b.

*Para 6 supositorios.*

Tres supositorios en el día.

**Reumatismo articular.**

Dr. G. F. Chávez. Tasco E. de Guerrero.

Cocimiento de zazafrás..... grm. 125. 00

Salicilato de sosa..... " 4. 00

Sal de Pelletier..... " 0. 30

Jarabe de cidra c. b.

*Cucharadas.*

Una cucharada cada dos horas,

Dr. M. S. Iglesias. Veracruz.

Prévio tratamiento general y solamente como calmante del dolor, usa la friega siguiente.

Bálsamo anodino y bálsamo Fioraventi partes iguales. Caliente en B de M, agítese y despues de fricciónarse cúbrase la parte dolorosa.

Dr. M. Mucél.

México.

El sífilítico con el ioduro de potasio y los sudoríficos de jaborandi ó pilocarpina.

EN EL INFLAMATORIO.

Agua.....	gram.	250. 00
Salicilato de sosa.....	"	15. 00
Jarabe de clorhidrato de morfina.....	"	50. 00

*Cucharadas.*

De seis á ocho cucharadas diarias.

Dr. Valdéz y Díaz.—Paso de Ovejas E. de Veracruz.

Alcohol alcanforado.....	} de c. c. ...	gram. 30. 00
Bálsamo anodino é.....		
Id. de Guatemala. }		
Sulfato de atropina.....	"	0. 10

*Friega.*

Dr. Z. Páramo Rangél.

México.

Pomada iodurada.....	gram.	30. 00
Extracto de cicuta.....	"	2. 00
Laúdano de Rousseau.....	"	4. 00

*Pomada.*

Dos veces al día en las articulaciones dolorosas.

Dr. Joaquín L. Vallejo.

México.

Prévio tratamiento interior y solamente para calmar el dolor usa la fórmula siguiente:

Bálsamo de Fioraventi.....	} de c. c. gram. 15. 00
Láudano de Russeau y.....	
Tintura de jabón alcanforado }	

*Friega.*

Dr. M. Medal.

Tacámbaro E. de Michoacán.

Purgante de sulfato de magnesia con azufre y jara-be de ruibarbo, las cucharadas siguientes:

Infusión de tilia.....	gram.	250. 00
Ioduro de potasio de 2. 00 á... "	"	4. 00
Salicilato de sosa.....	"	4. 00
Tintura de acónito de X á.....	XX gotas.	
Jarabe de corteza de naranja... "	gram.	30. 00
Esencia de limón.....	XX gotas.	

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Sulfato de quinina.....	gram.	1. 00
Antipirina.....	"	0. 30
Azúcar.....	"	4. 00

*En 3 papeles.*

Para tomarlos en el día.

Dr. L. Longitud.

Tenancingo.

Asociada al tratamiento interior usa la siguiente friega, aplicando la tilia al B de M, en las articulaciones dolorosas, tres ó cuatro veces al día.

Manteca lavada y esencia	
de trementina de c. c.....	gram. 30. 00
Veratrina.....	" 0. 20

*Friega.*

Dr. E. Gutierrez

Guadalupe E. de Zacatecas.

Agua destilada.....	gram.	120. 00
Nitrato de potasa.....	"	10. 00
Ioduro de potasio de 3. 00 á... "	"	4. 00

Nitrato de pilocarpina de 0.03á „ 0.05  
 Jarabe depurativo..... „ 45.00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

Salipirina de 4.00 á..... grm. 6.00  
 Cafeina..... „ 1.00

*En 12 cápsulas.*

Una cápsula cada hora.

Dr. D. Molinar Parral.

Bromhidrato de quinina..... grm. 1.00  
 Agua destilada..... „ 9.00

*Inyecciones.*

Una inyección hipodérmica diaria de 10 á 20 gotas.

Tintura de iodo..... grm. 60.00  
 Láudano de Sydenham..... „ 20.00

*Uso externo.*

Ponerlo en las articuaciones dolorosas. Vegigato-  
 rios á la región precordial.

Dr. J. M. Arroyo Irapuato E. de Guanajuato.

Colodión elástico..... }  
 Tintura de iodo y } de c. c.... grm. 15.00  
 Amoniaco á 22° }

*Uso externo*

A los lugares doloros con un pincel.

Dr. G. J. Chávez. Tasco.

Cocimiento de zazafráz..... grm. 125.00  
 Ioduro de potasio..... „ 2.00

Extracto de acónito..... „ 0.05  
 Jarabe de cidra c b.

*Cucharadas.*

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Ciro M Santelices. Querétaro.

## REUMATISMO POLIARTICULAR.

Salicilato de sosa..... grm. 8.00  
 Antipirina..... „ 4.00  
 Infusión de digital..... „ 180.00  
 Cognac..... „ 40.00  
 Jarabe de opio..... „ 40.00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada dos horas.

Otra.

Salicilato de sosa..... grm. 6.00  
 Antipirina..... „ 3.00  
 Sulfato de quinina..... „ 1,50  
 Extracto de opio..... „ 0.06  
 „ „ digital..... „ 0.06

*En 12 obleas.*

Una oblea cada dos horas.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Salicilato de sosa..... grm. 10.00  
*Para 10 papeles.*

Un papel tres veces al día.  
 Antipirina..... grm. 2.00

*Para 4 cápsulas.*

Una en la noche.

Bálsamo de opodeldoc..... grm. 40,00

- Cloroformo ..... „ 10. 00
- Láudano..... „ 10. 00

*Friega.*

En las articulaciones afectadas.

---

Dr. Lorenzo Cantú. C. Porfirio Diaz E. de Coahuila.  
 Cápsulas de salicilato de sosa de 0.50 centígramos.  
 cada una y gránulos de Colchicina de Chanteaud de  
 0,601 milígramo.

Una cápsula y un gránulo cada dos ó cada tres ho-  
ras hasta el efecto.

---

Dr. Márcos Mazari Mineral de Huautla. E. de  
Morelos

- Salicilato de sosa..... grm. 2. 00
- Sulfato de quinina..... „ 1. 00
- Clorhidrato de morfina..... „ 0. 05
- Calomel..... „ 0. 20

*En 12 papeles.*

Un papel cada hora.

Tintura de iodo á las articulaciones dolorosas.

---

Dr. Bonifasio Carmona Querétaro,  
 Cocimiento de frutos de mezquite como agua de  
 uso y fricciones con pomada de quina en las articula-  
 ciones.

**Reumatismo articular agudo.**

- Dr. Benito Soriano F. México.
- Cocimiento de tripa de Judas. . . grm. 120. 00
  - Salicilato de sosa ..... „ 4. 00
  - Tintura de colchico..... „ 4. 00

- Ioduro de potasio ..... „ 2. 00
- Jarabe de opio ..... „ 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

EN LA FORMA SUBAGUDA.

- Cocimiento de tripa de Judas. . grm. 120. 00
- Salicilato de sosa ..... „ 2. 00
- Tintura de colchico ..... „ 4. 00
- Ioduro de potasio ..... „ 4. 00
- Jarabe de opio ..... „ 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

**Reumatismo crónico.**

Dr. M. Mucél. México.

En la forma crónica, los baños del Peñón y el iodu-  
ro de potasio.

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.

- Jarabe de corteza de naranja  
amarga..... grm. 60. 00
- Ioduro de potasio ..... „ 2. 00

*Cucharadas.*

Una en la mañana.

- Antipirina..... grm. 2. 00
- En 4 cápsulas.*

Una cápsula al acostarse.

---

Dr. L. Arroyo. San Angel D. F.

Baños repetidos con cocimiento de Chilillo, Poligo-  
num hidropiper (Poligonaceas.)

Dr. Benito Soriano F.	México.
Cocimiento de tripa de Judas...	gram. 120. 00
Ioduro de potasio .....	" 4. 00
Tintura de colchico .....	" 2. 00
Jarabe de opio .....	" 30. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

### Reumatismo muscular

Dr. Ciro M. Santelices.	Querétaro.
Pomada alcanforada .....	gram. 12. 00
Esencia de trementina .....	" 12. 00
Tintura de mostaza .....	" 12. 00
Amoniaco .....	" 6. 00
Cloroformo .....	" 6. 00

Una yema de huevo.

*Fricciones.*

Dos ó tres veces al día.

Dr. Rafael Zapien.	Tonalá Chiapas.
Ácido acético á 8° .....	gram. 30. 00
Bálsamo Opodeldoc .....	" 30. 00
Láudano Sydenham .....	" 4. 00

*Friega.*

En las partes dolorosas.

### Reconocimiento oftalmoscópico.

Dr. Agustín Chacón	México.
Para hacerlo se usará	
Agua destilada .....	gram. 10. 00
Hermatropino hipobromurado de 0,05 á .....	" 0. 10

*Colirio.*

Su acción sobre el iris es muy pasajera.

### Retención de orina.

Dr. José B. López. Campeche.

POR ESPASMO DEL CUELLO.

Alcanfor .....	gram. 0. 30
Extracto de beleño .....	" 0. 15

*En 15 píldoras.*

Una píldora cada hora.

Dr. Emilio Polo Puebla.

POR ESPASMO DEL CUELLO Ó RELAJACIÓN  
DEL CUERPO DE LA VEJIGA.

Tintura de gelcemiun .....	10 gotas.
Id. de acónito .....	10 gotas.
Agua .....	gram. 120. 00

*Cucharadas.*

Una cucharada cada hora.

### Rinitis aguda.

Dr. Ramón Velasco. Tequila.

MÉTODO ABORTIVO.

Salol .....	gram. 1. 00
Clorato de potasa .....	" 1. 00
Alcanfor pulverizado .....	" 0. 50
Salicilato de cocaína .....	" 0. 30

*Para insuflar.*

MÉTODO CURATIVO: PERIODO AGUDO.

Vaselina líquida .....	gram. 10. 00
Id. sólida .....	" 10. 00
Salicilato de cocaína .....	" 0. 25

*Para sorbetorios.*

PERIODO SUBAGUDO Y CRÓNICO.

Se agregará á la fórmula anterior baborato de sosa  
12 centígramos ó más según el periodo de evolución.

**Roseola.**

Dr. Juan Villaseñor.	Morelia.
Agua de Goulad.....	gram. 60. 00
Alcohol alcanforado.....	„ 60. 00
Mentol.....	„ 1. 00

*Uso externo.*

Fricciones cada dos horas en los lugares afectados.	
Ferrocitrato de quinina.....	gram, 1. 00
Extracto de beleño.....	„ 0. 05

*En 10 píldoras.*

Una píldora cada dos horas.

Si dos días después de tomar estas píldoras no hay mejoría, se usará de la antipirina teniendo cuidado de dar antes un purgante de sal de Seignette 30 grm.

**Sarampión.**

Dr. D. Molinar	Parral.
Infusión de borraja.....	gram. 120. 00
Acetato de amoniaco.....	de 5 á 20 gotas
Jarabe de tolú.....	gram. 30. 00

*Cucharaditas ó cucharadas.*

Una cada hora.

Linimento amoniacal.....	gram, 50. 00
--------------------------	--------------

*Fricción general.*

## EN LA COMBALECENCIA.

Cocimiento de quina.....	gram. 120, 00
Extracto de quina de 0. 50 á..	gram. 4. 00
Jarabe de corteza de naranja..	„ 30. 00

*Cucharaditas ó cucharadas.*

Una cada hora.

**Sarna.**

Dr. Santos Medina	Juchipila. E. de Zacatecas.
Vaselina blanca.....	gram. 30. 00
Ácido fénico alcoholizado.....	„ 1. 00
Iodoformo.....	„ 0. 50

*Pomada.*

Aplíquese dos veces al día sobre los lugares enfermos.

Dr. E. Gutiérrez	Guadalupe. E. de Zacatecas.
------------------	-----------------------------

Agua.....	gram. 300. 00
Ácido bórico.....	„ 6. 00
Agua de laurel cerezo.....	„ 30. 00

*Lociones reiteradas.*

Vaselina.....	gram. 40. 00
Salol.....	„ 1. 60
Ictiol.....	„ 4. 00

*Pomada.*

Coldcream.....	gram. 50. 00
Azufre.....	„ 8. 00
Clorato de potasa.....	„ 4. 00
Ácido salicílico.....	„ 1. 00

*Pomada.*

Unción después de las lociones teniendo cuidado de lavar y jabonar previamente.

**Sicosis parasitaria.**

Dr. E. Lier	México.
Acido tánico.....	gram. 5. 00
Azufre.....	„ 10. 00