

Roseola.

Dr. Juan Villaseñor.	Morelia.
Agua de Goulad.....	gram. 60. 00
Alcohol alcanforado.....	„ 60. 00
Mentol.....	„ 1. 00

Uso externo.

Fricciones cada dos horas en los lugares afectados.	
Ferrocitrato de quinina.....	gram, 1. 00
Extracto de beleño.....	„ 0. 05

En 10 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Si dos días después de tomar estas píldoras no hay mejoría, se usará de la antipirina teniendo cuidado de dar antes un purgante de sal de Seignette 30 grm.

Sarampión.

Dr. D. Molinar	Parral.
Infusión de borraja.....	gram. 120. 00
Acetato de amoniaco.....	de 5 á 20 gotas
Jarabe de tolú.....	gram. 30. 00

Cucharaditas ó cucharadas.

Una cada hora.

Linimento amoniacal.....	gram, 50. 00
--------------------------	--------------

Fricción general.

EN LA COMBALECENCIA.

Cocimiento de quina.....	gram. 120, 00
Extracto de quina de 0. 50 á..	gram. 4. 00
Jarabe de corteza de naranja..	„ 30. 00

Cucharaditas ó cucharadas.

Una cada hora.

Sarna.

Dr. Santos Medina	Juchipila. E. de Zacatecas.
Vaselina blanca.....	gram. 30. 00
Ácido fénico alcoholizado.....	„ 1. 00
Iodoformo.....	„ 0. 50

Pomada.

Aplíquese dos veces al día sobre los lugares enfermos.

Dr. E. Gutiérrez	Guadalupe. E. de Zacatecas.
------------------	-----------------------------

Agua.....	gram. 300. 00
Ácido bórico.....	„ 6. 00
Agua de laurel cerezo.....	„ 30. 00

Lociones reiteradas.

Vaselina.....	gram. 40. 00
Salol.....	„ 1. 60
Ictiol.....	„ 4. 00

Pomada.

Coldcream.....	gram. 50. 00
Azufre.....	„ 8. 00
Clorato de potasa.....	„ 4. 00
Ácido salicílico.....	„ 1. 00

Pomada.

Unción después de las lociones teniendo cuidado de lavar y jabonar previamente.

Sicosis parasitaria.

Dr. E. Lier	México.
Acido tánico.....	gram. 5. 00
Azufre.....	„ 10. 00

Acido salicílico.....	„	1, 00
Vaselina.....	„	80. 00

Ungüento.

Lociones de sublimado de mercurio 1.00 para 100.00 de alcohol.

Dr. Guillermo Parra. Tacubaya D. F.

Hacer la epilación lo más pronto posible en todos los lugares afectados y cubrir la cara con una máscara de gutapercha humedecida interiormente con solución fenicada al tres por ciento.

Lavatorios tres veces al día con solución de bicloruro de mercurio al milésimo.

Sífiles.

Dr. Juan José R. de Arellano México

Tanato de mercurio..... grm. 1. 00

Extracto de opio..... „ 0. 20

Para 20 píldoras.

Dos, tres ó cuatro píldoras diarias según la gravedad de las manifestaciones.

Rara vez producen estomatitis y trastornos gástricos.

Dr. Lázaro Ortega. México.

ACCIDENTES SECUNDARIOS.

Alcohol..... grm, 500. 00

Ioduro de potasio..... „ 15. 00

Recina de Guayacan..... „ 30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita tres veces al día en medio vaso de agua azucarada. Se aumenta una cucharadita ca-

da cinco días de modo que el décimo sexto se tomen dos cucharaditas tres veces al día.

Dr. Cárlos Amezcua,

Tehuacán.

EN EL 2º Y 3º PERIODO.

Jarabe de Zarzaparrilla..... grm. 600. 00

Tartatro de potasa y fierro.... „ 25. 00

Tintura de Zazafrás..... „ 10. 00

Cucharaditas núm. 1.

Jarabe con menta..... grm. 600. 00

Bicloruro de mercurio..... „ 0. 60

Ioduro de potasio..... „ 20. 00

Cucharaditas núm. 2.

Tomará el enfermo una cucharadita del núm. 1 al medio día y una cucharadita del núm. 2 en la tarde ó en la noche después del alimento. Continuará sin interrupción por 20 días. Suspenderá por 10 días para comenzar nuevamente y así en seguida hasta la curación. Buena higiene.

Dr. Agustín Chacón.

México.

SÍFILIS OCULAR.

Agua..... grm. 100. 00

Ioduro de potasio..... „ 10. 00

Bi-ioduro de mercurio..... „ 0. 08

Clorhidrato de pilocarpina.... „ 0. 08

Jarabe de azahar..... „ 25. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita al acostarse.

Dr. Desiderio G. Rosado Comalcalco. Tabasco.

SÍFILES CONSTITUCIONAL.

Bicromato de potasa.....	gram.	0. 10
Percloruro de fierro líquido.....	"	14. 00
Tintura de iodo.....	"	28. 00

Gotas.

De cinco á diez gotas cuatro veces al día en agua gomosa.

Dr. Federico Cota La Paz Baja California.

DOLORES OSTEOPEROS.

Bálsamo de Fioraventi.....	gram.	60. 00
Cloroformo.....	"	6. 00
Alcohol alcanforado.....	"	30. 00
Láudano de Rousseau.....	"	4. 00
Mentol.....	"	1. 50

Uso externo.

Loco dolenti.

Dr. L. Castro.

México.

Segundo y tercer período.

Cocimiento de guayacán.....	gram.	150. 00
Ioduro de potasio.....	"	8. 00
Bicloruro de mercurio.....	"	0. 05
Elixir de javorandi.....	"	40. 00
Láudano de Sydenham.....	"	2. 00

Jarabe de goma ó de cinco raíces c. b.

Cucharadas.

Se comienza por una cucharada sopera diaria, aumentándose progresivamente cada ocho días una cucharada, hasta llegar á cuatro, para suspender tan

luego como se manifieste la intolerancia por el mercurio ó el ioduro que contienen; procurando desde luego combatirla con el clorato de potasa *intus et extra*.

Aún en casos en que no se tiene la evidencia de la sífilis, pero que haya sospechas aunque remotas, se obtienen curaciones verdaderamente sorprendentes.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

Protoioduro de mercurio.....	gram.	0. 50
Extracto de genciana.....	"	0. 80
Extracto tebaico.....	"	0. 10

En 10 píldoras.

Comenzando por una diaria.

Agua destilada.....	gram.	300, 00
Ioduro de potasio.....	"	10. 00
Tintura de corteza de naranja amarga.....	"	20. 00
Tintura de beleño.....	"	3. 00

Jarabe de zarzaparrilla c. b.

Cucharadas.

Una cucharada diaria aumentando segun el caso

Dr. Constancio Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

En todos los períodos y con especialidad en la sífilis visceral grave, así como en los casos, por esencia crónicos, en que el tratamiento específico no dá el resultado deseado, son de importantísima utilidad las inyecciones, de á un centígramo por inyección de bicloruro de mercurio disuelto en un gramo de glicerina por intermedio de la sal amoniaco; estas inyecciones hipodérmicas, se aplican en los glúteos cada tercer día.

Dr. E. Lier.	México.
Tanato de mercurio.....	gram. 2. 50
Extracto de opio ..	„ 0. 50
„ „ genciana c. b.	

Para 50 píldoras.

Tres diarias (una después de las comidas.)

Inyecciones de	
Bicloruro de mercurio de 0. 20 á..	gram. 0. 50
Cloruro de sodio ..	„ 2. 00
Agua destilada ..	„ 50. 00
Clorhidrato de cocaína ..	„ 0. 50

Inyecciones.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias, Coahuila.

Jarabe de corteza de naranja	
amarga ..	gram. 250. 00
Tintura de quina.	„ 50. 00
Ioduro de potasio.	„ 15. 00
Bi-ioduro de mercurio ..	„ 0. 15
Arseniato de sosa.....	„ 0. 15
Agua para disolver el ioduro..	„ 250. 00

Cucharadas.

Dos ó tres cucharadas en el día.

Dr. G. J. Chávez.	Tasco.
Raíz de zarzaparrilla.....	gram. 60. 00
„ „ guayacán.....	„ 16. 00
„ „ maguey meco ..	„ 60. 00
Hojas de javorandi.....	„ 1. 00

Hágase hervir en agua bastante para obtener gram. 500. 00 de cocimiento concentrado, cuélese con expresión y añádase

Extracto de acónito.....	gram. 0. 05
Ioduro de potasio.....	„ 2. 00

Para tomar en veinticuatro horas.

Protoioduro de mercurio.....	gram. 1. 00
Extracto de raíz de maguey meco ..	„ 1. 00
„ „ zarzaparrilla.....	„ 1. 00

En 24 píldoras.

Una píldora por la mañana y otra por la noche, aumentando progresivamente hasta seis por día.

Dr. J. C. Villaseñor.	Morelia.
Sublimado.....	gram. 1. 00
Extracto de guayacán.....	„ 5. 00
„ tebaico.....	„ 0. 25

En 100 píldoras

Dos píldoras diarias

Dr. D. Molinar.	Parral.
Agua destilada ..	gram. 150. 00
Ioduro de potasio de 5. 00 á..	„ 10. 00
Bi-ioduro de mercurio de 0. 05 á ..	„ 0. 10

Cucharadas.

Tres cucharadas en el día.

ULCERACIONES DE LA FARINGE.

Dr. F. Valdéz.	Batopilas E. de Chihuahua.
Agua destilada ..	gram. 50. 00
Solución alcoholizada de bicloruro de mercurio al 1°/1000.....	„ 50. 00

Pulverizaciones.

Pulverizaciones con el atomizador de Richarson tres veces al día. Esta curación debe acompañarse del tratamiento general que el estado del individuo exija.

Dr. José M. Dávila.

Mazatlán.

ACCIDENTES SECUNDARIOS.

Protoioduro de mercurio.....	gram.	0. 30
Extracto de guayacán.....	„	1. 00
„ „ opio.....	„	0. 10

En 10 píldoras.

Una píldora diaria.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia.

Periodos secundario y terciario.

Bi-ioduro de mercurio.....	gram.	0. 40
Ioduro de potasio puro.....	„	0. 40
Polvo de altea.....	„	1. 00
Extracto de quina.....	„	1. 00
Bálsamo de tolú c. b. como mucilago.		

Para 23 píldoras.

De una á cuatro píldoras diarias

Otra.

Iodidrargirato de ioduro de potasio	gram.	1. 00
Iodo metálico.....	„	0. 50
Ioduro de sodio.....	„	20. 00
Jarabe de zarzaparrilla.....	„	480. 00

Cucharadas.

De dos á cuatro cucharadas diarias.

Soluciones desinfectantes.

Dr. Tobías Núñez.

México.

Para practicar la *anticepsia quirúrgica* contamos con un buen número de agentes terapéuticos. Los éxitos favorables que pueda obtener el práctico dependerán, no del número de anticépticos que pueda emplear, sino de la manera como los emplee según la poca ó mucha práctica que tenga de hacer la anticepsia.

Gerster con mucha razón dice: "que sería una malhad el emprender operaciones de cierta importancia, para aprender las primeras lecciones de la cirugía anticéptica, pues este aprendizaje se compraría con la vida del confiado paciente.

El emprender operaciones tales como la estirpación de un quiste del ovario, solo debería permitírseles á aquellas personas que han aprendido á curar las heridas recientes por primera intención, pues ésta es la única prueba de que poseen la habilidad necesaria para emprender tales operaciones." Los anticépticos más efectivos y sobre los que puede uno confiar son los siguientes:

Soluciones de ácido carbólico 2½ al 3 y al 5 por ciento.

Soluciones de bicloruro de mercurio al uno por mil. A esta solución (si se conserva) se le debe añadir una cucharadita cafetera de sal común para evitar la separación del mercurio de la preparación.

En los casos en que se pueda producir un envenenamiento por el uso de las soluciones, por el ácido fé-nico ó por el mercurio, Thiersch recomienda el em-

pleo de la *solución borosalicilada* que él formula como sigue:

Agua caliente.....	gram.	1000.	00
Ácido salicílico.....	„	2.	00
Ácido bórico..	„	12.	00

Con esta solución se puede lavar impunemente el peritoneo, pues no es venenosa. Las heridas externas así como las vastas superficies de absorción que tengan que desinfectarse, como las cavidades pleurales en los empiemas, pueden lavarse con esta solución, cuyo empleo no presenta peligro alguno, obrando á la vez como un poderoso anticéptico.

La *solución de creolina* es quizá más conveniente que la solución de Thiersch. Esta es una solución de cloruro en agua en una proporción de medio á dos por ciento. Esta solución no es venenosa, no irrita la piel, ni ataca los instrumentos.

Podemos añadir á las soluciones anticépticas ya citadas, el agua hervida, sola ó con sal común disuelta en ella, el alcohol, el ácido acético ó á falta de él, el vinagre. Los primeros anticépticos son muy eficaces y puede uno confiar en ellos completamente; los últimos por estar al alcance del práctico en todas partes, también deben recomendarse, recurriendo á ellos cuando no se puedan obtener los primeros. El agua á la temperatura de la ebullición se emplea para obtener la acepsia de los instrumentos que se van á usar en las operaciones, se le puede añadir al agua una poca de sal común.

Las *soluciones de ácido carbólico* y las de bicloruro de mercurio, son las más usadas tanto por su acción anticéptica tan poderosa que hace se tenga confianza en ella, como porque las puede uno obtener en cualquiera parte.

Las soluciones de ácido carbólico aun muy deluido el ácido, son peligrosas en los niños y aun hay cirujanos que dicen: que nunca deben usarse en los niños de tierna edad. El sublimado corrosivo también es peligroso, puede causar la estomatitis, así como inflamaciones diftéricas del grueso intestino si se abusa de estas soluciones.

En el tratamiento de las heridas recientes, tales como las que practica el cirujano al hacer una operación, se debe dar la preferencia á las soluciones de bicloruro de mercurio, sobre las de ácido fénico, pues hay menos riesgo de envenenamiento cuando se tiene que lavar superficies extensas, á la vez que su poder anticéptico es muy grande aun empleado á la dosis de uno por mil. Además el bicloruro de mercurio tiene la gran ventaja sobre el ácido carbólico de que en heridas recientes, las lociones con el bicloruro de mercurio no hacen sangrar las heridas, ni éstas producen una secreción tan abundante como cuando son lavadas con la solución de ácido carbólico.

El ácido carbólico obra sobre los coágulos tiernos, disolviéndolos y por lo mismo las heridas sangran abundantemente al desprenderse los coágulos que tapan los orificios de los vasos sanguíneos divididos. Además el ácido fénico obra sobre los vasos motores exitándolos y dando lugar á una secreción más abun-

dante de la herida, lo que obliga á renovar con frecuencia las primeras curaciones, impidiendo que la herida tenga reposo que le es tan necesario para su curación.

El sublimado corrosivo no disuelve los coágulos recientes, por lo mismo no sangran las heridas después que se ha hecho la hemostasis espontánea; tampoco irrita los vasomotores, secretando muy poca cantidad de líquidos las heridas, lo que permite quitar pronto los tubos de canalización, ó no ponerlos desde un principio. Además, no habiendo sino muy poca secreción, las heridas se conservan limpias y por lo mismo se pueden dejar las curaciones por varios días, manteniéndolas por consiguiente en el reposo que les es tan necesario para activar el prosesus cicatricial.

Soriacis.

Dr. E. Lier.	México.
Crisaobina	gram. 10. 00
Ácido salicílico	" 1. 00
Ictiol.....	" 5. 00
Vaselina	" 90. 00

Ungüento.

Sudores de los tísicos.

Dr. F. D. Maldonado Aguascalientes.
El sulfato de esparteina á la dosis de 8 á 10 centígramos diarios, le ha dado mejores resultados que la atropina, agarico, tanino, etc.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.
Sulfato de atropina gram. 0. 01
Extracto de orozú c. b.

Para 60 píldoras.

Tres píldoras diarias.

Tabes dorsales.

Dr. C. Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Inyecciones hipodérmicas cuotidianas de sulfato de estricnina, aumentando paulatinamente desde un milígramo hasta diez miligramos.

Tabes mesentérica.

Dr. S. Medina Juchipila. E. de Zacatecas.
Tintura de ruibarbo gram. 30. 00
Acetato de potasa líquido " 8. 00
Vino estibiado " 4. 00

Gotas.

De diez á 20 gotos por día.

Dr. Pedro Acosta Guadalajara.
Pomada de belladona gram. 30. 00
Aceite rojo de bacalao " 30. 00
Ioduro de potasio " 2. 00
Tintura de iodo " 10. 00

Friega.

Friccionar el vientre una vez al día con la octava parte de la pomada.

Hipofosfito de cal de 0. 50 á gram. 2. 00
Polvo de pelandris acuático