

dante de la herida, lo que obliga á renovar con frecuencia las primeras curaciones, impidiendo que la herida tenga reposo que le es tan necesario para su curación.

El sublimado corrosivo no disuelve los coágulos recientes, por lo mismo no sangran las heridas después que se ha hecho la hemostasis espontánea; tampoco irrita los vasomotores, secretando muy poca cantidad de líquidos las heridas, lo que permite quitar pronto los tubos de canalización, ó no ponerlos desde un principio. Además, no habiendo sino muy poca secreción, las heridas se conservan limpias y por lo mismo se pueden dejar las curaciones por varios días, manteniéndolas por consiguiente en el reposo que les es tan necesario para activar el prosesus cicatricial.

Soriacis.

Dr. E. Lier.	México.
Crisaobina	gram. 10. 00
Ácido salicílico	” 1. 00
Ictiol.....	” 5. 00
Vaselina	” 90. 00

Ungüento.

Sudores de los tísicos.

Dr. F. D. Maldonado Aguascalientes.
El sulfato de esparteina á la dosis de 8 á 10 centígramos diarios, le ha dado mejores resultados que la atropina, agarico, tanino, etc.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.
Sulfato de atropina gram. 0. 01
Extracto de orozú c. b.

Para 60 píldoras.

Tres píldoras diarias.

Tabes dorsales.

Dr. C. Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Inyecciones hipodérmicas cuotidianas de sulfato de estricnina, aumentando paulatinamente desde un milígramo hasta diez miligramos.

Tabes mesentérica.

Dr. S. Medina Juchipila. E. de Zacatecas.

Tintura de ruibarbo gram. 30. 00
Acetato de potasa líquido ” 8. 00
Vino estibiado ” 4. 00

Gotas.

De diez á 20 gotos por día.

Dr. Pedro Acosta Guadalajara.

Pomada de belladona gram. 30. 00
Aceite rojo de bacalao ” 30. 00
Ioduro de potasio ” 2. 00
Tintura de iodo ” 10. 00

Friega.

Friccionar el vientre una vez al día con la octava parte de la pomada.

Hipofosfito de cal de 0. 50 á gram. 2. 00
Polvo de pelandris acuático

de 0. 50 á	„	2. 00
Carbonato de cal precipitado		
de 1. 00 á	„	2. 00

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas.

Tenesmo.

Dr. D. Molinar.		Parral.
Polvo de ruibarbo	} de c. c.	gram. 1 00
Magnesia calcinada		
Canela en polvo		

Para 6 papeles.

Un papel cada dos horas.

Para los niños, en 15 papeles, uno cada dos horas.

Tómese en tres tomas con agua con una hora de intervalo.

Dieta de pan y leche la víspera de tomar la medicina.

Agua de coco	gram. 500. 00
Leche fresca	„ 250. 00

Una toma.

PARA NIÑOS.

Semillas de calabaza	gram. 60. 00
Polvo de Jalapa	„ 15. 00
Azúcar blanca	„ 60. 00

Hágase una emulsión.

Dos tomas con media hora de intervalo.

Dr. G. J. Chávez Tasco.

Extracto de kuzo	gram. 1. 00
Id. etéreo de helecho macho. „	1. 00
Goma	c. b.

En 24 píldoras.

De dos á ocho píldoras por día.

Extracto de ruibarbo	} de c. c.	gram. 1. 00
Musgo de Córcega		
Aloes		
Jarabe de ajeno		c. b.

Para 36 píldoras.

De cuatro á seis píldoras por día.

Dr. Z. Páramo Rangél México.

Cloroformo:	gram. 4. 00
Emulsión de aceite de ricino.	„ 50. 00

Tres tomas

Una á las 7 de la mañana, á las 9 y á las 11 a. m.

Tenia.

Dr. J. L. Vallejo México.

Extracto etéreo de helecho	
macho	gram. 0. 20
Polvos de raíz de granado	„ 0. 10
Escamonea	„ 0. 25

En 11 cápsulas.

Tomar esta dosis tres días consecutivos.

Dr. Francisco Fernández.—Medellín E. de Veracruz.

Corteza de raíz de granado ...	gram. 125. 00
Raíz de Jalapa	„ 30. 00

Agua „ 1,000. 00
 Hágase hervir hasta reducirlo á grm. 500. 00
 En la tarde purgante con grm. 40. 00 de aceite de ricino ingles.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.
 Infusión de menta grm. 120. 00
 Extracto etéreo de helecho
 macho „ 6. 00
 Goma arábica „ 4. 00
 Jarabe de éter „ 30. 00
Una toma.

Dr. Alberto B. Orduña Tehuacan.
 Extracto etéreo de helecho
 macho grm. 5. 00
 Kouseina „ 0. 30
Una toma.

A continuación un té aromático y 90 minutos después un purgante de aceite de ricino ó de aguardiente alemán. En 23 casos, solamente ha fallado una vez.

Dr. Demetrio Molinar Parral.
 Coiteza fresca de raiz de granada grm. 120. 00
 Agua simple „ 500. 00
 Maceración por 24 horas, despues reducción por el calor á 400.

Divídase en tres partes y tómese una parte cada media hora en ayunas y media hora después de la última un purgante de aceite de ricino. En 482 casos ha fallado en 2 solamente

Tensión ocular.

Dr. Fernando López México.
 PARA DISMINUIR LA TENSION OCULAR.
 Agua destilada grm. 10. 00
 Clorhidrato de pilocarpina „ 0. 10
 Id. de hidrastina „ 0. 02
Gotas para los ojos.

Terrores nocturnos.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.
 EN LOS NIÑOS.
 Bromuro de sodio grm. 2. 00
 Id. de potasio „ 1. 00
 Jarabe de cloral de Follet „ 10. 00
 Agua de nafé „ 90. 00
Cucharadas.
 Una cucharada cada cuatro horas.

Tétanos.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.
 EN LOS NIÑOS.
 Agua destilada grm. 90. 00
 Tintura de cannabis índico „ 6. 00
 Sulfato de atropina „ 0. 001
 Jarabe simple „ 10. 00
Cucharaditas.
 Una cucharadita cada hora.

Dr. Enedino V. Gómez Guadalupe de los Reyes. Sinaloa.
 EN LOS RECIEN NACIDOS.
 En la ciudad donde ejerce, la mitad de los recién na-

cidos son atacados de tétanos y mueren un 75 por ciento de los atacados.

Leche.....	gram.	30. 00
Agua.....	"	10. 00
Cloral hidratado.....	"	0. 40
Azúcar.....	c. b.	

Cucharaditas.

Una cucharadita cada 15 minutos hasta conseguir el sueño.

Agua de azahar.....	gram.	30. 00
Bromuro de potasio.....	"	0. 50
Jarabe de éter.....	"	10. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada 15 minutos despues de despertado el niño.

Siempre que el trismus no es muy fuerte y el niño puede pasar las medicinas, estas cucharaditas han dado buen resultado.

Sifilitis.

EN LOS NIÑOS.

Dr. R. N. Prado	México.
Calomel al vapor.....	gram. 0. 50
Polvos de ipeca.....	" 0, 30

Un papel

Esta dosis puede variarse según la edad de los niños.

Tifo exantemático.

Dr. Constancio Mota Puruándiro. E. de Michoacán

Hace una solución de cuatro á seis gramos de ácido salicílico en alcohol, y da una cucharada cada hora de ésta solución en un vaso de naranjate. Admi-

nistra al mismo tiempo un baño tibio general cada cuatro horas.

El mismo tratamiento le ha dado magníficos resultados en toda clase de fiebres contínuas y pseudo-contínuas.

Dr. José Terrés.

México.

En el tifo es siempre útil sostener la temperatura en cifras poco elevadas.

La antipirina calma la cefalalgia, abate la temperatura y es un anticéptico; pero si se dá en dosis altas en esta enfermedad, se provocan sudores copiosos que debilitan al paciente, y, una de dos; ó se sube mucho la dosis cotidiana ó se obtienen abatimientos marcados pero debilitantes y pasajeros; lo primero es perjudicial provablemente, y se ha dicho que dosis fuertes de antipirina en las fiebres esenciales, dificultan la eliminación de las toxinas por la orina. La esperiencia me ha hecho aceptar el tratamiento siguiente para los tifoedeos:

1º. Se colocan en una pieza bastante amplia, que no contenga más muebles que la cama del enfermo, una mesita y una silla.

2º. Se procurará la ronovación constante del aire de la pieza, con aire puro y se riega en ella de cuando en cuando, un poco de ácido fénico disuelto en alcohol *sin agua*.

3º. Se alimenta al enfermo según el estado de sus vias digestivas, con leche, huevos, aún carnes si es posible.

4.º Se vigila que evacúe todos los días el vientre, poniéndole una lavativa cuando no lo haga y dándole al día siguiente un purgante de aceite de ricino, si la lavativa no produce resultado.

5.º En todo caso se le dan tónicos; uso casi siempre las fórmulas siguientes:

Agua ó vino de quina.....	gram.	100. 00
Cafeína de 1. 00 á.....	„	1. 50
Salicilato de sosa de 2. 00 á.....	„	3. 00
Jarabe simple.....	c. b.	

Cucharadas.

Para tomar una cucharada, cada hora, cada dos ó tres, según el caso.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Sulfato de estriquina.....	„	0. 05

Inyecciones.

Para inyectar uno ó dos gramos al día.

6.º Como agua de uso, toma el enfermo una mezcla de

Agua.....	gram.	500. 00
Cognac.....	„	20. 00
Clorato de potasa.....	„	1. 00
Jarabe.....	c. b.	

Bebida.

7.º Cada hora ó cada hora y media se toma la temperatura y si el termómetro marca más de 39,º5. se le dan gram. 0. 20 ó 0. 25 de antipirina disueltos en agua.

8.º Si el enfermo puede tomar las obieas de naftól, de Froutlé, le doy cada dos ó tres días una oblea cada dos horas.

El salol no me ha prestado servicios en el tifo.

Dr. F. Abrego

México.

Empieza por administrar un purgante de aceite de ricino gram. 30. 00 y esencia de trementina gram. 1. 00 y las cucharadas siguientes:

Infusión débil de quina.....	gram.	200. 00
Cognac.....	„	40. 00
Salicilato de sosa.....	„	3. 00
Antipirina.....	„	1. 00
Tintura de canela y acetato de amoniaco de e. c.....	„	4. 00
Jarabe de cloral.....	„	40. 00

Cucharadas.

Si el delirio es marcado, agrega á todo esto un gramo de ergotina de Bonjeán.

Si hay tendencia á la postración, un gramo de tintura de nuez vómica.

La medicina debe terminarse en las veinticuatro horas.

Como bebida á pasto limonada clorhídrica.

Gomo régimen, leche y caldo

Si hay hipertemia, lociones de vinagre aromático, con agua.

Nunca ha visto temperaturas alarmantes usando la poción anterior.

Para mantener el vientre libre y á la vez para bajar la temperatura, lavativas de agua fria de gramos 500. 00 cada una. [1]

(1). El Dr. Abrego ha estado encargado por algún tiempo de los tifoideos de Churubusco y su opinión está basada en una larga experiencia.

Dr. M. Mucél.

México.

PARA CALMAR LA CEFALALGIA, USA LA ANTICAMNIA.

Lavativas evacuantes siempre que haya tendencia á la constipación.

Agua	60. 00
Buen cognac	80. 00
Extracto de quina	1. 00
Jarabe de corteza de naranja...	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Antonio Carreón Chalchicomula, E. de Puebla.

POCIÓN ALCOHÓLICA PARA LOS TIFOEDEOS

Infusión de canela	120. 00
Cognac	30. 00
Jarabe de naranja	20. 00

Cucharadas.

Dr. G. Senisson

México.

Cocimiento de quina roja y

Cognac de c. c.	60. 00
Extracto de quina	4. 00
Acetato de amoniaco	6. 00
Tintura de acónito	1. 00
Id. „ canela	12. 00
Antipirina	1. 00
Jarabe de corteza de naranja...	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Se puede añadir á ésta fórmula, bromuro de potasio ó tintura de nuez vómica según el caso lo exija.

Dr. Manuel de Anaya

Guanajuato.

COMO PROFILÁCTICO.

Extracto de cuasia amara	1. 00
Alcanfor pulverizado	0. 20
Arseniato de estriquina	0. 02

En 20 píldoras.

Una píldora diaria antes de comer.

COMO MEDIO CURATIVO.

Agua	120. 00
Jarabe de zarzaparrilla	20. 00
Clorato de potasa	3. 00

Tres tomas.

Una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche desde el principio del 2.º periodo.

Dr. Luis L. Cordero

San Luis Potosí.

Infusión de té verde	125. 00
Extracto blando de quina	3. 00
Cognac	45. 00
Jarabe de naranja	45. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Vinagre aromático	200. 00
Ácido carbólico	4. 00

Lociones.

Café con leche.—Agua vinosa.—Las lociones desde que la temperatura marca 39.

Si hay constipación lavativas de tianguis y si hay diarrea lavativas con salol.

Dr. Ciro M Santelices.	Querétaro
Agua.....	gram. 1000. 00
Acido láctico.....	„ 0. 50
Jarabe de grosella.....	„ 150. 00

Bebida á pasto.

Dr. Manuel Gutiérrez Zavala. México.
Buena alimentación en relación á la constitución y costumbres del enfermo.

Ventilación y aseo lo más perfecto posible.

Dos veces por día inyección subcutánea de una jeringa que contenga en solución de dos y medio á cinco miligramos de estriquina.

Infusión de quina.....	gram. 100. 00
Cognac de 30 á.....	„ 60. 00
Tintura de canela.....	„ 5. 00
Acetato de amoniaco.....	„ 5. 00
Jarabe de corteza de naranja c. b.	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Si hay resequedad de las fauces añadir á la poción Sal de Bertholet.

Si hay fenómenos atáxicos los bromuros.

Si hay atascamiento pulmonar la solución de Ivon.

Tiña favas.

Dr. E. Lier	México.
Ioduro puro.....	gram. 1. 00
Colodión.....	30. 00

Uso externo

Dr. Rafael Zapién. Tonalá Chiapas.
Untar glicerina en la cabeza, lavarla bien con jabón, y empaparla con peróxido de hidrógeno.

TIÑA TONSURANTE Y DECALVANTE.

Dr. Federico Cota	La Paz Baja California
Agua destilada.....	gram. 500. 00
Permanganato de potasa.....	„ 10. 00

Lociones.

Si nó cede se empleará la fórmula siguiente:

Vaselina.....	gram. 20. 00
Precipitado rojo.....	„ 1. 50
Azufre sublimado.....	„ 4. 00

Pomada.

Aplicarla á los lugares enfermos.

Tráqueo bronquitis crónica.

Dr. Miguel Cordero	México.
Aceite de hígado de bacalao moreno.....	gram. 200. 00
Polvo fino de iodoformo.....	„ 0. 10

Cucharadas.

Una cucharada diaria con un alimento; en combinación con los baños frios y la aplicación de tintura de iodo en las diversas regiones del tórax.

Tós.

Dr. Alberto B. Orduña	Tehuacán.
AUN CUANDO SEA SINTOMÁTICA DE UN PADECIMIENTO AGUDO Ó CRÓNICO DEL PULMÓN.	
Polvos de Dower.....	gram. 1. 00

Bálsamo de toluí	„	1. 00
Codeína	„	0. 10

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Tos ferina.

Dr. E. Gutierrez Guadalupe E. de Zacatecas.

Jarabe balsámico	gram.	60. 00
Id. de ipeca	„	20. 00
Id. „ sabia de pino	„	20. 00
Bromuro de amonio de 1. 00 á ..	„	2. 00
Extracto de belladona de 0. 01 á ..	„	0. 02

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Agua destilada	gram.	80. 00
Antipirina de 0. 50 á ..	„	1. 00
Jarabe de éter	„	20. 00
Bromoformo de X á ..	XV gotas.	

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Gránulos de Chanteaud de sulfuro de calcio de seis á ocho por día y gránulos de helenina de cuatro á seis por día, y en la noche gránulos de Sal de Gregory de dos á cuatro por día.

Vomitivos frecuentes, inhalaciones balsámicas. Alimentación reparadora; nieve al interior, baños frecuentes frios. Cambio de clima de rigor en los casos graves.

Dr. M. Mucél.

México.

Fumigaciones de ácido sulfuroso en la pieza que debe ocupar el enfermo, dejando en ella las ropas que usa.

Después de ventilada colocar en ella al enfermo.

Flor de azufre

Polvo de ojas de belladona

de 0. 01 á

Id. de flor de yoloxochitl

Para 15 papeles.

Un papel cada dos horas en un jarabe adecuado. Cambio de temperamento.

Dr. C. M Garza San Pedro de las Colonias E. de Coahuila.

Infusión de polígala

Bromuro de sodio

Benzoato de sosa

Agua destilada de laurel cerezo ..

Jarabe de toluí

Id. de belladona

Elixir paregórico

Cucharadas.

Cucharadas, tres ó cuatro en el día.

En los niños chicos cucharadita.

Dr. P. Peña

Zamora. E. de Michoacán.

Clorhidrato de pilocarpina

Cognac

Jarabe de corteza de naranja

Agua destilada de tilia

Cucharaditas.

Consumirlas en veinticuatro horas, dando una después de cada acceso.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre	Tehuacán.
Bromhidrato de quinina.....	grm. 1. 00
Agua destilada.....	„ 60. 00
Jarabe simple.....	„ 60. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Bisulfato de quinina.....	grm. 1. 00
Agua destilada.....	„ 100. 00

Toques.

Tocar varias veces al día la mucosa laríngea y faríngea.

Extracto de corteza de castaña.....	grm. 0. 50
Agua destilada.....	„ 50. 00
Jarabe balsámico.....	„ 50. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Dr. Lázaro Ortega	México.
Agua hirviendo.....	grm. 120. 00
Cochinilla en polvo.....	„ 4. 00
Cuélese y añádase	
Bromuro de potasio.....	„ 2. 00
Jarabe de éter.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora, chica, mediana ó grande según la edad.

Dr. Benjamín Rosano	Mineral del Monte.
Lamedor blanco.....	grm. 60. 00
Bromoformo.....	5 gotas
Tintura de belladona.....	10 gotas.
Id. de drocera.....	4 gotas.
Jarabe de tolú.....	grm. 10. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Dr. Benjamín Treviño San Miguel Allende.
Usa con buen resultado el sulfuro de calcio *recientemente preparado* y las curaciones son tanto más rápidas cuanto más pronto se instituye el tratamiento. La dosis es de 10 á 25 y hasta 50 centígramos por día.

D. Miguel Cordero	México.
Salicilato de bismuto.....	grm. 4. 00
Salicilato de quinina.....	„ 1. 00
<i>En 20 papeles para insuflaciones.</i>	

Un papel cada cuatro horas con un insuflador de bolo por las aberturas de la nariz.

Dr. D. Molinar	Parral.
Jarabe de Desessart.....	grm. 120. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Tos ferina.

Dr. Federico Cota La Paz Baja California.
Cree que hay alguna relación causal entre la aparición de la enfermedad que ataca á los perros y que

se conoce con el nombre de garrotillo y la aparición de la tos-ferina. En dos epidemias de tos-ferina que ha obserbado, fueron precedidas estas por la aparición, un mes antes, del garrotillo en los perros. Tal vez la enfermedad nace en el perro y se trasmite á la especie humana.

Sulfato de quinina..... grm 0, 40

Salicilato de bismuto..... „ 0, 40

Insuflaciones con un tubo en la faringe.

Cambio de temperamemto [al campo.]

Tos sofocativa.

Dr. C. Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Antipirina..... grm. 0, 30

Terpina..... „ 0, 20

Iodoformo..... „ 0, 10

Jarabe fénico..... „ 15, 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Tuberculosis pulmonar.

Dr. Y. Martínez del Villar. México.

Agua destilada..... grm. 50, 00

Glicerina..... „ 4, 00

Acido fénico..... „ 2, 00

Inyecciones subcutáneas.

Cuatro inyecciones en el día, cada una de un centímetro cúbico, asociadas al calomel y á las revulsivas cuando el trabajo congestivo del pulmón y la rápida extensión del proceso tuberculoso lo exijan.

El resultado ha sido brillante aun en un caso en que existían ya cabernas.

Tuberculosis.

Dr. Mucio Maycot. México.

Agua ó vino tónico del Dr.

Maycot..... grm. 120, 00

Extracto fluido de nogal..... „ 10, 00

Hipofosfito de sosa..... „ 4, 00

Guayacol..... „ 1, 00

Glicerina..... „ 15, 00

Cucharadas.

De tres á cuatro cucharadas diarias.

Dr. A. Carreón. San Andrés Chalchicomula E. de Puebla.

Iodoformo en gránulos de un centígramo, de uno á diez unidos al vino de Viviene.

Ha obtenido muy buenos resultados.

Dr. M. Mucél. México.

Emplea las inyecciones hipodérmicas de Guayacol y Eucaliptol, siguiendo el método de Roussel.

Si el mal se localiza en la laringe, agrega pulverizaciones de las soluciones siguientes:

Benzoato de sosa al 5%

Creosota disuelta en alcohol 5 %/.

Acido fénico al 1%

Alternando una ú otra de éstas soluciones según el estado de las ulceraciones laringéas.

En los enfermos agotados y en todo estado que pueda calificarse la estromosa, usa la Emulsión de Scott.

Dr. C. Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Uno á cinco centígramos de creosota, con un gramo de eucaliptina para una inyección hipodérmica, en la espalda todos los días.

Dr. José M. Bandera. México.

Iodoformo..... grm. 0. 20
Codeina..... " 0. 10
Bálsamo de tolú..... " 2. 00

En 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. D. Molinar Parral.

Eucaliptol inyectable de Roussel, una jeringa diaria.

Dr. F. Blazquez. México.

Inyección subcutánea de Guayacol con iodoformo según la forma del Dr. Pignol aplicada en las regiones supraespinosa; comenzando por un gramo cada tercer día y aumentando medio gramo cada tres inyecciones, hasta llegar á tres ó cuatro gramos según la suceptibilidad del enfermo.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Aceite de olivo esterilizado..... grm. 8. 00
Creosota de 0. 50 á..... " 0. 80

Inyecciones.

Una inyección hipodérmica cada tercer día.

Dr. Estevan Calderón. México.

Ejerciendo en Oaxaca, ha tenido ocasión de usar con buen éxito el tratamiento siguiente:

Cápsulas de bálsamo de copaiba hasta producir la saturación, hasta que la orina y el sudor del enfermo presenten el olor del bálsamo. Absteniéndose cuando produzca un efecto purgante. La dosis es de tres á seis cápsulas diarias.

Vegigatorios en la región torásica y en la parte interna de los brazos.

Bebidas pectorales.—Alimentación suficiente con leche y caldos nutritivos.

Ha observado casos en que la consunción había hecho grandes progresos y que se han podido dominar por este método.

La duración del tratamiento ha sido de 40 á 45 días.

Dr. Luis R. Ruiz. Texcoco.

Emulsión de Scott, una cucharada tres veces al día.

Úlceras.

Dr. Eduardo Lamicq. México.

ÚLCERAS VARICOSAS DE LAS PIERNAS

Ergotina al interior y al exterior en pomada.

Dr. Manuel Uribe. México

ÚLCERAS REBELDES DE LAS PIERNAS.

Sulfato ó acetato de cobre..... grm. 0. 12

Vaselina neutra..... " 25. 00

Pomada. (Dr. J. Vértiz.)

Esta fórmula se aplica con éxito á las ulceraciones en general y aún á las epitiliomas ulceradas.