

Dr. C. Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Uno á cinco centígramos de creosota, con un gramo de eucaliptina para una inyección hipodérmica, en la espalda todos los días.

Dr. José M. Bandera. México.

Iodoformo..... grm. 0. 20
Codeína..... " 0. 10
Bálsamo de tolú..... " 2. 00

En 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. D. Molinar Parral.

Eucaliptol inyectable de Roussel, una jeringa diaria.

Dr. F. Blazquez. México.

Inyección subcutánea de Guayacol con iodoformo según la forma del Dr. Pignol aplicada en las regiones supraespinosa; comenzando por un gramo cada tercer día y aumentando medio gramo cada tres inyecciones, hasta llegar á tres ó cuatro gramos según la suceptibilidad del enfermo.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Aceite de olivo esterilizado..... grm. 8. 00
Creosota de 0. 50 á..... " 0. 80

Inyecciones.

Una inyección hipodérmica cada tercer día.

Dr. Estevan Calderón. México.

Ejerciendo en Oaxaca, ha tenido ocasión de usar con buen éxito el tratamiento siguiente:

Cápsulas de bálsamo de copaiba hasta producir la saturación, hasta que la orina y el sudor del enfermo presenten el olor del bálsamo. Absteniéndose cuando produzca un efecto purgante. La dosis es de tres á seis cápsulas diarias.

Vegigatorios en la región torásica y en la parte interna de los brazos.

Bebidas pectorales.—Alimentación suficiente con leche y caldos nutritivos.

Ha observado casos en que la consunción había hecho grandes progresos y que se han podido dominar por este método.

La duración del tratamiento ha sido de 40 á 45 días.

Dr. Luis R. Ruiz. Texcoco.

Emulsión de Scott, una cucharada tres veces al día.

Úlceras.

Dr. Eduardo Lamicq. México.

ÚLCERAS VARICOSAS DE LAS PIERNAS

Ergotina al interior y al exterior en pomada.

Dr. Manuel Uribe. México

ÚLCERAS REBELDES DE LAS PIERNAS.

Sulfato ó acetato de cobre..... grm. 0. 12

Vaselina neutra..... " 25. 00

Pomada. (Dr. J. Vértiz.)

Esta fórmula se aplica con éxito á las ulceraciones en general y aún á las epitilomas ulceradas.

Dr. Manuel de Anaya Guanajuato

Agua destilada fenicada al 1% ..	grm. 64. 00
Alcohol alcanforado	„ 30. 00
Tintura de iodo	„ 30. 00
Id. „ árnica	„ 30. 00

Lavatorio.

Esta fórmula se puede emplear para curar heridas, úlceras, etc., etc.

En seguida se aplicará la fórmula siguiente:

Cerato alcanforado	grm. 32. 00
Trementina blanca	„ 20. 00
Tanino	„ 3. 00

Pomada.

Dr. Emilio Polo Puebla.

ÚLCERAS CANCEROSAS.

El hidrastis como tópico, y al interior hidrastina en gránulos de un milígramo tres en el día.

Dr. Manuel S. Soriano México.

Alcohol común	grm. 30. 00
Ácido fénico	„ 1. 00
Tintura de iodo	„ 2. 00

Tópico.

Úlceraciones simples,

ó SIFILÍTICAS, VALVULARES Y VAGINALES.

Dr. J. Collantes y Buenrostro México.

Vaselina neutra	grm. 30. 00
Aristol	„ 1. 00

Pomada.

ÚLCERAS VARICOSAS.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

ÚLCERAS VARICOSAS DE LAS PIERNAS.

Manteca de cacao	grm. 15. 00
Glicerina	„ 10. 00
Vaselina	„ 10. 00
Acetato de cobre	„ 3. 00

Pomada.

Hacer la curación con la pomada, é inmovilizar el miembro enfermo.

ÚLCERACIONES HIPITILIOMATOSAS.

Dr. Federico Cota. La Paz Baja California.

En la comisura de los labios en la nariz y en los párpados en los viejos. Cauterizaciones con lápiz de sulfato de cobre.

Úlceraciones del cuello de la matriz.

Dr. J. C. y Buenrostro. México

Aristol	grm. 1. 00
Manteca de cacao c. b.	

Para 10 pastillas iguales.

Aplicar una diaria á la hora de acostarse.

Dr. José M. Benítez. Guadalajara.

Aristol de 3. 00 á	grm. 6. 00
Grenetina	} de c. c. cantidad suficiente.
Glicerina	
Agua	

Para 6 pastillas.

Una pastilla en la noche poniéndola en contacto con el cuello de la matriz.

Se puede sustituir el aristol por iodoformo ó calomel á la dosis de un gramo por pastilla.

Uña encarnada.

Dr. L. Gómez V. Tenango E. de México

Cuando no ha habido solución de continuidad.

Agua..... grm. 500. 00

Semillas de estafragua..... „ 5. 00

Para hacer un cocimiento hasta reducirlo á grm. 400. 00

Cucharadas.

Tomar una cucharada en la mañana y otra en la noche.

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo Baja California

Después de hacer la anestesia local con la cocaina, con el éter ó con el bromuro de etila que es el mejor, se introduce la rama planoconvexa de las tijeras del Dr. Servín, entre la uña y la piel, y se corta la uña por el medio. Los fragmentos se quitan con las pinzas tomándolas por el lugar donde se hizo el corte. La curación se hace como en toda herida.



Tijeras del Dr. Guillermo R. Servín para la operación de la uña encarnada.

Uretrotomía.

Dr. J. C. Villaseñor. Morelia.

Para anestesiar la uretra en la uretrotomía interna.

Cloroformo puro de Adrian..... grm. 8. 00

Éter sulfúrico puro..... „ 8. 00

Antipirina de Knoro..... „ 2. 00

Aceite de almendras..... „ 10. 00

Agua destilada..... „ 30. 00

Emulsiones con goma.

Uso indicado.

Una inyección uretral que debe permanecer en el caño de la uretra por tres ó cuatro minutos. Si no basta se repite dos ó tres veces de cinco en cinco minutos.

La anestesia que esta inyección produce, es completa y el autor ha podido operar en diez casos, en que la ha empleado, sin que el enfermo tenga el menor dolor.

Urticaria.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia.

Agua de Goulard..... grm. 60. 00

Alcohol alcanforado..... „ 60. 00

Mentol..... „ 1. 30

Uso externo.

Fricciones sobre las placas de urticaria cada dos horas.

Ferrocitrato de quinina..... grm. 1. 00

Extracto de beleño..... „ 0. 05

En 10 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dos días después si no hay mejoría se usará la antipirina, dando antes un purgante de sal de Seignette 30 gramos.

Vacuna.

Dr. Federico Cota. La Paz Baja california.
Usa dos lancetas; con una toma la linfa y la coloca en la superficie de la piel en el lugar que debe hacerse el piquete, después con la otra lanceta hace varias picaduras en dirección perpendicular como si se practicara el tatuaje.

De esta manera la vacunación es más segura, pues á la mayor parte de los vacunados les prende y no como pasa con la implantación oblicua de la linfa por procedimiento común.

Vaginitis.

Dr. Alberto Aizpuru.	México.
Glicerina.....	gram. 100. 00
Ungüento napolitano.....	" 1. 00
Iodol.....	" 3. 00

Uso externo.

Para untar tapones de algodón hidrófilo que se ponen en la vagina.

Vaginitis aguda.

Dr. M. Mucél. México.
Inyecciones de ácido tánico al 4°/100.
Curación local con polvo del mismo ácido y tapón de algodón hidrófilo.
Pasado el periodo agudo, curación local con nitrato de plata.

Agua destilada.....	gram. 50. 00
Nitrato de plata cristalizado.....	" 0. 50

Toques.

PARA EL DOLOR Ó PRURITO.

Glicerina.....	gram. 20. 00
Clorhidrato de cocaína.....	" 0. 20
Ácido bórico.....	" 1. 00

Toques.

En la forma crónica como modificador local el ictiol é inyecciones con sulfato de alumina y potasa.

Si el escurrimiento es muy abundante, polvos secantes y astringentes.

Dr. F. Blazquez. México.
Tapón de algodón cada cuatro días embebido de ictiosulfato de amoniaco.

Dr. J. M. Benstes.	Guadalajara.
Aristol de 3 á.....	gram. 6. 00
Grenetina.....	} de c. c. cantidad suficiente.
Glicerina.....	
Agua.....	

Para 6 pastillas.

Una todas las noches en la vagina.
Se puede sustituir el aristol con el calomel ó con el iodoformo á la misma dosis.

Vaginismo.

Dr. J. Mejía. México.
Cree con Larvson Fail que no existe y que los dolores y la imposibilidad de las relaciones sexuales son debidas á algunas grietas, fisura ó solución de continuidad que es preciso curar. Aconseja usar de la len-

te si es necesario y con una sonda delgada de Hégar, tocar punto por punto; la enferma acusará el dolor al tocar el lugar enfermo. Emplea para su tratamiento; lavatorios de ácido bórico al 4% y toques con ácido fénico en solución concentrada, lavando inmediatamente y poniendo luego glicerolado de almidón con tanino, preparándolo de la manera siguiente:

Glicerina pura	40. 00
Almidón	8. 00
Tanino	4. 00

Póngase al fuego y agítese constantemente hasta que se haga como *engrudo*.

Glicerolado de almidón con tanino.

Vegetaciones.

DE ORIGEN VENEREO.

Dr. P. Peña	Zamora. E. de Michoacán
Agua destilada	20. 00
Glicerina	20. 00
Agua de laurel cerezo	20. 00

Uso externo.

Se hace un lavatorio tres veces al día y se deja constantemente un lienzo mojado en la misma solución, sobre las vegetaciones. Este tratamiento en las pequeñas vegetaciones que es donde se ha experimentado y siempre ha dado buenos resultados.

Dr. Federico Cota.	La Paz. Baja California.
Papaina	2. 00
Glicerina neutra	10. 00

Alcohol alcanforado	5. 00
Ácido fénico	3. 00

Toques.

Tocar con un pincel las vegetaciones.

Viruelas.

Dr. E. Herrera Moreno. Córdoba E. de Veracruz.

Para evitar las cicatrices en la cara, usa un lavatorio de sublimado al 1 para 2,000 y cubre la cara con caucho laminado untado con la siguiente pomada.

Vaselina blanca	25. 00
Óxido de zinc de 5. 00 á	10. 00
Iodoformo	2. 00

Pomada.

Dr. Luis R. Ruiz Texcoco, E. de México.

Linfá vacunal en su forma original, una gota en una onza de agua pura para tomar una cucharadita por tres días como preservativo y como remedio curativo una cada dos horas.

Dr. Ernesto Chávez Córdoba.

EN EL PERIODO CURATIVO.

Vaselina	30. 00
Calomel	3. 00
Ácido bórico	5. 00

Pomada.

Dr. Luis L. Cordero San Luis Potosí.

Agua	60. 00
Ácido crisofánico	0. 25

Toques.

Tocar con un pincel las vecículas.

Ungüento doble grm. 15. 00

Esencia de trementina „ 15. 00

Pomada.

Poner la pomada sobre las pústulas.

Régimen lácteo.

Baños en el periodo de supuración.

Vómitos incoercibles.

Dr. C. Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Un gránulo todos los días de atropina al milígramo.

Mentol grm. 1. 00

Alcohol „ 8. 00

Agua destilada „ 15. 00

Jarabe simple „ 30. 00

Tintura de iodo III. gotas

Cucharadas.

Para tomar una cucharada cada vez que haya vómito, muy particularmente en los de las mujeres embarazadas.

Dr. Lorenzo Cantú. C. Porfirio Diaz E. de Coahuila.

Antipirina grm. 0. 60

Cocaína „ 0. 03

Para 3 papeles.

Un papel cada hora.

Dr. P. Peña Zamora. E. de Michoacán.

Agua destilada de tilia grm. 70. 00

Alcoholado de menta „ 5. 00

Jarabe de canela „ 15. 00

Clorhidrato de cocaína „ 0. 10

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzicuaró.

Tintura de nuez vómica grm. 1. 00

Leche fresca „ 120. 00

Cucharadas.

Cuatro cucharadas la 1.^a hora, tres la 2.^a, dos la 3.^a y en seguida una cada hora.

Dr. Emilio Polo Puebla.

VÓMITOS PETUITOSOS EN LOS ALCOHÓLICOS.

Tintura de ipecacuana 6 gotas.

Agua grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Gránulos de sulfato de estriquina de un milígramo, tres en el día.

Dr. Francisco de P. Crespo Huamantla.

VÓMITOS NERVIOSOS.

La poción antiemética de Rivier añadiendo á la solución alcalina, dos gramos de bromuro de potasio.

Otra.

Solución de goma arábica grm. 150. 00

Subnitrito de bismuto „ 4. 00

Bromuro de potasio „ 2. 00

Jarabe de morfina „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Ciro M. Santelices.	Querétaro.
Poción de Rivier	grm. 100. 00
Bromuro de potasio	„ 2. 00
Cocaina	„ 0. 10
Cognac	„ 30. 00
Jarabe de éter	„ 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora ó cada hora.

Dr. Ricardo Egea y Galindo	México.
Poción de Rivier hecha con jugo de limón y no con ácido cítrico	grm. 200. 00
Clorhidrato de narceína	„ 0. 10
Jarabe de limón c. b.	

Ponerla en Sifón y dar dos cucharadas grandes cada hora.

Dr. Páramo Rangél	México.
Cocimiento de crameria	grm. 120. 00
Salicilato de bismuto	„ 4. 00
Extracto de monesia	„ 0. 60
Jarabe de crameria c. b.	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

FIN.

FÉ DE ERRATAS

DEL

Formulario de la Facultad Médica Mexicana.

PÁGINA.	LÍNEA.	DICE	DEBE LEERSE
3	27	Wacelina	Vaselina.
8	17	Ergontina	Ergotina.
13	9	Solución arsenical	Solución arsenical.
„	15	Arceniato, etc., etc.	Arseniato, etc., etc.
19	13	Acido arsenioso	Ácido arsenioso.
21	5	Dr. José Torres	Dr. José Terrés.
„	19	Dr. Federico Coto	Dr. Federico Cota.
22	2	ordinariamente se ven en las	ordinariamente se ven en los
23	9	Artritis crónico	Artritis crónica.
„	15	Ascarides lumbricoides	Ascáridas lumbricoides
24	18	Aristolía.	Asistolía.
„	20	Tintura de estrofantus.	Tintura de estrofantus.
„	25	Dusetino	Duretina.
27	7	Una cucharada	Una cucharadita.
„	24	arseniato	arseniato.
30	2	Blefositis	Blefaritis.
34	3	de óxido	de ácido.
35	19	Para 15 papeles	Para 15 candelillas.
36	9	de Towler	de Fowler.
„	10	Neumonía	Bronconeumonía.
36	17	Fosfuro de zine grm. 0.75	Fosfuro de zinc gr. 0.075
„	25	Dr. José Torres	Dr. José Terrés.
37	8	el biioduro	el biioduro.