

acide borique 3 p. 100, tannin 2 p. 100. On peut arriver à la cystotomie sus-pubienne ou à la col-pocystotomie (chez la femme).

Cystite tuberculeuse. — Traitement général reconstituant; Guyon fait des injections de XXX gouttes de sublimé à 2 p. 1000; ou curetage après taille hypogastrique.

D

Dacryocystite.

Emollients, incision avec le couteau de Weber puis dilatation avec sonde de Bowman, injections au nitrate d'argent au 300°.

Dartres.

Après un bain tiède, mettre chaque soir:

Borate de soude..... 2 gr.
Glycérolé d'amidon..... 50 — (Besnier.)

Datura stramonium.

(Solanée). — Succédané de la belladone. A l'intérieur, poudre de feuilles, infusion 0 gr. 05 à 0 gr. 50 pour 150 gr. eau.

Extrait alcool 0 gr. 02 à 0 gr. 10. Cigarettes contre l'asthme (Codex).

Dax (Landes).

(Note communiquée par M. le Dr Labatut, médecin consultant.)

Station fréquentée toute l'année, mais particulièrement d'avril à novembre.

Principaux établissements :

Les Baignots, hôtel.

Thermes de Dames, hôtel.

Therme Seris, hôtel.

Bains Saint-Pierre, pas d'hôtel.

Thermes Salins, pas d'hôtel.

Gratuité des soins médicaux et du traitement balnéaire, pour les membres du corps médical et leurs familles. Il est fait en outre, aux médecins, une notable réduction sur le prix de la pension.

Les thermes Salins utilisent les eaux salées et les eaux-mères, qui leur sont fournies par les Salines de Dax.

Les autres établissements sont propriétaires de sources abondantes classées parmi les *sulfatées calciques* faibles, hyperthermales (60°), et de boues végéto-minérales, hyperthermales.

Indications. — Le rhumatisme chronique dans toutes les manifestations; les névralgies et les névroses; les suites de traumatisme (entorses, luxations), la diathèse urique, le lymphatisme, la scrofule, etc.

Contre-indications. — Lésions cardiaques non compensées, les néphrites; les sujets prédisposés aux congestions sanguines et, d'une manière générale, toutes les affections à l'état aigu.

Décoction.

Préparation à ébullition dans l'eau : belladone (10 à 20 p. 100), citron (2 fruits 0 p. 1000), condurango (50 p. 1000), eucalyplus (20 p. 1000), fougère mâle (12 p. 1000), guimauve (30 p. 1000), noyer (30 p. 1000), ortie (30 p. 1000).

Délire.

Glacé sur la tête, bains tièdes, bromure de potassium, chloral.

Delirium tremens.

Chloral, morphine, alcool. Maintenir le malade au lit.

Démangeaisons.

Éviter les causes (charcuterie, poissons, coquillages). Bains de son.

Bains de nisaméline (guaco de Trouette-Perret) et 2 à 4 pilules de nisaméline à chacun des deux principaux repas.

— *Vulvaires*. — Cautérisations au nitrate d'argent à 1/10^e et applications de la pommade suivante :

Orthoforme.....	2 gr.
Chlorhydrate de cocaïne.....	1 —
Lanoline.....	5 —
Vaseline.....	15 —

Matin et soir.

Dengue.

Repos, diète, laxatif léger; si intense, grogs, glace contre vomissements. Chloral contre insomnie; convalescence, reconstituants.

Dentifrices.

Poudre:

Poudre de charbon.....	10 gr.
Poudre d'iris de Florence.....	10 —
Craie lavée porphyrisée.....	10 —
Pierre ponce porphyrisée.....	10 —
Saccharine.....	0 gr. 10
Menthol.....	1 gr.
Cachou (pulvérisé).....	3 —

Opiat:

Salol.....	25 gr.
Corail rouge en poudre.....	125 —
Cannelle fine en poudre.....	30 —
Cochenille.....	15 —
Alun.....	6 —
Miel très beau.....	312 —
Eau.....	15 —

Elixir (eau de Botol).

Extrait de cèdre.....	1 litre
— de myrrhe.....	250 gr.
— de ratanhia.....	250 —

Essence de lavande.....	5 gr.
— menthe.....	8 —
— roses.....	3 —

Colorer en rouge S. A.

Dentition.

Enfance: 1^o donner à l'enfant une racine de guimauve; 2^o frictions légères sur les gencives avec sirop *Delabarre*; 3^o scarifications légères de la gencive.

Adultes. Contre la douleur: lampons de cocaïne au 1 p. 20 (cracher), essence de clou de girofle.

Dermatol.

Succédané inodore de l'iodoforme, poudre.

Désinfection.

Etuvage de tous les objets portatifs; les gros meubles et les pièces sont désinfectées au formol (pulvérisations et lavages) et avec les vapeurs concentrées d'aldéhyde formique ou d'acide sulfureux (100 gr. de soufre par mètre cube).

Diabète.

(Sucré). — Le régime alimentaire domine la thérapeutique. Suppression complète des aliments sucrés et abstention le plus possible des féculents (pain, haricots, pois, pâtes alimentaires). Sucre avec de la saccharine ou de la glycoïne. Remplacer le pain si possible par du pain de gluten, d'aleurone, de Pavy. Les aliments gras sont recommandés; les aliments préparés à la sauce, défendus. La bière, le vin coupé d'eau alcaline, permis; cidre, vin pur ou sucré, défendus. Le lait est un aliment pour le diabétique. Ne pas oublier que le diabétique doit boire beaucoup, tant qu'il a soif. Un exercice modéré sans fatigue de peur du coma; l'hydrothérapie, le massage, la gymnastique sont indiqués.

Médicaments. — L'antipyrine, 2 gr. par jour, ou mieux le pyramidon, 1 gr. en cachets, doivent être donnés pendant une semaine, cesser une semaine et reprendre. Dans l'intervalle donner 2 fois par jour une pilule.

Extrait d'opium.....	0 gr. 05
Extrait de belladone.....	0 gr. 02

S'il y a des symptômes nerveux: bromure de potassium 3 gr. par jour. Contre l'affaiblissement: arséniate de soude 5 mill. par jour; méthylarsinate de soude 0 gr. 10 en cachets; injections hypodermiques de cacodylate de soude 0 gr. 05; teinture de kola X gouttes avant chaque repas.

Saisons à Vichy, Vals, Carlsbad (alcalines); à Royat, à la Bourboule (arsenicale); à Vittel, Contrexéville (goutte).

En cas de coma diabétique: régime lacté, purger avec: sulfate soude 30 gr.; eau-de-vie allemande 20 gr. Frictions générales à l'eau de Cologne; injections hypodermiques de: caféine 0 gr. 50; sérum artificiel de Hayem 500 gr. Donner bicarbonate de soude 10 gr. par jour.

Levure de vin ou de bière.

Diachylon.

Occlusion des plaies, ceintures contre fractures des côtes.

Diaphorétiques.

Jaborandi, pilocarpine, bourrache, douce-amère, salsepareille, etc.

Diarrhée.

Adulte. — Diète; prendre:

Naphtol β.....	0 gr. 25
Salicylate de bismuth.....	0 gr. 75

Pour un cachet, n° 4.

Un toutes les deux heures jusqu'à effet.

Ou tannigène, 2 gr. par jour en cachets.
Si intense, purgatif léger; 15 gr. de sulfate de soude.

Chronique. — Régime: lait, eau de riz, pommes de terre. Porter une ceinture de flanelle. Prendre:

Tanin à l'alcool.....	0 gr. 10
Phosphate de chaux.....	} 0 gr. 25
Salicylate de bismuth.....	

Pour un cachet.

Trois par jour.

Enfant. — 1^{er} âge, régulariser les tétées (toutes les deux heures); administrer de 2 à 5 gr. de bismuth; diète hydrique.

Diarrhée verte. — Diète hydrique, potion à l'acide lactique dans du sirop de coing; 1 gr. p. 60, par cuillerées à café toutes les demi-heures. En cas d'insuccès: calomel, eau de riz; tannigène 0 gr. 50 en paquets.

En cas d'adynamie: sérum artificiel, éther, alcool, caféine (0 gr. 20 par jour).

— **chronique.** — Lait stérilisé, képhir, calomel, antiseptiques (benzonaphtol, 0 gr. 20).

Diascordium.

Électuaire antidiarrhéique, un gramme correspond à environ 6 milligr. d'extrait d'opium; dose, 2 à 8 grammes loin des repas.

Diastase.

Principe actif de la salive retrouvé dans les végétaux (Maltine).

Dose, 0 gr. 50 à 1 gr.

Diazoréaction d'Ehrlich.

(Note communiquée par M. A. Plissonnier.)

Dans les affections fébriles, fièvre typhoïde, tuberculose miliaire aiguë, péritonite, scarlatine, etc., la diazoréaction est constante.

Voici en quelques mots la technique de l'opération :

Solution A	{ Eau distillée.....	1 000 c. c.
	{ HCl pur.....	50 c. c.
	{ Acide sulfanilique....	Q. S.
Solution B	{ Nitrite de soude.....	0 c. c. 50
	{ H ² O	100 c. c.

A 5 c. c. d'urine à essayer on ajoute 5 c. c. de solution A, puis V gouttes du B; on mélange et on ajoute XXX gouttes d'AzH³.

Toutes les fois que la diazoreaction sera positive l'urine renfermera, en proportion exagérée, les dérivés conjugués du scatol et de l'indol, et, par suite, il y aura exagération du processus des fermentations putrides.

Digestif.

(Modifications de l'appareil.) Antisepsie de la bouche et du pharynx, sialagogues et antisialagogues.

Estomac: absorbants; charbon, carbonates.

Calmans; glace cocaïne (0 gr. 25 p. 300 eau); apéritifs, antiseptiques, vomitifs, antivomitifs, lavages. Liqueur d'Hoffmann V gouttes dans 1/4 de verre d'eau à 2 heures des repas.

Digitale.

Pourprée (scrofulariacée). Tonique du cœur, augmente la tension, diurétique.

• Ni trop, ni trop peu, ni trop souvent, ni trop longtemps • (Huchard). Suspendre au bout de 4 jours, fractionner les doses. Elle ralentit les battements du cœur en augmentant leur force.

Macérations de feuilles de digitale de 0 gr. 30 à 0 gr. 80
Extrait alcoolique..... 0 gr. 05 à 0 gr. 20
Sirop de digitale, 10 à 50 gr. (20 gr. = 0 gr. 50 de teinture.
Teinture éthérée, X à XL gouttes.
Extrait aqueux, 0 gr. 10 à 0 gr. 30 en pilule.

Teinture alcoolique, XXX à XL gouttes chez les enfants :

- I à III gouttes de 6 à 15 mois (Marfan).
- V à X gouttes au-dessous de 3 ans.
- X à XV, de 3 à 5 ans.

Vin de Trousseau.

Baies de genièvre.....	300 gr.
Scille.....	30 —
Acétate de potasse.....	200 —
Feuilles de digitale.....	6 —
Vin blanc.....	4000 —
Alcool à 90°.....	500 —

Doses de 2 à 3 cuillerées à potage par jour.

Digitaline.

Amorphe du Codex, 1/2 à 1 milligr. 1/2 (2 par jour), à éviter.

Crystallisée : 1/4 de milligr. pour un granule (Nativelle). Huchard prescrit en une fois et pendant un jour 40 à 50 gouttes de solution de digitaline cristallisée au 1 000 (solution de Potain); si l'indication persiste, recommencer au bout de quinze jours.

Diiodoforme.

Succédané plus puissant que l'iodoforme.

Dilatation.

Du cœur, repos, diète lactée, suppression du tabac. Iodure de potassium. Si oppression: ventouses.

Estomac. — Manger lentement, boire peu (régime sec), un verre de bière coupée d'eau par repas.

Ni potages, ni crudités, ni fruits (sauf fraises, bananes, raisins): ne pas distendre l'estomac.

Électuaire avec:

Salicylate de bismuth.....	} à 10 gr.
Charbon pulvérisé.....	

Extrait de belladone.....	0 gr. 40
Miel blanc.....	140 gr.
Glycérine n. à 30°.....	60 —

Une cuillerée à café après chaque repas, 3 par jour (confiture de Picot). Si utile, dans un pain azyme.

Affleurement léger, le matin, au niveau de l'estomac; lavage de l'estomac avec tube de Faucher. Si constipation :

Aloès pulvérisé.....	} aâ 2 gr.
Résine Jalap.....	
Résine scammonée.....	} aâ 0 gr. 50
Calomel.....	
Extrait de belladone.....	} aâ 0 gr. 20
— jusquiame.....	
Savon pulvérisé.....	Q. S.

Pour 25 pilules purgatives et laxatives. 1 à 2 le soir avant le repas ou au coucher. (Robin.)

Bronchique. — Éviter la fatigue; hiver: littoral; méditerranéen.

Utérine, obtenue par les lamineaires ou les bougies de Hégar.

Dionine.

(Chlorhydrate d'éthylmorphine.) — Employée comme sédatif et comme calmant dans la phtisie, la bronchite, l'asthme, la pneumonie, etc., elle est plus active que la codéine et présente de sérieux avantages sur la morphine. Elle procure un état de calme général, un bon sommeil; elle facilite la respiration et paraît avoir une action favorable sur les sueurs nocturnes des phtisiques.

S'ordonne aux mêmes doses que la codéine, et, vu sa solubilité, s'emploie bien en injections sous-cutanées. Serait ainsi, paraît-il, un moyen de traitement précieux dans la cure du morphinisme. On donne dans ce cas 0 gr. 05 à 0 gr. 08 par injection, et l'on en administre jusqu'à

0 gr 40, 0 gr. 60 et même 1 gr. par jour. En pilules, solution, sirop de 0 gr. 01 à 0 gr. 04.

Diphthérie.

On ne peut guère se fier aux symptômes, à la température pour diagnostiquer l'angine diphthérique. Donc, en présence de toute angine, il serait prudent de faire l'examen bactériologique, non seulement pour savoir s'il y a du bacille de Loeffler, mais encore pour connaître les associations microbiennes qui modifient beaucoup le pronostic. En présence de toute angine — puisque la diphthérie prend tous les masques — il est aussi prudent de faire une injection de 15 c. c. de sérum de Roux sous la peau du flanc. Il n'y a aucun danger même s'il ne s'agit pas de diphthérie. Le traitement local consiste en irrigations plusieurs fois par jour de liqueur de Labarraque, 50 gr. pour 1 litre d'eau. Il est très important de ne pas porter de caustique ni de toxique sur la gorge diphthérique. On répète l'injection de sérum suivant la température et l'état général. Isolement complet pendant un mois au moins; désinfection des linges et literie à l'étuve ou l'ébullition, des mains des assistants au sublimé à 1 p. 1000; de la pièce au formol ou à l'acide sulfureux. Alimentation très tonique pendant toute la maladie: jus de viande, œufs, lait, alcool, café. — Si adynamie, injection d'éther, 4 c. c. et de caféine, 0 gr. 50 par jour.

Paralysies. — Électricité faradique, massage, bains sulfureux ou salés. Donner à l'intérieur des tétanisants: strychnine (sulfate, 10 granules de 1 milligr. par jour); injections hypodermiques: 0 gr. 50 p. 100, 1 à 2 seringues de 1 c. c. en sirop 1 à 2 cuillers à soupe. Les injections hâtives de sérum de Roux en préservent.

Les *urticaires* et *gonflements articulaires* avec fièvre sont la conséquence du sérum et n'offrent aucun danger.

Diurétique.

A prendre 1 gr. par dose, six fois par jour.

Diurétiques.

Acétate de potasse (1 à 10 gr.); scille (poudre 0 gr. 20 à 0 gr. 60 pilules); lait, lactose (100 gr. par jour); théobromine (2 gr. puis progressivement 3, 4 gr.); queues de cerises (infusion 30 p. 1000); bourrache, chiendent, violette, stigmates de maïs (infusion 30 p. 1000).

Divonne-les-Bains (Ain).

(Note communiquée par M. le Dr F. Baup, médecin consultant.)

Etablissement hydrothérapique, ouvert toute l'année, pour le traitement des maladies nerveuses et de la nutrition.

Eau peu minéralisée, *très froide, constante à 6°,5 C.*, permettant des applications hydrothérapiques extrêmement *courtes, mais énergiques.*

Hydrothérapie chaude et froide de tout genre: douches, bains, demi-bains, piscines, bains de vapeur, bains médicamenteux et électriques, lavages de l'intestin. Cure d'altitude, d'air, cure de soleil.

Mécanothérapie, massage médical, gymnastique suédoise.

Electricité sous toutes formes, galvanique, faradique, statique, haute fréquence, etc.

Cure de *repos, d'isolement*, régimes alimentaires. Un des médecins de l'établissement y habite toute l'année.

Indications thérapeutiques. — Toutes les maladies nerveuses et de la nutrition, névrose; neurasthénie, hystérie, etc.; vertiges, névralgies, sciatique; migraine, chloro-anémie, faiblesse génitale; dysménorrhée, métrites chroniques, paralysies, obésité, arthritisme, constipation; morphinomanie, dipsomanie, etc.

En résumé, établissement hydrothérapique où

l'on traite les *maladies nerveuses* et de la *nutrition*. Ouvert *toute l'année*, un médecin y réside constamment. Spécialement organisé pour les traitements durant l'hiver.

Douce-amère.

(Solanée). Infusion 20 p. 1000, calmant.

Douches.

Locales (hépatique, splénique, épigastrique, hypogastrique, vaginale, périnéale, ascendante).

Générales. — Agissent sur tout le corps moins le visage.

Les douches sont : chaudes, froides, écosaisies (portées progressivement de 30° à 45° et suivies d'un jet froid très rapidement donné), alternatives (chaudes et froides, pendant des périodes égales, par séries de 2, 3, 4 alternances).

Douches mobiles :

a. En jet. — b. En éventail. — c. En pomme d'arrosoir.

• Le malade tournant le dos à l'opérateur, le jet, brisé incomplètement par la palette, doit être dirigé à la hauteur des vertèbres cervicales, de là porté rapidement du côté droit de la colonne vertébrale puis sur les pieds. On remonte de même pour le côté gauche puis on fait tourner le malade pour procéder de même en avant. (Verrier.)

Douche en pluie. — Large pomme d'arrosoir à 2^m,50 à 3 mètres au-dessus du sol.

Douche en colonne. — Un tube circulaire remplace la pomme d'arrosoir. Son diamètre est de 1 à 2 cent. 1/2 de diamètre.

Douche en cercle ou en poussière. — Série de cerceaux superposés, distants de 12 à 15 centimètres.

Douche en promenade (Level). — Un cylindre long de 4^m,50, creux, percé de nombreux trous,

sert à produire une pluie sous laquelle se promène le patient.

Effet d'une douche. — Froid, réaction (Durand-Fardel).

Indications. — Anémie, chlorose, hystérie, hystéro-épilepsie, chorée (30° puis plus froide). Neurasthénie (30°, plus tard refroidie jusqu'à 15°) maladie de Basedow

Scléroses. — Constipation (douche ascendantes).

Contre-indications: néoplasmes, poussées congestives, tuberculose fébricitante, cardiopathies.

Mode d'administration: avant : exercice modéré, 12 à 15° de durée. Support sur lequel peut s'appuyer le malade qui doit respirer largement. Température de la salle 15°.

En cas de suffocation, prendre avant la douche un pédiluve chaud.

Réaction énergique, friction, massage.

Douleurs ostéocopes.

Frictions mercurielles avec onguent napolitain. Iodure de potassium.

Drap mouillé.

Dans les pyrexies.

a) *Enveloppement.* — Lorsqu'il est impossible de donner des bains, on enveloppe le patient dans un drap plongé dans l'eau froide et plus ou moins desséché suivant l'effet cherché. Par dessus ce drap on place une couverture.

La durée variera suivant que l'on recherche une action calmante, excitante, sudorifique, réfrigérante.

b) *Drap mouillé.* — On n'ajoute pas de couverture. Des frictions générales facilitent la réaction.

Drastiques.

(Purgatifs). — *Cholagogues* : aloès (poudre

o gr. 50 à 2 gr.); podophyllin (o gr. 01 à 0.06), *hydragogues* : calomel (o gr. 30 à 1 gr.); jalap (poudre o gr. 50 à 2 gr. pilules); turbith végétal (poudre o gr. 25 à 1 gr.); scammonée (poudre o gr. 30 à 1 gr. dans lait); gomme-gutte (o gr. 10 à o gr. 30); coloquinte (o gr. 10 à o gr. 60); bryone (poudre de racine o gr. 50 à 4 gr.); huile de croton (I à III gouttes).

Drosera.

(Droséracée), plante carnivore. — Teinture : par dose V gouttes, par jour XX à XL gouttes, contre la toux spasmodique (coqueluche). Enfants, V à X gouttes par jour et année d'âge.

Duboisine.

(Sulfate de). Mydriatique; en solution de 0,50 p. 100 instillation (Galezowski.)

En injection hypodermique:

Sulfate neutre de duboisine.....	0 gr. 01
Eau de laurier-cerise.....	20 gr.

Une seringue de 1 c.c. pro die (Dujardin-Beaumetz).

Calmant et hypnotique dans les « affections mentales, accompagnées d'excitation d'insomnie » (Bocquillon-Limousin).

Dysenterie.

Repos, diète, opiacés; débiter par purgatif salin (sulfate de magnésie 25 gr.). Si troubles digestifs vomitif (ipéca 4 à 8 gr. en infusion dans 125 gr. eau, une cuillerée à bouche toutes les deux heures); calomel à dose fraction, o gr. 10 pour un paquet (toutes les heures ou les deux heures jusqu'à 12); comme adjuvant, vin, café, alcool.

Chloral (2 à 4 gr.) ou morphine.

Si intermittente : sulfate de quinine.

Si chronique : nitrate d'argent (o gr. 02 en pilule ou lavement).

Dysménorrhée.

Apiol au moment des règles; hydrastis canadensis dans les périodes inter-menstruelles (XX à XXX gouttes par jour). Dilatation du col utérin.

Electrisation, courant continu, intensité 20 millampères. Séances de dix minutes, deux à trois fois par semaine. Pôle +, électrode indifférente sur l'abdomen. Pôle — au niveau de l'utérus.

Frictions calmantes en cas de douleur avec liniment calmant.

Dyspepsie.

Il est indispensable de faire l'analyse du suc gastrique. Mettre dans l'ordonnance toutes indications pour le régime alimentaire.

Hyperchlorhydrie. — Suppression du tabac, de l'alcool. Vie calme et régulière, abstention de travaux intellectuels exagérés. Pas de préoccupations. Régime lacté exclusif : 3 litres par jour pendant une quinzaine; ensuite : trois repas par jour dont le principal est le déjeuner. Viandes rôties, grillées, surtout blanches; on peut la pulper s'il y a des douleurs. Interdire la charcuterie, le gibier, les viandes grasses. Les œufs sont recommandés. Le pain, réduit à 50 gr. par repas, sera grillé. Sucrieries et féculents sont interdits. Légumes verts, purées au tamis. Boisson : eau en infusion chaude; camomille, tilleul en petite quantité. Pas de médicament : sauf sulfate soude 10 gr. le matin à jeun dans eau tiède. Hydrothérapie, massage, exercice modéré.

Hyperchlorhydrie avec hypersécrétion. — Régime lacté absolu, ensuite même régime que plus haut et en plus 10 paquets par jour de :

Bicarbonate de soude.....	1 gr.
Craie préparée.....	0 gr. 50

Cinq après chaque repas d'heure en heure.

Bains tièdes s'il y a de fortes douleurs. Massage et lavements froids contre la constipation. Lavages de l'estomac tous les jours avec bicarbonate de soude 20 p. 1000. Cure thermale à Vichy, Carlsbad.

Hypopepsie. — Régimelacté ou mieux képhirien dans les cas graves; dans les autres : stimuler l'appétit avec les amers : Baumé X gouttes, teinture de noix vomique XX gouttes, de rhu-barbe XX gouttes, d'absinthe XV gouttes, une demi-heure avant chaque repas. Orexine 0 gr. 30 en cachet; bicarbonate de soude 0 gr. 75 en cachet, une demi-heure avant chaque repas. Poudre d'ergot 0 gr. 50 après les repas. On combat les douleurs avec : eau chloroformée 1 à 2 cuillerées à soupe; cocaïne 0 gr. 05 en pilules, potion; extrait d'opium 0 gr. 03; extrait belladone 0 gr. 03 en pilules; menthol 0 gr. 50 en cachets, pilules, ou encore acide chlorhydrique 2 p. 100, 1 cuillerée à soupe une demi-heure après le repas. Même régime alimentaire que dans l'hyperchlorhydrie. Supprimer vin, café, alcool, tabac. Hydrothérapie, massage, électricité faradique. Exercice modéré, éviter le surmenage.

Dyspnée.

Affection fébrile, antithermique et bains froids. — *Affection laryngée,* trachéotomie; dans la diphtérie tubage. — *Affection pulmonaire,* injection de morphine, révulsion locale, enveloppements humides, bains froids. — *Tuberculose,* vaporisation d'eau chaude; inhalations d'oxygène, d'acide carbonique (ballon Limousin). — *Pleurésie,* signe trompeur, le déplacement des organes est seule indication de thoracentèse. — *Affection cardiaque,* digitale 0 gr. 50, infusion; iodure de potassium 3 gr., morphine 0 gr. 01. — *Affection rénale,* régime lacté. — *Anémie, chlorose:* fer, arsenic. — *Affection des fosses nasales:* enlever obstacle (polypes, végétations).