

Expectorants.

Émétique, ipéca; kermès (0 gr. 20 à 0 gr. 30 en potion).

Extraits.

Obtenus par évaporation (alcoolique, éthéré, aqueux).

Extrait de saturne (Eau blanche). — Résolutif. Entorses.

Extrait thébaïque. — Opiacé dose : 0 gr. 05 (pilules).

F**Faciale.**

(Hémiplégie). — Les paralysies faciales peuvent être d'origine cérébrale, bulbaire, périphérique; celles qui sont consécutives à un traumatisme du rocher exigent un traitement chirurgical (Faure). Toutes les autres sont justiciables de l'électricité pendant quinze jours (bénignes) ou trois ou quatre mois (après réaction de dégénérescence constatée). Pour lutter contre la lésion causale, galvanisation, les électrodes étant sur les mastoïdes, courant de 8 milliampères pendant cinq minutes. Pour lutter contre l'atrophie on place l'électrode + dans la main du côté malade, courant continu de 5 milliampères, le négatif, promené ensuite sur les points moteurs du facial; relier les fils à machine faradique gros fil, électriser par faradisation tous les muscles faciaux (cinq minutes). Séance tous les jours.

Le plus à redouter est la contracture; dans ce cas, galvanisation positive sans faradisation. Massage de la région. Si la syphilis est en cause : injections de calomel.

Faiblesse congénitale.

Couveuse artificielle. Nourrir l'enfant avec

du lait injecté goutte à goutte dans les narines. Sérum artificiel. — Température de la couveuse, 37°.

Farines.

Émoullientes : lin, orge, riz, seigle (ã).

Résolutives : fenugrec, fèves, lupin, orobe (ã).

Favus.

a. Débarrasser le cuir chevelu des croûtes (cataplasmes); b. couper les cheveux ras; c. épilation méthodique par région; d. lotion à l'eau oxygénée.

Périodes de repos suivies de reprises du traitement.

Fécules.

Riz, amidon, pomme de terre, etc.

Fenouil.

(Ombellifère). — Excitant général; diminue les pulsations en augmentant leur force. Infusion de racines et semences 10 p. 1000. Hydrolat 25 à 50 gr. Huile volatile I à X gouttes.

Fenouil.

(Faux). — Thapsia dont on fait un emplâtre auquel Manquat ne trouve que des inconvénients : irritation inutile. (Bronchite.)

Fer et ferrugineux.

Eaux ferrugineuses (Bussang, Forges, etc.). Artificielle : mettre dans un flacon des débris de fer, remplir d'eau, vider, exposer à l'air quelques heures (oxydation) puis remplir d'eau au moment du repas et agiter. Vider ensuite jusqu'au repas suivant.

Incompatibilité du fer et du tanin (encre).

Fer réduit par l'hydrogène (bonne préparation insoluble) 0 gr. 10 à 0 gr. 20.

Perchlorure de fer (liquide) à l'extérieur : hémostatique.

Albuminate de fer : 0 gr. 25 à 0 gr. 50 par jour (soluble).

Peptonate de fer : 0 gr. 50 à 2 gr. par jour (soluble).

Carbonate de fer : 0 gr. 10 à 0 gr. 50 par jour (insoluble).

Oxyde de fer hydraté : 0 gr. 10 à 0 gr. 50 par jour (insoluble).

Protoxalate de fer : 0 gr. 20 à 0 gr. 40, 1/2 dose (enfants) insoluble.

Citrate de fer : 0 gr. 10 à 1 gr. (soluble).

Lactate de fer : 0 gr. 10 à 4 gr. (soluble).

Protochlorure de fer : 0 gr. 10 à 0 gr. 30 (soluble).

Protoiodure de fer : 0 gr. 10 à 0 fr. 50 (soluble).

Tartrate ferrico-potassique soluble, caustique, à étendre 1 à 2 gr.

Ferments.

Digestifs. — Acide chlorhydrique, diastase, pancréatine, pepsine.

Fève de Saint-Ignace.

Poudre de 0 gr. 02 à 0 gr. 25 (principe actif : strychnine, brucine).

Fibrome utérin.

Galvanisation : anode + au niveau de l'utérus, cathode — indifférente, large, sur l'abdomen. Séances trois fois par semaine, intensité progressive de 10, 20, 40, 60, 100 jusqu'à 200 milliampères (ne pas heurter la tolérance), durée dix à vingt minutes. Doit être essayé avant tout autre traitement si : 1° fibrome petit ou moyen ne dépassant pas l'ombilic; 2° unique ou peu lobulé, intersti-tiel ou sous-muqueux, plutôt mou que dur; 3° accompagné d'hémorragies; 4° pas de complications annexielles (Bouilly).

Dans les autres cas : opération chirurgicale ;

contre les hémorragies : Ergotine, hydrastis canadensis, injections très chaudes. Toniques. — Si pas de menace, attendre influence de l'âge critique : cures à Salies-de-Béarn, Salin, Kreuznach.

Fièvres.

Diète lactée, antithermiques, balnéation froide.

Fièvre intermittente : quinine à haute dose avant la crise (six heures environ), injection hypodermique de préférence.

Fièvre hectique tuberculeuse : repos. Employer la *cryogénine* (0 gr. 75 le premier jour, 0 gr. 30 les suivants). Traitement général.

Fièvres éruptives.

Repos à la chambre jusqu'à complète guérison.

Favoriser l'éruption (tisane diurétique, acétate d'ammoniaque en potion de 5 à 30 gr., ajouter eau de menthe).

Balnéation froide. Médication calmante. Analyser les urines et maintenir le régime lacté un temps suffisant pour juguler dès le début une néphrite.

Convalescence. — Levure de bière; éviter le refroidissement.

Fièvre typhoïde.

1° Antisepsie générale. Désinfection des selles par adjonction de sulfate de cuivre 50 p. 1000.

Purgatif tous les trois jours (15 gr. de sulfate de magnésie) ou :

Calomel à la vapeur.....	0 gr. 05
Sucré.....	0 gr. 25

Pour un paquet n° 10.

Un d'heure en heure.

2° Antisepsie intestinale :

Naphтол g.	0 gr. 25
Salicylate de bismuth.	0 gr. 10

Pour un paquet n° 20.

Un matin et soir si diarrhée abondante.

Laver la bouche fréquemment avec solution mentholée.

3° Médication tonique et antipyrétique (baignation froide et, si nécessaire, adjonction de quinine (seule employée si température inférieure à 39°).

4° Régime : lait, bouillon (avec vin rouge : Bordeaux), prises régulières. Ajouter tisanes diurétiques et rafraichissantes.

Ne pas oublier d'alimenter le malade pendant la nuit et surtout au lever du jour (mort subite fréquente par inanition).

5° Surveiller le cœur et le soutenir au besoin par : Café noir, caféine (0,25 à 1 gr. par jour), digitale (infusion ou macération).

Huile camphrée (Huchard), injection hypodermique de 1 gr. d'huile à 1 p. 100 pendant quatre à cinq jours.

Sérum artificiel de Chéron à petites doses (5 gr. par jour).

6° Baignation froide systématique suivant méthode de Brandt.

7° Expectation armée contre complications possibles.

Fissure à l'anus.

Dilatation forcée de l'anus sous le chloroforme (de préférence avec les pouces).

Palliatif : pommade à l'orthoforme ou cocaïnée-eucaïnée.

Fistule anale.

Souvent tuberculeuse (traitement général).
Injections caustiques. Opération.

Flatulence.

Electuaire de Picot ou traitement de la diarrhée; potion morphinée. Charbon.

Flueurs blanches.

Traitement de la cause (métrite), injections vaginales.

— des jeunes filles au moment de la formation. Surveiller l'état de l'estomac; administrer alternativement pendant trois mois :

1° Arséniate de soude 0 gr. 001 pour un granule, n° 30. Deux le matin pendant quinze jours.

2° :

Teinture d'iode. V gouttes

A prendre dans l'eau pendant les huit jours suivants, le matin.

3° :

Lécithine. 0 gr. 05

Pour une pilule. n° 30

Deux par jour pendant les quinze jours suivants (repandre la série).

Au besoin : huile de foie de morue ou sardines à l'huile. Peptonate de fer.

Lotions locales tièdes de décoction de racine de guimauve à 30 p. 1000, boriquée.

Fluxion dentaire.

Éviter le froid, cataplasmes laudanisés, potion calmante; ouverture de l'abcès s'il y a lieu ou avulsion de la dent.

Foie.

(Modificateurs du). *Cholagogues.* — Benzoate de soude, chlorate de potasse, essence de térébenthine, huile d'olive, salicylate de soude, terpène, urée.

Calmants. — Atropine, calomel, iodure de K.

Purgatif léger. — Rhubarbe.

Éviter l'arsenic (poison du foie).

Fomentations.

Pansements humides à base d'eau chaude, eau ammoniacale, espèces émollientes (Codex), vin, vinaigre, alcool, etc.

Folie menstruelle.

Révulsion de la partie inférieure du corps; purgatif, bromure, opium, morphine. On a vanté les effets sédatifs de la cocaïne appliquée en solution dans les fosses nasales, au moyen de coton hydrophile.

Folliculite.

Nettoyage du cuir chevelu, teinture d'iode.

Forges-les-Eaux (Seine-Inférieure).

(Note communiquée par M. le Dr Mathon, médecin consultant.)

112 kilomètres de Paris, 48 de Dieppe. Altitude, 160 mètres.

Saison : 1^{er} juin au 1^{er} octobre.

Établissement thermal : bains, douches, piscine, massage.

Traitement gratuit pour médecin, femme et enfants. Grande réduction dans les hôtels.

Sources : Reinette, Royale, Cardinale (Saint-Antoine, pas employée). Température constante + 7°.

Compositions chimiques. — Eaux acidulées athermales, ferrugineuses, toniques, reconstituantes, diurétiques.

Contenant un peu d'acide carbonique et par litre 0 gr. 22, 0 gr. 67-0 gr. 98 de protocératate de fer. Utilisées surtout en boisson et pour l'hydrothérapie.

Indications. — États morbides où l'élément ferrugineux du sang fait défaut, surtout chlorose, anémie, chloro-anémie, troubles de la menstruation, affections utérines chroniques, stérilité.

Gravelle, diabète, albuminurie.

Contre-indications. — Maladies aiguës, pléthore, tendance aux congestions, affections organiques du cœur et des gros vaisseaux, tuberculose pulmonaire avancée.

Formol.

Antiseptique puissant (aldéhyde formique), employé pour la désinfection des locaux (pulvérisations, vapeurs). Solution du commerce 40 p. 100 alcool. Solution aqueuse ; parties égales contre sueurs fétides des pieds.

Fougère mâle.

Rhizome employé comme anthelminthique, poudre 1 à 4 gr. Extrait éthéré en capsules de 0 gr. 50.

Franzensbad.

(Bohême). Eaux purgatives salines contenant 6 à 8 gr. de sulfate de soude et de magnésie par litre.

Laxatives à la dose de un à trois verres le matin à jeun.

Frictions.

Alcooliques, stimulantes, au baume du Pérou contre la gale, etc.

Friedrichskall.

(Saxe). Eaux purgatives salines contenant 7 gr. de sulfate de soude par litre.

Fumeterre.

(Fumariacée). Infusion 20 p. 1000, extrait 2 à 10 gr., employée comme tonique et dépuratif.

Fumigations.

Dégagement gazeux ou vapeurux avec :

1° *Pour désinfection.* — Formol, chlore, acide sulfureux, gaz ammoniac.

2° *Aromatiques.* — Benjoin, tolu, essences, eucalyptol.

Furonculose-Furoncle.

Examen des urines (diabète), s'il n'y a pas de sucre : levure de bière, régime rafraîchissant et très reconstituant (arsenic, fer, iode, etc.); léci-thine.

Contre le furoncle ; essayer dès le début de le faire avorter par la teinture d'iode.

Plus tard, pansement antiseptique, extraction du bourbillon s'il ne s'élimine pas par lui-même.

Dans l'arthritisme : iodure de potassium.

S'il y a du sucre, traiter le diabète.

G

Gaïac.

Stimulant (dysménorrhée, stérilité ; sudorifique). Résine 2 à 3 gr. (pilule).

Gaïacol.

Principe actif de la créosote, XV à XXX gouttes dans potion alcoolisée 0 gr. 05 en pilules (3 à 10 par jour).

Galactagogues.

Bière, somatose ; anis, galega, ortie.

Galactorrhée.

Bandage compressif des seins, purgatif, anti-pyrine (2 à 3 gr. par jour).

Gale.

A Paris, envoyer à l'hôpital Saint-Louis.

En clientèle : friction au savon noir pendant une demi-heure, bain tiède, étendre sur toutes les plaies du baume du Pérou. Le lendemain bain tiède. Étuver les vêtements.

Galega officinalis.

Galactagogue. Extrait 0 gr. 50 (de 1 à 4 gr.).

Gallanol.

Peu soluble, réducteur énergétique. Cazeneuve l'emploie contre le psoriasis et l'eczéma chronique car il n'offre aucun danger. Pommade 1/15. Les plaques de psoriasis étant découpées au savon noir. Poudre : gallanol et talc (parties égales).

Gallique.

(Acide). Astringent 0 gr. 30 à 1 gr. en pilules, potion. Indiquer contre la néphrite et l'hémorragie.

Gallobromol.

Très soluble dans l'eau ; chorée, épilepsie. Cachets de 0 gr. 50 (1 à 8 par jour).

Garavan (Alpes-Maritimes).

(Note communiquée par M. le D^r Petit, médecin consultant.)

Quartier de Menton situé entre la vieille ville et la frontière italienne. Composé, dans son ensemble, de villas et d'hôtels et habité exclusivement par la population hivernante, admirablement protégé contre les vents du nord et du nord-est par le massif du Berceau (1140 mètres) qui forme un promontoire très avancé entre Menton et Vintimille, abrité d'autre part contre les vents du Nord-Ouest par une colline élevée où s'étagent les maisons du Vieux-Menton et qui sépare la baie de Garavan des vallées du Carei et du Borigo. Cette situation fait de Garavan la région la plus chaude et la mieux abritée de Menton.

Le climat y est tempéré, la température ne tombant qu'exceptionnellement au-dessous de 10° centigr., et absolument exempt de brouillards. Ces qualités du climat de Garavan sont en