

de ces eaux aux repas ou eau bicarbonatée 10 gr. par jour. Surveiller l'acidité de l'urine. Eviter tomates, asperges, oseille, viandes noires. gibier, crustacés, vins forts. Régime lacto-végétarien et viandes blanches. Exercice, hydrothérapie. Si beaucoup de graviers, donner : acide benzoïque 2 gr., pilules ; benzoate de lithine 2 gr., pilules, potion. Pipérazine 2 gr. en solution.

Alcaline. — Essayer de : benzoate de soude 5 gr. en cachets, potion ; acide salicylique 3 gr. potion ; salol 2 gr. ; résorcine 2 gr. cachets ; térébenthine 3 gr. en capsules. Si de gros graviers faire la lithotritie.

Colique néphrétique. — Bain chaud ; injection de morphine ; lavement de chloral 2 gr. Faire boire au malade des tisanes diurétiques, queues de cerises, chiendent, etc., ou de l'eau de Pougues, de Vals pour hâter la progression du calcul.

Grenadier.

(Grenatées écorce), anthelminthique : prendre le matin à jeun après un purgatif ayant agi 60 gr. dans 500 gr. de lait réduit de moitié par ébullition, en trois fois.

Grippe.

(Influenza). — Déterminer la forme et agir symptomatiquement suivant prédominance (gastro-intestinale, nerveuse, adynamique, bronchopulmonaire).

En tous cas : repos absolu à la chambre, quinine, tisanes diurétiques.

Guaco.

Plante du Brésil : contre prurigos de toutes formes (Butte), très efficace ; 0 gr. 20 à 0 gr. 60 d'extrait en pilule ou sirop.

En lotion :

Guaco concassé.....	30 gr.
Bicarbonate de soude.....	5 —
Eau distillée.....	1000 —

Faire bouillir, décanter.

C'est, en somme, la *nisaméline* de Trouette-Perret.

Guimauve.

(Malvacées). — Emollient en décoction de racine à 30 p. 1000, fleurs 25 p. 1000.

H

Hallucinations.

Calmants, bromure, isolement dans une chambre bleue, suppression de tous les excitants.

Hamamelis virginica.

(Noisetier de la sorcière). — Hamamelidée, peu toxique, varices, hémorroïdes, hémorragies. — Extrait fluide, XXX gouttes par jour dans un peu d'eau.

Haschisch.

(Chanvre indien). — Hypnotique, antispasmodique. Teinture V à XXX gouttes. Extrait alcoolique 0 gr. 03 à 0 gr. 10.

Hématémèse.

Régime lacté, boissons glacées, repos, au lit, perchlorure de fer (X à XX gouttes). Ergotine en injections hypodermiques (soluble dans eau de laurier-cerise au 1/5^e), solution d'antipyrine (jusqu'à 3 gr. par jour), solution gélatinée à l'antipyrine : gélatine 5 gr., chlorure de calcium 1 gr., antipyrine 2 gr., eau 100 gr., par cuillerées à bouche toutes les demi-heures. (Dr Lucas)

Sérum artificiel. — Si ulcère de l'estomac, suture (intervention chirurgicale; Maurice Cazin).

Hématiques.

(Ferrugineux.)

Hématocèle.

Utérine, si importante laparotomie, sinon, repos, glace, opiacés, lavements émollients; révulsion à l'hypogastre; ergotine. Plus tard, repos au moment des règles, massage utérin.

Hématomes.

Compression, évacuation.

Hématurie.

Maladies infectieuses. (Scarlatine, etc.). — Traitement de cette infection. Bains froids, potion hémostatique. — *Tuberculose rénale, kystes, cancer du rein, lithiase.* — Soigner la cause en pensant surtout à la lithiase (potion hémostatique, et balsamiques; térébenthine en capsules). *Hématurie des pays chauds.* — Le séjour en pays tempéré suffit souvent à la faire cesser. Balsamiques à l'intérieur, injections de sérum de Hayem pour parer à la déperdition.

Hémiplégie.

Toujours penser à la syphilis et, dans le cas où on soupçonne cette affection, donner le mercure en injections (calomel) ou en frictions, l'iode de potassium à haute dose (6 gr.). Si la goutte ou l'artériosclérose, soigner ces maladies. Traiter l'hémiplégie par les courants continus. Séance quotidienne de quinze minutes; 15 milliampères courant centripète. Bains salés deux fois par semaine. Bains de mer, cure à Balaruc, à Lamalou, pendant la saison.

Hémoglobine.

Reconstituant contre l'anémie. Préparations de

Deschiens : sirop 2 à 4 cuillerées, vin à 6 p. 100, 2 verres à madère. Dragées de 0 gr. 25 (quatre par jour).

Hémoglobinurie.

A frigore. Couvrir chaudement le malade, boissons très chaudes; éviter le froid, porter une ceinture de flanelle. — *Secondaire.* Soigner la maladie causale; syphilis : mercure en frictions (onguent napolitain 7 gr.); impaludisme (injections hypodermiques de chlorhydrate de quinine 0 gr. 30); rhumatisme (salicylate de soude 5 gr.). — *Dengue.* Acide phénique; iode; chlorate de potasse. Injections de sérum de Hayem 250 gr., repos au lit.

Hémol.

(Zincoparahémoglobine). Poudre brune, contenant un peu de zinc, sans saveur. Contre chlorose, ulcérations intestinales avec tendance à l'hémorragie, *fort bien toléré*, 0 gr. 10 à 0 gr. 50, 3 fois par jour en pilules.

Hémophilie.

Arsenic, fer, quinquina, huile de foie de morue.
Sérum artificiel Chéron. Éviter les traumatismes.

Hémoptysie.

(D'après le Dr Deguy). — Repos au lit, silence, climat tempéré; plus tard, exercice modéré.
Éviter les boissons fermentées ou gazeuses; prendre de la bière; peu de viandes rouges; éviter mets épicés et salaisons.
Prendre surtout : lait, œufs, volailles, ris de veau, viandes froides, fruits mûrs. Faciliter la coagulation du sang par :

Chlorure de calcium.....	} ãã 0 gr. 50
Sucre de lait.....	

Pour un paquet; quatre par jour.

(Dans le même but, administrer le chlorhydro-phosphate de chaux, reconstituant le plus recommandable à tous égards.)

Aider au besoin l'hémostase par :

Extrait aqueux d'ergot de seigle.....	0 gr. 10
Sulfate de quinine.....	0 gr. 10
Extrait de jusquiame.....	0 gr. 01
Poudre de digitale.....	0 gr. 01

Pour une pilule.

N° 20, cinq à dix par jour (Huchard).

Ne pas employer : ferrugineux, créosote, gaillet, caféine, sérum.

Médication adjuvante :

Z Arseniate de soude.....	0 gr. 10
Hyposulfite de soude.....	25 gr.
Phosphate de soude.....	15 —
Eau distillée de menthe.....	500 —

2 fois par jour, 1 heure avant les repas, une cuillerée à potage dans un peu d'eau sucrée pendant 16 jours (Arthuis). Repos de 10 jours pendant lequel on administrera 3 pilules cupro-hœmol de 0 gr. 10 dans la journée.

Hémorragies.

Gros vaisseaux et artères, forcipressure et ligature.

Autres cas : hémostatiques, antipyrine, perchlorure de fer, ergotine, adrénaline etc.

Plus tard, régime reconstituant.

N. B. — Au cas de perte de sang considérable, adjoindre à l'hémostase : sérum artificiel, boissons abondantes, repos.

Hémorroïdes.

Il faut éviter la constipation par des lavements (glycérinés, huilés); des suppositoires, des laxatifs, thé purgatif; cascara 0 gr. 25 en cachet, pilule; rhubarbe, 0 gr. 50 en cachets, comprimés; podophylle 0 gr. 02 en pilule. Donner à l'intérieur : hamamelis virginica, teinture de feuilles XX gouttes par jour; capsicum, teinture XX gouttes, extrait 0 gr. 50 en pilules. S'il y a inflammation : repos au lit, grands bains chauds, compresses très chaudes. Suppositoires avec : belladone extrait 0 gr. 03; opium, 0 gr. 03; cocaïne 0 gr. 02 (on peut les associer); s'il y a hémorragies : fragments de glace dans l'anus, tamponner avec de la gaze iodofornée et poudre d'antipyrine ou tampon trempé dans antipyrine 1 p. 10; toucher au thermo-cautère (rouge sombre) les points saignants. Si elles sont rebelles, la chirurgie intervient avec la dilatation forcée et l'excision, la cure radicale, le thermo-cautère.

N. B. — Nous nous sommes tenus pour très satisfaits de l'emploi *loco dolenti* de compresses de tarlatane contenant de l'arum ou goëtel haché finement.

Hémostatiques.

Mécaniques : compression, forcipressure, ligature.

Par vaso-constriction et rénovation de l'élément sanguin : sérum artificiel.

Médicamenteux : antipyrine, perchlorure de fer, eau oxygénée, adrénaline à 1 p. 1000.

Action sur les muscles lisses : ergot de seigle, etc.

Hépatite.

Régime lacté, calomel (0 gr. 01 à 0 gr. 02 par jour), révulsion. Si supprimée : chirurgie après ponction exploratrice.

Hernie.

Essayer la réduction par le taxis et maintenir par bandage.

Étranglée. — Tenter l'action de l'éther versée goutte à goutte sur une compresse peu épaisse pendant deux à trois heures si le danger n'est pas trop menaçant; ne pas oublier qu'il faut opérer de bonne heure. Si échec: intervention chirurgicale.

Herpès.

Lotionner les ulcérations avec de l'eau boricuée chaude 40 p. 1000 et panser avec la pommade au calomel 1 p. 30; à l'oxyde de zinc (Codex); si les ulcérations sont profondes, laver avec: sublimé 1 p. 1000; la résorcine 2 p. 150; tanin 3 p. 100; panser avec poudres: salol, calomel, dermatol, acétol; de temps en temps passer un pinceau avec: nitrate d'argent 1 p. 30; teinture d'iode. Si les douleurs sont fortes, appliquer la pommade avec dedans: cocaïne 0 gr. 01; menthol 0 gr. 05.

Héroïne.

Très soluble dans l'alcool, succédané de la morphine s'emploie à demi-dose (1/2 cent.) potion ou dans cachets sucre (catarrhe, phthisie, asthme).

Homatropine.

(Bromhydrate d'). Antidote de la pilocarpine, on l'emploie aussi dans certaines formes d'insomnie. Action physiologique analogue à celle de l'atropine, mais moindre et plus passagère. Dose: 0 gr. 005 à 0 gr. 01 par 24 heures.

Hoquet.

Sucer lentement un morceau de glace. Faradisation du phrénique ou du pneumogastrique. Tractions rythmées de la langue prolongées.

Révulsion au creux épigastrique; opiacés, eau chloroformée.

Houblon.

Infusions diurétiques 20 p. 1000 (galactagogues).

Huile.

— Amandes douces 20 à 40 gr., purgatif doux.
— Camphrée à 10 p. 100 en injections hypodermiques (tuberculose, fièvre typhoïde; Hu-chard).

En frictions.

— Croton purgative, I à III gouttes dans pilule de mie de pain.

— Foie de morue: lymphatisme, rachis, scrofulose, tuberculose, 20 à 100 gr.

— Foie créosotée à 15 p. 1000, par cuillerée à potage contenant 0 gr. 20.

— Foie iodée à 0,10 p. 100, par cuillerées à potage (2 à 3 par jour).

— Foie phosphorée à 0 gr. 005 p. 30 gr. (dangereuse).

— Grise. Traitement de la syphilis, une injection chaque jour (seringue spéciale).

— Iodoformée à 2,50 p. 500, antiseptique organique, 1 à 3 cuillerées à bouche.

— Olive, purgatif léger 30 gr. (coliques hépatiques 50 à 200 gr.).

— Phéniquée à 20 p. 100 (Codex), 1 cuillerée à café.

— Ricin 30 à 40 gr., purgative.

Hunyadi-Janos.

(Hongrie) contenant 30 gr. p. 1000 sulfate de magnésie purgative (1 grand verre).

Hydathrose.

Immobilisation, révulsion, teinture d'iode. Compression. Massage.

Si gros épanchement : ponction. — Cas graves arthrotomie. Bains sulfureux.

Hydrargyrisme.

Chlorate de potasse, iodure de potassium, régime lacté.

Attouchement des ulcérations par solution acide chromique au 1/10°. Bains sulfureux.

Hydrastis canadensis.

Ménorrhagies, congestion du col utérin, métrites fongueuses. Teinture :

Extrait fluide, LX à LXXX gouttes par jour contre les hémorragies.

Hydrastine : 0 gr. 05 en pilules, quatre par jour.

Hydrastinine en solution au 1/10°, 1/2 seringue de Pravaz.

Hydrocèle.

Traitement du D^r Monod, père : Quand la tunique vaginale est pleine de liquide, le pouvoir absorbant de l'endothélium vaginal est anéanti. Si on ajoute au liquide de l'épanchement un autre liquide changeant la densité du premier, on réveille le pouvoir absorbant de l'endothélium et l'hydrocèle disparaît. Manuel opératoire.

1° Maintenir pendant cinq minutes de la glace sur la région à ponctionner. 2° Ponctionner avec une aiguille capillaire et évacuer à la seringue hypodermique la moitié de l'épanchement. 3° Injecter dans le liquide restant de 3 à 5 gr. d'alcool à 90°.

En quelques jours l'hydrocèle disparaît.

On a proposé la cure radicale qui ne serait tentée qu'après essai de la méthode ci-dessus.

Hydrocéphalie.

Frictions mercurielles, iodure de potassium (V. *Syphilis*).

Hydrolat.

Résultat de la distillation avec l'eau.

Hydropéricarde.

Traitement général, diurétiques, diaphorétiques. Si grave, paracentèse du péricarde (Pettit).

Hydropisie.

Traitement de la cause; régime lacté, diurétiques, ponctions.

Hydroquinone.

Antiseptique, analgésique, antithermique, 0 gr. 30 à 0 gr. 50 par jour.

Hydrothérapie.

« Médication par l'eau employée sous toutes les formes et à des températures variables. » (Beni-Barde.)

Rien à dire de particulier sur :

Gargarismes, injections, lavements, pédiluve, manulve, bain de siège.

L'hydrothérapie froide produit : diminution de la température (fièvre), contractions des fibres lisses, anesthésie.

L'hydrothérapie tiède : sédation, calme du système nerveux.

L'hydrothérapie chaude produit :

La sédation, une réaction favorable dans les inflammations.

Hydrothorax.

Même traitement que celui de l'hydropéricarde, ponction aspiratrice.

Hyères (Var).

(Note communiquée par M. le D^r Roux-Seignoret).

La plus ancienne et la plus méridionale des

stations hivernales. Hyères est située à l'extrême pointe sud de la Côte d'Azur. La température moyenne de la journée médicale, pendant les mois d'hiver, est de 14°,5 environ.

Grâce à sa situation dans l'intérieur des terres, à 4 kilomètres de la mer, Hyères jouit d'un climat semi-maritime, d'un air sec et sédatif, qui convient particulièrement aux tuberculeux de toutes catégories, aux asthmatiques, arthritiques, neurasthéniques, etc. Un de ses quartiers, si justement nommé Castebelle, plus rapproché de la mer et dont le climat est plus tonique, convient principalement à tous les malades dont l'organisme est débilité. C'est dans ce quartier que s'élève le sanatorium philanthropique modèle du Mont des Oiseaux.

Hyères possède aussi une installation d'hydrothérapie complète, un casino et des lieux agréables de réunion.

Saison du 15 octobre au 15 mai.

Hyscine.

(Scopolamine). Alcaloïde qui n'est pas officiellement reconnu. Action sédatrice, employé avec succès dans l'excitation cérébrale, l'épilepsie
Dose : 1/4 à 1/2 milligr.

Hyosciamine.

Alcaloïde de la jusquiame; dilatateur de la pupille. Analogue à la belladone et à l'atropine. Chorée, vomissements incoercibles de la grossesse, paralysie agitante : 1/2 à 1 milligr., en granule.

Collyre 0 gr. 03 p. 20 d'eau.

Hygroma.

Aigu. — Immobilisation, compression, s'il y a du pus, incision, lavage de la poche. Raclage ou extirpation. — *Chronique.* — Inciser les tissus, enlever à la curette tranchante, les parois de la

poche, rapprocher et suturer. — Les autres moyens échouent généralement.

Hyperchlorhydrie.

Alcalins.

Hyperhidrose.

Plantaire. — Tous les dix jours, tremper les pieds dans formol étendu d'eau, formol 1, eau ou saupoudrer les pieds avec :

Tanin.....	3 gr.	} ou badigeonnage avec acide chromique 3 p. 100.
Permanganate de potasse.....	1 —	
Sous-nitrate de bismuth.....	10 —	
Talc.....	20 —	

Hypertrichose.

Épilation avec rusma ottoman :

Chaux vive.....	15 gr.
Orpiment.....	2 gr. 50
Amidon.....	2 gr. 50

Faire une pâte dans l'eau chaude.
Electrisation.

Hypnal.

En cachet, 1 à 2 gr. par jour, ou en potion contre l'insomnie nerveuse.

Hypnone.

En capsules de 0 gr. 10 dans l'huile contre insomnie (insoluble dans l'eau).

Hypnotiques.

Chloral, hypnone, hypnal, sulfonal, trional, opiacés.

— *Anesthésiques* : chloréthyle, chloroforme, éther.

Hypnopyrine.

Succédané absolument inoffensif de l'antipyrine : analgésique, antipyrétique et hypnotique de 0 gr. 25 à 0 gr. 50 en cachet quatre fois par jour.

Hyposulfite de soude.

$\text{Na}_2\text{S}\cdot\text{O} + 5\text{H}_2\text{O}$. — Désinfectant antiputride à saturation pour carie dentaire 4^e degré, collutoires, gargarismes, lotions (20 à 50 p. 1000).

Bronchite fétide, fièvres infectieuses : 5 à 10 gr. en potion ; 30 gr. purgatif.

Hypotension artérielle.

Sérum artificiel, caféine.

Hysope.

(Labiée), stimulant, expectorant ; infusion 10 p. 100.

Hystérie.

Prophylaxie : favoriser chez l'enfant le développement physique aux dépens du développement intellectuel. Pas de surmenage. Si elle est constituée, isoler le malade de son milieu si possible. L'hypnotisme peut être essayé avec prudence, surtout contre un symptôme isolé : paralysie, contracture ; la suggestion à l'état de veille est employée journellement par le médecin du nerveux. Hydrothérapie : douches en jet, froides, fraîches, écossaise. Si on ne peut pas avoir de douche, lotion quotidienne au tub. Le massage général une demi-heure par jour est employé par Weir Mitchell, massage spécial suivant les localisations de l'hystérie.

Le bain d'électricité statique est très conseillé par Charcot d'un quart heure chaque jour. Les médicaments ne servent à rien ou sont nuisibles. On emploie le bromure 4 gr. ; la valériane ou les valérianates ; la teinture d'opium X à XV gouttes.

La guérison sera surtout obtenue par l'influence personnelle du médecin et son pouvoir suggestif, c'est pour cela qu'il y a avantage à traiter ces malades dans des maisons d'hydrothérapie ou isolement, hydrothérapie, électrothérapie, massages sont combinés.

I

Ichtyol.

Antiseptique employé contre eczéma, démangeaisons : insoluble dans l'eau 15 à 20 p. 100 en pommade, enfants 10 p. 100.

Ovules et suppositoires.

Ictère.

Bénin, catarrhal. — Vomitifs et purgatifs si inflammation gastrique ; si spontané : diète, repos, boissons acidulées, laxatif.

Si diarrhée, pas de purgatifs. Poudre de Dover 0 gr. 50 par jour jusqu'à cessation. Si constipation persistante, rhubarbe additionnée de bicarbonate de soude.

Convalescence : contre l'anorexie quinquina. — *Calculoux.* — On a préconisé les injections rectales d'eau à 15° : de 1 à 2 litres. Sept ou huit injections produisent la détente par déplacement du calcul.

— *Grave.* — Diète lactée, boissons diurétiques, grands lavements. Antipyrétiques, bains froids, chloral (2 à 6 gr.) si adynamie : caféine, éther. Sérum artificiel.

— *Récidivant :* Vichy, Châtel-Guyon, Vittel, Kissingen, Carlsbad ; éviter les corps gras. Prendre chaque jour de la rhubarbe (en cachets, poudre 0 gr. 25 à 0 gr. 30).

Impétigo.

Faire tomber les croûtes avec des cata-