

trompe est bouchée, la sonder et la dilater progressivement puis insuffler. Enfin paracentèse du tympan s'il y a du pus, avec insufflations d'air et lavages antiseptiques du conduit. Soigner l'arrière-gorge s'il y a lieu (souvent).

#### Ovarite.

Repos, glace, frictions légères avec le liniment calmant de Chéron.

Opiacés ou morphine en cas de douleurs trop vives.

#### Oxyde blanc d'antimoine.

Expectorant moins énergique que le kermès : 1 à 6 gr. en looch.

#### Oxyde de fer.

(Sesqui). Contre-poison de l'arsenic : doses énormes, en poudre, pour le pansement des ulcères.

#### Oxyde de zinc.

Antispasmodique 1 à 2 gr. à l'intérieur. Modificateur des tissus en pommade au 1/10, astringent et siccatif.

#### Oxygène.

En inhalations : les simples inhalateurs en caoutchouc semblent bien insuffisants : pourquoi ne pas recourir aux tubes métalliques en renfermant d'énormes quantités sous pression.

Le Dr Guglielminetti a proposé à cet effet un *détendeur*.

#### Oxygénée.

(Eau). Antiseptique puissant à 12 volumes (Codex), hémostatique ; décolorant des cheveux ; pansement humide.

#### Oxymel simple.

(Codex). Rafraîchissant. Dose : 60 gr. pour édulcorer un litre de tisane.

#### Oxymel scyllitique.

De 10 à 15 gr. en potion ; diurétique.

#### Oxyures.

Eau salée, lavement à 10 p. 100. *Santonine* :

Doses. . . . . { Adultes, 0 gr. 05 à 0 gr. 30.  
                  { Enfants, 0 gr. 01 à 0 gr. 05.

#### Ozène.

Iodure de potassium ; cautérisations profondes, injections sulfureuses.

#### Ozone.

En inhalations.

### P

#### Palpitations.

Cardiaques. Lutter contre la constipation, kola. Proscrire le tabac.

Dans l'*artériosclérose*, iodures, trinitrine (en solution alcoolique à 1 p. 100, II à X gouttes par jour).

Plus tard, au moment des troubles, digitale (teinture XX à XXX gouttes pendant trois à quatre jours).

#### Paludisme.

Prescrire la quinine avec des périodes d'inter-ruption, reconstituants, hydrothérapie, hygiène.

#### Panama.

(Ecorces de bois de *Quilliaia saponaria*). -- En teinture alcoolique à 90° au 1/5°. En frictions pour les soins de la chevelure, étendue aux 3/4 d'eau.

#### Panaris.

Cataplasmes, incision, pansements antiseptiques.

Pancréatine.

Digestif. Doses : poudre 0 gr. 50 à 1 gr. en cachets.

Papier épispastique.

Se prépare avec l'extrait éthéré alcoolique de garou. En pansement sur les plaies de vésicatoires dont on veut entretenir la suppuration (Codex).

Papier Rigollot.

Sinapisme en feuille. Révulsif.

Paquets.

Poudres solubles ou insolubles.  
(Benzoate de chaux 0 gr. 25, deux par jour, benzoate de lithine 0 gr. 15, calomel 0 gr. 30.)

Paralysies.

(Périphériques). Révulsion sur le trajet du nerf de la région avec : pointes de feu, sinapismes, pulvérisations de chlorure d'éthyle, teinture d'iode. Massage méthodique et long-temps continué de toute la région; mécanothérapie, gymnastique rationnelle; douches sulfureuses ou simples de la région tous les jours, suivies de frictions. Aider en administrant la noix vomique en pilules 0 gr. 10 ou la strychnine en injections hypodermiques 0 gr. 005 à 0 gr. 010 par jour. Surtout traiter par l'électricité : galvanique 10 à 20 milliampères, une séance de dix minutes tous les jours; ou faradique avec bobine à gros fil et peu d'intensité. Surveiller l'application pour éviter la contracture.

Paraphimosis.

Enduire le gland de vaseline; prenant de la main gauche le fourreau de la verge, exercer une compression progressive pendant quelques minutes, puis, avec le pouce droit chercher à

repousser le gland. Si on ne peut y parvenir, débrider l'anneau constricteur. Appliquer ensuite une bande de caoutchouc large, compressive. Bains locaux émollients. Plus tard, circoncision.

Parasitiques.

*Externes.* — *Maquet* : alcalins. *Trichophytie* (teigne), iode, soufre. *Poux* : eau de Van Swieten. *Gale* : frictions au savon noir, bain sulfureux, étuvation des vêtements.

*Internes.* — *Tenifuges*, après purgatif ayant produit son effet : koussou, fleurs, infusion, 15 à 20 gr.

Fougère mâle, capsules de 0 gr. 50 n° 8, en deux heures.

*Vermifuges* (ascarides), santonine, adultes 0 gr. 05 à 0 gr. 30; enfants 0 gr. 01 à 0 gr. 05, semen-contra, fleurs 1 à 10 gr.

Parfumerie. — Produits non toxiques.Brillantine.

Glycérine.....	100 gr.
Paraffine.....	3 —
Essence (ad libitum).....	1 —
	(Roret.)

Cire à moustache hongroise :

Gomme arabique.....	50 gr.
Savon.....	50 —
Cire.....	50 —
Eau de rose.....	50 —
Essence de bergamote.....	2 —
Santal.....	1 —
	(Roret.)

Cold-cream à la rose :

Huile d'amande.....	100 gr.
Eau de rose.....	100 —
Cire blanche.....	6 —
Blanc de baleine.....	6 —
Essence de roses.....	0 gr. 25

Gant cosmétique :

Cire vierge.....	15 gr.
Blanc de baleine.....	15 —
Savon blanc.....	15 —
Vaseline pure.....	28 —

Émincer chacune de ces substances, faire fondre au bain-marie et ajouter :

Huile d'olive.....	46 gr.
Pommade rosat.....	46 —
Benjoin.....	4 —
Baume du Pérou.....	4 —
Essence (ad libitum).....	L gouttes.
Eau de miel.....	15 gr.

Bien mélanger à la chaleur douce, puis enduire fortement des gants (à l'envers) avec un pinceau. Laisser sécher (Roret).

Lait de Pistache pour le teint :

Pistaches d'Espagne.....	100 gr.
Infusion de violettes.....	1 litre
Essence de Nérolé.....	37 centil.
Savon de palme.....	25 gr.
Huile d'olive verte.....	25 —
Cire et spermacéti.....	25 —
	(Roret.)

Pommade de Ninon de Lençols. (Boyer.)

Huile d'amandes douces.....	125 gr.
Axonge lavée.....	90 —
Suc de joubarbe.....	90 —
	(Adoucissante.)

Passy.

Eaux ferrugineuses froides contenant de 0 gr. 04 à 0 gr. 50 de sulfate de fer par litre.

Pastilles.

Médicaments véhiculés dans du sucre.  
(Bicarbonat de soude 0 gr. 25, calomel 0 gr. 05,

chlorate de potasse 0 gr. 10, kermès 0 gr. 01 : santonine 0 gr. 01 (2 à 10 par jour). Soufre 0 gr. 10 (Codex).

Pâtes.

Médicaments dont la consistance est assez ferme pour qu'il n'y ait pas adhérence au toucher (guimauve, lichen, jujubes, réglisse).

Pâte de Canquoin.

Mélange de chlorure de zinc, de farine et d'eau caustique.

Pau (Basses-Pyrénées).

(Note communiquée par M. le Dr L. Goudard, médecin consultant.)

Station hivernale dont le climat est caractérisé par la douceur de la température et le calme de l'atmosphère. L'absence de vent et de brouillard, l'état hygrométrique moyen, la température (de 8° à 9° centigrades en hiver), le peu d'écart des variations thermales donnent à ce climat ses qualités *essentiellement sédatives*.

Convient avant tout *aux nerveux*, aux excita-  
bles, aux neurasthéniques, aux surmenés et  
aux *tuberculeux* éréthiques, fébricitants, hémop-  
toïques, à pèbre fragile. Les autres indica-  
tions sont : les bronchites aiguës et chroniques,  
les reliquats de pleurésie ou de pneumonie,  
l'asthme nerveux, les dyspepsies avec gastralgie,  
les affections catarrhales de l'intestin, l'angine  
de poitrine, l'enfance, la vieillesse, les convales-  
cences.

Le climat est contre-indiqué chez les déprimés,  
les rhumatisants, les tuberculeux torpides, les  
enfants mous et les vieillards à réactions insuf-  
fisantes.

L'hygiène de la station est très bien comprise  
et très sévèrement surveillée : bureau muni-

cipal d'hygiène, laboratoire de bactériologie, hôpital d'isolement, désinfections à l'étuve, au sublimé, au formol, eau de bonne qualité, égouts.

### Pavot.

(Papaver somniferum album). Principe actif : opium. En décoction, les têtes à 20 p. 1000 (injections, lavements).

### Peau.

(Modificateurs de la), généralement employés pour l'usage externe.

*Absorbants.* — Charbon, coton hydrophile, quinquina en poudre.

*Adhésifs.* — Collodion, diachylon, emplâtre.

*Antiparasitaires.* — Onguent mercuriel, baume du Pérou.

*Antiseptiques.* — Eau de Van Swieten, solutions phéniquées, boriquées, odoforme et succédanés, etc.

*Astringents.* — Alun, dermatol, sulfate de zinc, tanin.

*Cautiques.* — Chlorure de zinc, nitrate d'argent, potasse caustique, teinture d'iode, thermocautère, acide chromique. Bichromate de potasse.

*Émoullients.* — Guimauve (décoction de racine), amidon, fécule, son.

*Réducteurs.* — Acides picrique, salicylique, bicarbonate de soude, goudron, ichtyol, oxyde de zinc, acide pyrogallique (5 à 10 p. 100). Résorcine, eaux sulfureuses.

*Révulsifs.* — Marteau de Mayor, ammoniac, moutarde, vésicatoires, ventouses; chlorure d'éthyle.

*Sudorifique.* — Jaborandi et pilocarpine, tisanes (espèces sudorifiques 50 p. 1000).

*Antisudorifiques.* — Belladone et atropine, absorbants (bismuth).

### Pediculi pubis.

Étuver les vêtements, onctions avec onguent mercuriel. Liqueur de Van Swieten.

### Pelade.

Raser les cheveux et épiler. Frictions le matin avec :

Teinture de cantharide.....	} <i>aa</i> 10 gr.
Chloroforme.....	
Teinture de Baumé.....	
Alcool de Fioravanti.....	
	(Besnier.)

Le soir, onctions avec la pommade suivante :

Résorcine.....	} <i>aa</i> 10 gr.
Acide salicylique.....	
Soufre précipité.....	10 —
Vaseline.....	100 —
	(Besnier.)

La pelade n'est pas contagieuse (Jacquet).

### Pelletiérine.

Principe actif de l'écorce de grenadier, ténifuge pour adulte, 0 gr. 50 à 1 gr. 50.

### Pellicules.

(Du cuir chevelu), souvent liées à l'arthritisme. Frictions alcoolisées. En cas de chute des cheveux :

1° 3 fois par semaine, le soir, friction à la brosse piquante imbibée de la préparation :

Alcool camphré.....	100 gr.
Acide pyrogallique.....	} <i>aa</i> 10 —
Soufre précipité.....	

2° Le lendemain lavage à l'infusion de bois de panama (10 p. 100). — Séchage.

3° Chaque matin friction à la brosse imbibée du liniment :

Alcoolat de genièvre.....	} aa 50 gr.
— romarin.....	
Eau-de-vie de lavande ambrée....	} 2 —
Formol du com. à 40°.....	
Acide acétique glacial.....	1 —
Éther sulfurique.....	10 —

(D<sup>r</sup> Jacquet.)

**Pelvi-péritonite.**

Applications de glace sur le ventre dans une vessie de caoutchouc et en isolant par une couche de flanelle. — Opium ou morphine, boissons glacées. Lavements, purgatifs légers. Repos au lit.

**Pemphigus.**

(Aigu et chronique). Médication arsenicale (La Bourboule, Royat, Uriage), pommades antiseptiques : compresses imbibées d'une solution d'acide picrique à 1,40 p. 100.

**Pepsine.**

A la dose de 0 gr. 50 à 1 gr. ; on l'extrait du quatrième estomac des ruminants (muqueuse).

**Peptonates.**

- *De fer*, préparé avec le perchlorure de fer agissant sur la peptone, 0 gr. 50 à 2 gr. par jour.
- *De mercure*, en injections hypodermiques ou pilules.

**Peptones.**

Obtenues par macération de viandes pendant douze heures à 45°. 1 cuillerée à soupe de peptone sèche à chaque repas.

**Perchlorure de fer.**

A l'intérieur, en solution X à XL gouttes, usage externe : hémostatique, caustique.

**Péricardite.**

Application d'un sachet de glace en perma-

nence sur la région ; révulsion avec : pointes de feu, chlorure d'éthyle, sinapisme. Si l'angoisse est forte : morphine en injections hypodermiques. Si le pouls est mou ou intermittent, donner la digitale, 0 gr. 40 en infusion ou la sparteine, 0 gr. 10 en injections hypodermiques, ou l'éther en injections (4), ou l'huile camphrée 4 seringues. S'il y a des vomissements, sucer de la glace et prendre de la potion de Rivière ; alimentation lactée avec de l'eau de chaux. Dans le cas d'épanchement, donner diurétiques : tisane de queue de cerise, la scille, 0 gr. 60 ; le vin de la Charité, 2 cuillerées par jour ; l'azotate de potasse, 2 gr. dans tisane ; ou des purgatifs : calomel, 0 gr. 50 ; eau-de-vie allemande, 20 gr. Si la paracentèse s'impose, la pratiquer avec un trocart prudemment dans le cinquième espace intercostal, à 5 centimètres du bord gauche du sternum.

**Périostites.**

Cataplasmes, incision hâtive, opiacés.

**Péritonite.**

*Aiguë simple.* — Boissons glacées, glace sur le ventre. Pas de purgatifs : opium, bains tièdes, appliquer sur le ventre du collodion.

Contre le hoquet, potion cocaïnée au 1/600<sup>e</sup> par cuillerées à bouche toutes les deux heures.

Lavements émoullents. Alimentation lactée et glacée en petite quantité.

Laparotomie si le pouls est mou, la température très élevée, l'état général mauvais.

*Chronique.* — Teinture d'iode, collodion, médication arsenicale ; injections de naphthol camphré (3 à 4 gr.)

**Perles.**

Liquides caustiques (éther) enfermés dans du gluten ; médicament sphérique.

**Permanganate de potasse**

Antiseptique en solution à 2 p. 100 pour le lavage des mains (décoloré par une solution de bisulfite de soude). En injections à 0 gr. 50 p. 1000 contre la blennorragie (lavages).

**Péronine.**

( $C^{17}H^{12}AzO^2OC^6H^5CH^2HCl$ ). Hypnotique ne provoquant pas d'excitation, de 0 gr. 02 à 0 gr. 04 en pilules. Calme les douleurs névralgiques et rhumatismales.

**Persodine.**

Solution au 1 p. 75 de persulfate de soude. Prendre une cuillerée à bouche une heure avant le repas du milieu de la journée. Puissant stimulant de l'appétit.

**Pertes séminales.**

Fonssagrives préconise les pilules :

Camphre.....	0 gr. 40
Seigle ergoté.....	0 gr. 40

Pour une pilule, une matin et soir.

Si elles sont dues à une sensibilité exagérée, donner le bromure de potassium, 3 gr. par jour en potion ; dans le cas de parésie, administrer le sulfate de strychnine 0 gr. 005 en pilules ou en injections hypodermiques. Traitement reconstituant.

**Petit lait.**

Alimentaire, laxatif, diurétique. Cure de huit semaines, jusqu'à 1200 gr. par jour.

**Pétrole.**

Ascaricide ; préconisé par Desprès dans le traitement de l'épithélioma de la face, contre la gale en frictions générales quatre soirs de suite,

sans essuyer. En capsules 2 gr. par jour, anti-catarrhal.

**Pharyngite.**

*Aiguë.* — Gargarismes antiseptiques quatre fois par jour : Chlorate de potasse 6 p. 250 ; alun 5 p. 250 ; acide borique 10 p. 250, chauds ; grands lavages de l'arrière-gorge matin et soir avec : acide salicylique 1 p. 1000 ; acide phénique 5 p. 1000. Badigeonnages au pinceau avec : borate de soude 4 p. 30 ; glycérine cocaïnée 1 p. 30. Alimentation liquide et chaude ; liberté du ventre ; antiseptie intestinale.

*Chronique.* — Enlever les amygdales s'il y a lieu ou les végétations adénoïdes. Toucher les granulations au galvanocautère. Badigeonnages tous les trois jours avec solution iodo-iodurée au 1/15<sup>e</sup>.

**Pharynx.**

(Modificateurs du). Antiseptiques. Astringents. Caustiques. Émoullients.

**Phénacétine.**

Anurique, antifièvre, analgésique, insoluble dans l'eau ; 0 gr. 50 à 2 gr. en cachets.

**Phénique.**

(Acide),  $C^6H^6O$ . Antiseptique. En solution de 5 à 20 p. 1000, faible 25 p. 1000, forte 50 p. 1000 (Codex). Enfants après 3 ans, 0 gr. 10 par jour et année d'âge.

**Phénol sulfuriciné.**

Topique (diphthérie). Ne pas l'employer en cas de sérothérapie.

**Phénosalyl.**

Antiseptique en solution de 0 gr. 50 à 1 gr. p. 100 (menthol et essence d'eucalyptus mélangés à acides : phénique, salicylique et lactique).

Phimosis.

Destruction des adhérences préputiales. Dilatation du prépuce, circoncision.

Phlébite.

Immobilisation absolue dans la position horizontale; compresses d'eau blanche; antithermiques; opiacés; diurétiques. Hamamélis ou ergotine. Si suppuration, ouverture du foyer.

Plus tard, bas élastiques, frictions légères, cures à Bagnoles-de-l'Orne.

Phlegmon diffus.

Incisions larges, antiseptie.

Phosphate de chaux.

( $CA^3(HO^3,2+2,Az)$ ). Dose : de 1 à 10 gr. Préparation polyphosphatée :

Glycéro-phosphate de chaux.....	6 gr.
— — soude.....	} à 2 gr.
— — potasse.....	
— — magnésie...	
— — fer.....	

Teinture de fève de Saint Ignace. XXX gouttes.  
— kola..... 10 gr.

Sirop de limon..... 0. S. pour 300 c. c.

2 fois par jour, une cuillerée à potage (Robin).

Phosphore.

Excitant des systèmes nerveux et osseux. En pilules de 0 gr. 0005 à 0 gr. 001.

Phosphorée.

(Huile). Ne pas l'employer. Huile à 1 p. 1000, 1 gr. par dose, 10 gr. par jour. Enfants : huile à 1 p. 10 000, une demi-cuillerée à café par jour et année d'âge.

Phthiriasé.

Du cuir chevelu, du pubis.

## Lotions avec :

Bichlorure d'hydrargyre.....	0 gr. 25
Essence de térébenthine.....	30 gr.
Glycérine.....	40 —
Alcoolat de citron... )	} à Q. S. pour 175 gr.
— de lavande... )	
— de roses... )	
— d'œillets... )	

On onctions avec onguent gris tous les jours (quatre jours). Bain sulfureux pour terminer, désinfection des vêtements.

Phthisie pulmonaire.

1° Chronique. — Premier degré. — Placer le malade dans de bonnes conditions hygiéniques : air et lumière, aider la respiration pulmonaire défectueuse par la respiration cutanée (frictions alcoolisées sur tout le corps). Régime alimentaire très reconstituant (macération de viande crue à haute dose (Richet), si possible dans du jus de raisin frais (Dr Lucas). Stimuler l'appétit au moyen de la persodine ou de l'orexine. Administrer de l'arsenic, du phosphate de chaux. Séjour pendant l'hiver sur le littoral méditerranéen.

Deuxième degré. — Contre la fièvre : repos et cryogénine ou antithermiques; contre l'anorexie : persodine; contre dyspepsie : alcalins; contre la diarrhée : bismuth; contre la broncho-pneumonie : expectorants, vomitifs, digitale, balsamiques; suralimentation.

Forme torpide : hivernage sur le littoral méditerranéen, contre-indiqué dans les formes nerveuses. — Cures d'altitude.

Troisième degré. — Même direction; employer les opiacés, les toni-cardiaques, l'huile camphrée.

L'hyposulfite de soude à la dose de 4 gr. par jour (Berth) est très efficace contre la gangrène pulmonaire. Luton préconise le cuprohémol.

2° *Aiguë*. — Mêmes indications, combattre l'hémoptysie.

Dans tous les cas où nous observons l'adynamie nous employons avec succès les injections sous-cutanées de sérum Chéron (5 gr. de sept à huit fois par semaine). Nous préconisons aussi dans certains cas l'alcool à haute dose; drap mouillé matin et soir dans le cas d'adynamie.

3° *Aiguë, miliaire, granuleuse*. — Calomel puis iodure de potassium associé ou non au bromure. Soutenir le cœur (sérum, huile camphrée).

Dans tous les cas ne pas négliger la prophylaxie (crachats, désinfection, isolement).

#### Pica-Pica.

Poil à gratter, révulsif.

#### Pierre divine.

Employée par les oculistes, composée de sulfate d'alumine, d'azotate de cuivre et de sulfate de cuivre.

#### Pierre infernale.

Ou crayon de nitrate d'argent. Caustique. Neutraliser par l'eau salée. Préferer le protargol.

#### Pilocarpine.

( $C_8H_9N_3O_2$ ). (Chlorhydrate de). Représente le principe actif du jaborandi. Sudorifique de 0 gr. 01 à 0 gr. 02.

#### Pitules.

Médicament sphérique solide dont le poids ne doit pas excéder 0 gr. 30, destiné à l'usage interne.

Voici une formule générale :

Principe actif..... N centigr.

Extrait mou de gentiane.... Q. S.

Véhicule. { Poudre de réglisse..... Q. S.

Pour une pilule de 0 gr. 20.

N° 20.

Argentez (si nécessaire).

Il suffit donc de consulter la posologie du médicament (V. première partie).

Voici quelques formules :

— *d'aloès*, 0 gr. 10; prendre 2 à 8 par jour.

— *d'Anderson*, contenant 0 gr. 10 d'aloès, 0 gr. 10 de gomme gutte (1 à 4).

— *Bleues* au mercure (2 à 5 par jour).

— de *Dupuytren* au mercure, contenant 0 gr. 01 de sublimé corrosif (1 à 3 par jour).

— de *Méglin*, à l'extrait de jusquiame, valériane et oxyde de zinc (2 à 6 par jour).

— de *Sédillot*, mercurielles savonneuses, contenant 0 gr. 05 de Hg. métallique.

#### Pipérazine.

( $2H^{10}Az^2$ ). Action 12 fois supérieure au carbonate de lithine. Cachets : 1 gr. par jour au maximum.

#### Piqûres.

*De puce* : frictions à l'eau de Cologne. Pour s'en préserver, se laver avec une décoction de noyer.

*D'insectes* : ammoniacale, caustiques.

*De moustique* : teinture d'iode. Pour s'en préserver, pulvériser de la teinture de pyrèthre.

#### Pityriasis.

*Rosé*, comme pour le traitement de l'eczéma.

*Versicolor*. — Bains sulfureux et lotion avec solution de sublimé corrosif au 1/500° (Besnier). Teinture d'iode.

#### Plaies.

Asepsie, antisepsie, hémostasé, sutures.

#### Plaques muqueuses.

Traitement spécifique, applications locales d'une solution de résorcine donnant une colora-



tion blanche presque caractéristique; cautérisation avec nitrate d'argent (crayon) ou nitrate acide de mercure tous les huit jours.

#### Pleurésies.

On combat la douleur par des sangsues, des ventouses scarifiées, les sinapismes; ou par les injections de morphine. Il faut rayer du traitement les diurétiques, sudorifiques, vésicatoires, et se tenir prêt à pratiquer la thoracentèse si l'épanchement est abondant. Ne pas se fier à la dyspnée, ni à la fièvre, mais évaluer la quantité de liquide par la matité, et le déplacement des organes. Le foie n'est abaissé qu'avec des épanchements de 1500 à 1800 gr. Le maximum des bruits cardiaques est au bord droit du sternum, la sonorité de l'espace de Traube a disparu. L'épanchement est de 1800 gr. Or l'urgence de la thoracentèse s'impose pour les épanchements au-dessus de 1500 gr. Le malade est assis, on marque le huitième espace intercostal sur le prolongement de l'angle inférieure de l'omoplate. On antiseptise la région, et on enfonce l'aiguille de l'aspirateur Potain ou Dieulafoy, le vide à la main dans l'espace intercostal. Le liquide jaillit. Retirer seulement 1 litre de liquide environ. On recommence si le liquide se reforme en grande quantité. L'examen du liquide indique la nature de la pleurésie; dans le cas de pleurésie purulente, thoracotomie.

#### Pleurodynie.

Réulsion, narcotiques, chloréthyle, faradisation, aconitine cristallisée 1/10<sup>e</sup> de milligr. contre la douleur, trois fois par jour, application de liniment, chloroforme, gâtacol, *loco dolenti*.

#### Plomb.

Autrefois employé en lamelle (ulcère varicelleux).

*Litharge*, paillettes rouges d'oxyde de plomb fondu (avec corps gras, diachylon) si l'oxyde a été fondu: *massicot*.

*Iodure de plomb*, poudre jaune d'or en pommade (fondant), 10 p. 100.

*Céruse ou carbonate de plomb*: employé en peinture (empoisonnements), ainsi que le minium.

*Acétate de plomb*, de 0 gr. 01 à 0 gr. 15 par jour en pilules (se méfier) contre sueurs des phthisiques à l'ext. 0 gr. 25 à 1 p. 100 en injection.

*Sous-acétate de plomb liquide*, en solution à 20 p. 100, eau blanche. L'eau de Goulard renferme en plus 8 p. 100 d'alcoolat vulnéraire. Pommade à 15 p. 100.

#### Plombières (Vosges).

(Note communiquée par M. le Dr Pellier, médecin consultant.)

Saison: du 15 mai au 30 septembre.

La petite ville de Plombières-les-Bains, située dans un des sites les plus pittoresques des Vosges, abrite dans son étroite vallée huit établissements de bains et de douches, deux établissements spéciaux, uniques, créés récemment pour le traitement des *maladies de l'intestin*, des salles d'inhalation, des étuves célèbres datant des Romains, le tout muni d'appareils nouveaux qui en font une station de premier ordre.

De son sol granitique s'échappent vingt-deux sources. Ces eaux sulfatées et silicatées sodiques renferment des traces d'arsenic; leur température s'échelonne de 13 à 74° centigrades.

La C<sup>ie</sup> fermière offre gratuitement le traitement thermal à MM. les docteurs, à leurs femmes et à leurs enfants non mariés.

Il faut mettre en tête des indications thérapeutiques: 1° les affections intestinales et, en particulier, les entérites où dominent la douleur et l'érythème nerveux (entérite muco-membraneuse), l'appendicite, les diarrhées chroniques

et les dyspepsies. (Bains tièdes, lavages du col par l'eau thermale pris dans la position couchée à l'aide de l'appareil spécial; source des Dames en boisson 51°).

2° Les affections névralgiques et rhumatismales récentes ou chroniques (étuve romaine, eaux très chaudes).

3° Les maladies des femmes (dysménorrhée, métrites, annexite), quelques paralysies rhumatismales ou de cause centrale, certaines dermatoses irritables, le paludisme (injections, longs bains, douches révsulsives, bain tiède).

On réussit tous les ans dans des cas de stérilité. Enfin, les affections arthritiques de l'appareil respiratoire relèvent des inhalations.

Les eaux agissent surtout en amenant la sédation des phénomènes douloureux et de l'éréthisme nerveux chez les neuro-arthritiques.

#### Pneumonie.

Expectorants : kermès, potion de Todd (alcool); thérapeutique de symptômes (fièvre, adynamie, délire, etc.).

Ne pas laisser les vieillards au lit de peur des congestions passives du poumon. Drap mouillé matin et soir. Soutenir le myocarde : caféine, spartéine. Surveiller les reins : théobromine.

#### Pneumothorax.

Repos. Opiacés, ponction capillaire.

#### Podophyllin.

Purgatif, 0 gr. 01 à 0 gr. 03; laxatif, cholagogue (poudre de).

#### Polygala de Virginie.

(Racine). Émétique et convulsivante de 0 gr. 50 à 2 gr.

#### Polyurie nerveuse.

Antipyrine, bromure, valériane.

#### Pommades.

Médicaments pour l'usage externe à base de graisse de porc (axonge) ou de vaseline, lanoline, etc.

#### Pommade d'Autenrieth.

Révsulsive, préconisée dans les attaques de goutte mal localisées, et contre les nævi materni : émétique, 10 gr.; axonge benzoïnée, 30 gr.

#### Pommade de Desault.

Au précipité rouge et à l'oxyde de zinc, employée contre la kératite, la conjonctivite.

#### Pommade dermothérapique.

*Ayant la couleur de la peau* (M. H. Rausch).

Argile rouge.....	0 gr. 25
Glycérine.....	XX gouttes
Solution d'osine rouge à 2 p. 1000	7 gr.
Pommade à l'oxyde de zinc.....	40 —

Mélez. Usage externe.

#### Pommade au goudron.

Goudron purifié, 10 gr.; axonge, 30 gr.

#### Pommade du Régent.

(Ophtalmique.)

Beurre frais.....	18 gr.
Camphre.....	0 gr. 10
Précipité.....	} à 1 gr.
Sel de saturne.....	

Appliquer sur les paupières. Conjonctivites, kératites.

#### Pommade au précipité blanc.

Protochlorure de Hg. A l'axonge 1/20°.

#### Pommade au précipité jaune.

Oxyde Hg par voie humide. A 0 gr. 03 p. 10 gr. de cold-cream.