

**Pommade au précipité rouge et à l'axonge.**

Oxyde rouge de Hg. Au 1/15°.

**Pommades diverses.**

— Ammoniaque, 15 0/0.	— mercurielle simple au 1/2.
— Belladone, 25 0/0.	— — double au 2/3.
— Camphre, 2 à 10 0/0.	— Orthoforme, 1/10°.
— Chloroforme, 10 0/0.	— Oxyde de zinc, 10 à 50 0/0.
— Cocaïne, 1 à 3 0/0.	— Phéniquée, 1/10° (Codex).
— Créosote, 2 à 4 0/0.	— Résorcine, 10 à 20 0/0.
— Goudron au 1/4.	— Salicylée, 2 0/0.
— Ichtyol, 10 0/0.	— Salol, 12 0/0.
— Iodo-iodurée (1 0/0 à 4 0/0).	— Soufre, 10 0/0.
— Iodoforme, 12 0/0.	— Tanin, 1 à 20 0/0.
— Iodure de plomb, 25 0/0.	— Vératrine, 1/150°.
— Iodure de K., 25 0/0.	

**POSOLOGIE ET NOTES**

DE

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

Signes conventionnels..	}	Pad. = Par année d'âge.
		P. d. = Par dose.
		P. j. = Par jour.
		C. P. = Cuillère à potage. C. c. Cuillère à café.

*Ni acide phénique, ni opium, ni émétique  
chez les enfants.*

(antispasmodique prescrire alcoo- lature 1 gr. = LII gouttes)...	}	A 2 ans 1 gtte par h. P. j. V à X gttes.
		A 3 ans I — P. j. XX gttes.
		A 10 ans I g. par h. P. j. XXX gttes.
		N.-B. — On peut associer à par- ties égales, teintures : de bella- done, digitale ou grindélia ro- busta.

ALCOOL. — Dans les premiers mois, 10 gr. d'eau-de-  
vie diluée par jour.

Entre 4 et 6 ans, 30 gr.

AMMONIAQUE (acétate d'). — Stimulant, diaphoré-  
tique, 0 gr. 50 par j. et Pad.

ANTIPYRINE. — 0 gr. 50 P. j. et Pad.

**APPARITION DES DENTS (Auvard).**

6 mois, 4 incisives moy.	7 ans, 4 <sup>es</sup> grosses mol.
9 — 4 — latér.	8 — 4 incisives méd.
12 — 4 <sup>es</sup> petites mol..	9 — 4 incisives latér.
15 — 4 canines.	10 — 4 <sup>es</sup> petites mol.
18 — 4 2 <sup>e</sup> petites mol.	11 — 4 2 <sup>es</sup> petites mol.
20 dents de lait..	12 — 4 canines.
	13 — 4, 2 <sup>es</sup> gros. mol.
	19 à 30, 4 dents de sagesse.

N.-B. — Sirop Dela-  
barre, iode, incisions.

32 dents permanentes.  
ARSÉNIEUX (acide). — 1 milligr. par j. et 2 années  
d'âge.

BAINS. — Dans la première enfance, bain froid à 25°.  
Entre 3 et 15 ans 20°, 4 P. j.

BELLADONE	Jusqu'à 2 ans, III à V gttes P. j.
(contre spasmes et hypersécrétions.	— 3 — V à VIII —
Contre - indica- tions, abatte- ment et prostra- tion. Prescrire :	— 10 — X à XX —
Teinture 1 gr. = gouttes)..	V gttes Pad. et P. j. (Comby). Intolérance indiquée par dilat. pupille, yeux brillants, visage animé. N.-B. — On peut associer alcoo- lature d'aconit, teintures dro- sera, grindélia robusta.

BENZO-NAPHTOL. — 0 gr. 20 P. j. et Pad.

BISMUTH (sal. de). — 0 gr. 10 à 0 gr. 20 P. j. et  
Pad.

BROMOFORME. — Toux spasmodique, coque- luche, dans un looch..	}	31 <sup>es</sup> mois, I gttes P. j.
		6 — H — —
		9 — III — —
		12 — IV — —
		Au delà IV gouttes Pad. et par jour.

BROMURE DE CAMPHRE. — Chorée, incontinence

- d'urine, épilepsie. 2<sup>e</sup> enfance 0 gr. 10 Pd. 3 ou 4 fois par jour.
- Bromure de potassium.....
- Bromure de strontium.....
- (Convulsions, céphalalgie, attaques épileptiformes).....
- Jusqu'à 1 an, 0 gr. 20 p. j. en 2 doses.  
— 2 ans, 0 gr. 40 —  
Au delà, 1, 2, 3 gr. jusqu'à effet (Jules Simon a atteint 10 gr. chez enfant de 12 ans).
- BRONCHITE AIGUE.** — Une formule :
- Liqueur ammoniacale astringente..... 0 gr. 50 à 4 gr.  
Sirop de codéine..... 10 gr.  
— de fleurs d'oranger..... 20 —  
Eau distillée..... 120 —  
Une C. P. d'heure en heure.
- CAFÉINE.** — 0 gr. 05 à 0 gr. 10 P. j. et Pad.
- CAMPHRE.** — Poudre, pilules 0 gr. 05 P. j. et Pad.
- CHLORAL.** — 0 gr. 10 à 0 gr. 20 P. j. et Pad.
- CHLORHYDRIQUE** (acide).....
- 1/2 à 1 gte avant 15 mois.  
II à IV — — 3 ans.  
IV à X — — 6 ans.  
X à XX — — 10 ans.
- CHLOROFORME.** — 11 gouttes P. j. et Pad.
- CODÉINE** (Sirop de). — 2 gr. P. j. et Pad, au-dessus de 2 ans.
- COLOMBO** (poudre). — 0 gr. 10 P. j. et Pad.
- COURGE** (semences). — Dans un looch, 30 à 40 gr.
- CRÉOSOTE DE HÊTRE.** — 0 gr. 05 par la bouche et 0 gr. 25 à 0 gr. 50 en lavement.
- DATURA STRAMONIUM.** — Succédané plus toxique que la belladone, 0 gr. 01 d'extrait aqueux par jour et Pad.
- DIGITALE.** — Ralentit, régularise, augmente la force des mouvements du cœur. Prudence avant 2 ans. Après :
- Poudre : 1/2, 1 ou 2 centigr. P. j. et Pad. pendant 3 à 7 jours, dans un looch. Joindre sirop de café.

- N.-B.** — Les pulsations sont de : 140 à 130 nouveau-né, 130 à 110 de 1 à 2 ans, 110 à 100 de 2 à 5, 100 à 80 de 6 à 10, 76 (normale) vers 11 ou 12 ans.
- La respiration est, respectivement : 40 à 30 (nouveau-né), 32 à 30 (1 à 2 ans), 30 à 20 (2 à 5), 28 à 20 (6 à 10), 26 à 12 (11 à 12).
- DIURÉTINE.** — 0 gr. 10 à 0 gr. 20 P. j. et Pad.
- DROSÉRA** (teinture). — V à X gouttes P. j. et Pad. Antispasmodique.
- ERGOTINE BONJEAN.** — 0 gr. 10 P. j. et Pad.
- ÉTHER.** — Us. int. : I à III gttés jusqu'à 15 mois P. j.  
III à X — — 3 ans P. j.  
X à XV — — 5 —
- FER** (lactate). — Après un an : 0 gr. 05 P. j.
- FOUGÈRE MALE** (Extrait éthéré).  
0 gr. 50 à 1 gr. de 1 à 2 ans.  
1 à 3 gr. de 2 à 5 ans.  
3 à 5 gr. de 5 à 10 ans.
- GAIACOL.** — En pilule, après un an, 0 gr. 05 P. j.
- GENTIANE** (teinture). — 0 gr. 20 P. j. et Pad.
- GLYCÉRINE** en lavement :
- 2 à 3 gr. jusqu'à 15 mois.  
10 — — 3 ans.  
30 — — 12 —
- GLYCÉRO-PHOSPHATE DE CHAUX.** — 0 gr. 05 après 15 mois P. j. et Pad.
- GOUDRON** (Eau de). — 10 gr. P. j. et Pad.
- GRINDELIA ROBUSTA** (antispasmodique). — Teinture ; V gouttes dans potion, P. j. et Pad.
- HAMAMELIS VIRGINICA** (teinture). — V gouttes P. j. et Pad.
- HOUBLON** (prescrire lupulin). — 0 gr. 10 P. j. et Pad. (onanisme).
- HUILE DE FOIE DE MORUE.** — Après 15 mois : Une C. c. P. j. et Pad.
- HYDRASTIS CANADENSIS.** — Prescrire hydrastine, en pilule 0 gr. 01 P. j. et Pad.
- IODE** abaisse tension, facilite l'hématose. Usage int. : II à III gouttes P. j. dans du lait, entre 2 et 3 ans.

IODURE DE FER (sirop). — Sirop iodo-tannique et de raifort iodé 2 à 4 C. c. P. j.

IODURE DE POTASSIUM. — En solution à 5 p. 100 une C. c. P. j. et Pad. Jusqu'à 0 gr. 20 et 0 gr. 40 dans la méningite P. j. et Pad. à tout âge.

Dans la diphtérie le Dr Piedallu préconise la potion suivante par C. c. de 2 en 2 heures :

Iodure de potassium.....	50 gr.
Biiodure de Hg.....	0 gr. 50
Sp. d'écorce d'orange amères..	1000 gr.

IODURE DE SODIUM. — 0 gr. 10 à 0 gr. 20 P. j. et Pad.

JABORANDI. — Prescrire pilocarpine (nitrate de) 0 gr. 002 P. j. et Pad. Se méfier.

JUSQUIAME sédative, hypnagogue. Poudre 0 gr. 02 P. j. et Pad.

KERMÈS expectorant, dans looch 0 gr. 01 P. j. et Pad. après 3 ans.

KOLA. — Teinture à 1/5<sup>e</sup> X gouttes P. j. et Pad.

LACTIQUE (acide). — 1 gr. P. j. et Pad. jusqu'à 5 ans, au delà jusqu'à 3 et 5 gr. P. j.

LAURIER-CERISE. — 1 gr. P. j. et Pad. après 3 ans.

LITHINE (benzoate). — Après 3 ans, 0 gr. 02 P. j. et Pad.

MAGNESIE CALCINÉE. — 0 gr. 10 à 0 gr. 20 P. j. et Pad.

MERCURE. — Usage externe : onguent gris, onguent napolitain, en frictions, dès naissance 2 gr. par jour. Emplâtre de Vigo.

Emplâtre des quatre fondants (4 fois plus faible que le précédent :

Emplâtre de Vigo.....	}    ãã Q. S.
— de diachylon...	
— ciguë.....	
— savon.....	

Liqueur de Van Swieten (alcoolisée, 1 p. 1000).

Usage interne : calomel purgatif 0 gr. 05 Pd., P. j. et Pad. peut s'associer à parties égales avec

scammonée ou jalap. Dose réfractée (diarrhée infectieuse) 0 gr. 01 à 0 gr. 05 toutes les 2 ou 3 heures suivant âge. Dans l'ictère 0 gr. 01 à 0 gr. 02 le matin pendant 8 jours.

Liqueur de Van Swieten, X gouttes P. j. dans 1<sup>re</sup> semaine, XX gouttes P. j., 1<sup>er</sup> mois. 2 à 5 gr. P. j. 1<sup>re</sup> années. Au bout de 3 mois de traitement : Sirop de Gibert, 1/4 à 1 C. c. P. j. jusqu'à 2 ans. 2 C. c. P. j. à partir de 3 ans.

MÉTHYLAL. — Hypnotique, en potion 0 gr. 10 à 0 gr. 20 P. j. et Pad.

MUGUET. — Tonique cardiaque, extrait aqueux 0 gr. 5 après 3 ans P. j. Pad.

MUSC (teinture). — Antispasmodique stimulant. Extrait éthéré 0 gr. 25 P. j. et Pad.

NAPHTOL β. — 0 gr. 10 à 0 gr. 20 P. j. et Pad.

NERPRUN (sirop). — Purgatif 2 gr. P. j. et Pad.

NOIX VOMIQUE (teinture à 1/5). — 1 gtte P. j. et Pad. Adultes V à X gouttes.

OPIUM. — A 5 ans 0 gr. 005 (prudence). Extrait.

Élixir parégorique (extrême prudence).

De 0 à 6 mois, II à V gouttes.

De 6 mois à 1 an, V à X gouttes.

De 1 à 2 ans, X à XV —

De 2 à 3 ans, XV à XXX —

De 3 à 5 ans, 1 à 2 gr.

De 5 à 12 ans, 2 à 10 gr.

Adulte, 2 à 20 gr. (Nogué).

PANCRÉATINE. — 0 gr. 05 à 0 gr. 10 P. j. et Pad.

PEPSINE. — 0 gr. 05 à 0 gr. 10 P. j. et Pad. (paquets).

PEPTONE. — 0 gr. 50 à 1 gr. P. j. et Pad.

PHÉNACÉTINE. — 0 gr. 10 P. j. et Pad. Après 3 ans.

PHÉNIQUE. — Très dangereux.

PHOSPHATE DE CHAUX (Sirop de). — Une C. c. après 10 mois.

PHOSPHORÉE (Huile 1 p. 10000). Une cuillerée à café pour 1/2 milligr. Ne pas dépasser 1 cuillerée à café pour les enfants de n'importe quel âge (Manquat).

POTASSE (acétate de). — 0 gr. 20 P. j. et Pad. diurétique.

PURGATIFS. — A. Salins. — Tartrate de soude, tartrate de potasse et de soude, tartrate borico-potassique (10 à 15 gr. 2<sup>e</sup> enfance); magnésie calcinée (3 à 6 gr.); citrate de magnésie (10 à 15 gr.); sulfoviniate de soude, sulfate de soude ou de magnésie, phosphate de soude (10 gr.).

Baux minérales : Janos, Rubinat, Carabana, Montmirail, Villacabras (joindre un sirop, Comby).

B. Huileux. — Huile d'amande douce, 1 à 2 cuillerées à soupe; huile de ricin, 10 à 15 gr.

C. Sucrés. — Miel blanc (1 à 2 cuillerées); pruneaux cuits (ajouter 2 à 4 gr. de follicule de séné); manne (0 gr. 20 à 1 gr. 50 P. j.).

D. Drastiques et résineux. — Rhubarbe (1 à 2 cuillerées à café de sirop de chicorée); jalap (0 gr. 25 à 0 gr. 50), poudre; scammonée (0 gr. 25 à 0 gr. 50); séné (2 à 4 gr.) follicules.

E. Calomel (0 gr. 05) Pd. et Pad.

QUASSIA AMARA (teinture à 1/5). Vgtes P. j. et Pad.

QUINQUINA à partir de 3 à 4 ans seulement 1 à 4 gr. P. j. d'extrait.

QUININE (chlorhydrate). — 0 gr. 10 Pad. Si urgence, doubler dose. Injection hypodermique à 0 gr. 25 par cent. c. (P. j. : 1/2 seringue à 1 an, 1 à 2 ans, 2 au-dessus).

RATANHIA (extrait), 0 gr. 20 P. j. et Pad., anti-diarrhéique.

SALICYLIQUE (acide), 0 gr. 05 à 0 gr. 20 (?) P. j. et Pad.

SALOL 0 gr. 05 à 0 gr. 10 dans looch. P. j. et Pad.

SALSEPAREILLE (sirop), 5 gr. P. j. et Pad.

SCILLE. — Après 15 mois, teinture II à Vgtes P. j. et Pad.

SEMEN-CONTRA. — Infusion à 4 p. 500 P. j. et Pad.; santoline, poudre 0 gr. 01 P. j. et Pad., après 2 ans.

SOUDE (bicarbonate), 0 gr. 20.

SOUDE (hyposulfite), 0 gr. 20 P. j. et Pad.

SOUDE (salicylate de), 0 gr. 20 à 0 gr. 40 P. j. et Pad.

SOUFRE (poudre de), 0 gr. 50 P. j. et Pad.

SPARTÉINE (sulfate de), 0 gr. 01 P. j. et Pad. après 2 ans.

TANIN, 0 gr. 20 P. j., après 15 mois.

TANNIGÈNE, 0 gr. 15 P. j. et Pad.

TÉRÉBENTHINE (sirop), 5 gr. dans eau P. j. et Pad.

TERPINE, 0 gr. 05 à 0 gr. 10 P. j. et Pad. (potion gommeuse).

TISANE. — A. Expectorante. — Espèces béchiques (feuilles capillaire, véronique, hysope, lierre terrestre, scolopendre, capsule de pavot blanc) 4 gr. par litre.

Fleurs pectorales (mauve, p. de chat, pas-d'âne, bouillon blanc, coquelicot, guimauve, violette), 4 p. 1000.

Fruits pectoraux (jubes, dattes, figues, raisins) 50 p. 1000.

B. Diurétiques. — Queues de cerises 10 p. 1000, chiendent 20 p. 1000, ajouter 2 gr. de nitrate de potasse.

C. Laxative. — Séné 10 p. 1000; écorce moyenne de sureau, en décoction 30 p. 1000; pruneaux 60 p. 1000.

D. Anti-diarrhéique. — Riz 20 p. 1000, édulcorer avec sirop de coing.

E. Sudorifique. Bourrache 10 p. 1000; fleur de sureau 4 p. 1000.

F. Anti-venteuse. — Anis 8 p. 1000.

G. Antispasmodique. — Tilleul 8 p. 1000; orange, mélilot, menthe 10 p. 1000; valériane 10 p. 1000.

H. Vermifuge. — Absinthe, matricaire 5 p. 1000, édulcorer avec mousse de Corse (sirop 50 à 60 gr.).

I. Antiscorbutique. — Feuilles de noyer 20 gr., édulcorer avec sirop de raifort.

J. Antirhumatismale. — Feuilles de frêne, 20 p. 1000.

K. Antihépétiques. — Année, bardane, patience, saponaire 20 p. 1000. Pensées sauvages 10 p. 1000.

URÉTHANE, 0 gr. 10 P. j. et Pad. Hypnotique inoffensif.

VALÉRIANE (sirop), 2 gr. P. j. et Pad.

Potasse caustique.

(KOH). Employée en nature ou avec la chaux comme caustique.

Potion.

Préparation magistrale (dans laquelle le nom et la dose de tous les médicaments employés sont inscrits en toutes lettres) contenant un rop et destinée à être prise par cuillerées suivant l'ordonnance du médecin.

Composée de 4 parties :

Base.....	.....
Adjuvant.....	.....
Correctif.....	.....
Véhicule.....	.....

Une potion devant être prise à la dose de 4 cuillerées à potage par jour et devant durer quatre jours, pèsera 320 gr. et renfermera 16 doses.

Voici la liste de quelques correctifs et véhicules.

Eau d'anis.	} Doses : Comme excipient 100 gr. Comme correctif 10 à 20 gr.
— de cannelle.	
— de fleurs d'oranger.	
— de laitue.	
— de laurier-cerise.	
— de lavande.	
— de mélisse.	
— de menthe.	
— de thym.	
— de tilleul.	
— distillée de rose.	
Sirop de cannelle.	
— d'écorce d'oranges amères.	
— de fleurs d'oranger.	
— de gomme.	
— de laurier-cerise.	
— de menthe.	
— de roses.	

Alcoolat de bergamote.	} Correctif : Dose 10 à 20 gr.
— de citron (XXX gouttes).	
— d'écorce d'orange.	
— de fleurs d'oranger.	
— de girofle.	
— de lavande.	
— de mélisse.	
— de menthe.	
Teinture d'anis.	} Correctif : quelques gouttes
— de benjoin.	
— de castoréum.	
— de menthe.	

Potion anti-vomitiv.

Chlorhydrate de cocaïne.....	0 gr. 25
— d'eucaïne.....	0 gr. 25
Eau chloroformée.....	100 gr.
Eau distillée.....	200 —

Par cuillerées à potage.

Potion calmante.

Chlorhydrate de morphine.....	0 gr. 01
Eau de fleurs d'oranger.....	20 gr.
Hydrolat de tilleul.....	30 —

A prendre en une fois à trois heures d'un repas.

Potion contre la toux.

Carbonate d'ammoniaque.....	2 gr.
Eau-de-vie vieille.....	30 —
Hydrolat de fleurs d'oranger.....	40 —
Sirop de gomme.....	25 —
— de tolu.....	20 —
— de morphine.....	15 —

6 à 8 cuillerées à soupe dans la journée loin des repas. (Delioux de Savignac.)

Potion de Choppart.

Copahu.....	60 gr.
Alcool à 80°.....	60 —

Sirop de tolu.....	60 gr.
Eau de menthe.....	120 —
Alcool nitrique.....	2 —

2 à 6 cuillerées à potage par jour.

**Potion julep gommeux.**

Gomme arabique pulvérisée.....	10 gr.
Sirop de simples.....	30 —
Eau distillée de fleurs d'oranger..	10 —
Eau distillée.....	100 —

Sert de véhicule.

**Potion gazeuse du Codex.**

(Antibomilive dite de Rivière).

Sol. 1 (alcaline).		Sol. 2 (acide).	
Bicarb. de potas. . . . .	2 gr.	Acide citrique. . . . .	2 gr.
Eau distillée. . . . .	50 —	Eau distillée. . . . .	50 —
Sirop de sucre. . . . .	15 —	Sirop de sucre. . . . .	15 —

1 cuillerée de chacune de ces potions l'une après l'autre.

**Potion de Todd.**

(Véhicule.)

Eau-de-vie vieille.....	40 gr.
Eau distillée.....	75 —
Sirop de sucre.....	30 —
Teinture de cannelle.....	5 —

**Poudre.**

Médicaments pulvérisés pour présenter une grande surface).

**Poudre de Dower.**

Sulfate de potasse.....	4 gr.
Nitrate de potasse.....	4 —
Ipéca.....	1 —
Réglisse.....	10 —
Poudre d'opium sèche.....	4 —

Dose de 0 gr. 05 à 1 gr.; 1 gr. correspond à 0 gr. 05 d'opium. Diurétique.

**Poudre de Pistoia.**

Bulbes de colchique pulvérisés.....	20 gr.
Racine de bryone pulvérisée.....	10 —
Bétoine (feuilles, tiges, rac.) pulv. .	50 —
Gentiane (racine) pulvérisée.....	10 —
Camomille pulvérisée.....	10 —

De 0 gr. 25 à 0 gr. 50 par jour pendant 5 à 6 jours.

**Poudre de Vienne.**

Caustique, mélange à parties égales de chaux vive et de potasse caustique.

**Pouques-les-Eaux (Nièvre).**

(Note communiquée par M. le Dr Hérard de Bessé, médecin consultant.)

Altitude 200 mètres.

Saison du 15 mai au 30 septembre.

Sources alcalines bicarbonatées mixtes (gazeuses et froides).

Trois sources principales : *Saint-Léger*, à prédominance calcique (15000 litres en 24 heures); *Saint-Léon*, à prédominance sodique (faible débit); *Eltzabeth*, à forte prédominance calcique (débit considérable).

*Saint-Léger*, la plus ancienne, ne résultant pas d'un forage, est la plus employée surtout comme expéditions.

Buvettes, établissement hydrothérapique, bains, douches entéroclyses, etc. Casino, théâtre, parc d'une beauté remarquable; concerts deux fois par jour.

*Indications.* — 1° Générales : enfance, vieillesse; cure alcaline chez les *débilités*.

2° Particulières : *Estomac*, atonie, dyspepsies neuro-motrice, hyposthénique, etc.

*Intestin* : atonie, entérites des pays chauds.

Diarrhées, entérite muco-membraneuse. Foie : lithiase biliaire par infection ascendante, gastro-intestinale. Reins : lithiases urique, phosphaturique, oxalurique ; infections légères des voies urinaires. Maladies générales : goutte asthénique, diabète arthritique surtout à la période de déclin des forces ; chlorose, anémies (paludisme, etc.) ; convalescences, neurasthénie surtout si tube digestif défectueux primitivement ou secondairement.

*Contre-indications.* — 1° Maladies des organes sus-diaphragmatiques ;

2° Carcinomes ;

3° Etats aigus ;

4° Eréthisme vasculaire marqué avec fortes tendances congestives.

Tout ce qui n'est pas noté aux indications.

*Pouques-Bellevue.* — A 12000 mètres de l'établissement à 300 mètres d'altitude ; plateau de 25000 mètres ; vue sur le mont Givre. Terrasse de 200 mètres avec vue illimitée ; cure d'air.

#### Préchaq-les-Bains (Landes).

(Note communiquée par M. le Dr Darroze, médecin consultant.)

Etablissement de premier ordre, desservi par la gare de Laluque et ouvert du 1<sup>er</sup> mai au 1<sup>er</sup> novembre.

Bons végéto-minérales, eaux sulfatées calciques hyperthermales. Guérison du rhumatisme sous toutes ses formes, de la goutte atonique, de l'hydarthrose, des arthrites chroniques, des engorgements et déformations articulaires, de la lithiase rénale, des métrites arthritiques, de la neurasthénie.

Eaux sulfureuses, applicables aux maladies des voies respiratoires, aux affections gastro-intestinales, aux maladies de la peau. Salles de pulvérisations et de humage. Climat doux et tempéré.

#### Preste (La) (Pyrénées-Orientales).

Toute l'année.

Quatre sources débitant 1700000 litres en 24 heures d'eau sulfurée, à une température de 44°, coulant dans des rigoles à ciel ouvert (formation d'hyposulfite et sulfate). Altitude 1100 mètres.

Usage interne. Établissement thermal. Traitement des voies urinaires (catarrhe, gravelle, néphrites). Rhumatisme, dermatoses, voies respiratoires.

#### Prolapsus du rectum.

Ne pas laisser les enfants séjourner sur le vase. Applications locales d'alun, 1 gr., de ratanhia, 1 gr. ; on introduit un morceau de glace dans l'anus après réduction. Toute la portion prolapsée peut être sillonnée longitudinalement de six raies au thermocautère, puis on réduira. On peut aussi faire l'excision au bistouri.

#### Prolapsus utérin.

Appareils suspensifs, pessaires, traitement chirurgical.

#### Prostatites.

*Aiguë.* — Sangsues au périnée, grands bains chauds, lavements émollients chauds, suppositoires belladonnés, 0 gr. 02 ; opiacés, 0 gr. 04 ; cocaïnés, 0 gr. 05 ; vider la vessie avec sonde molle. Dès que le pus est reconnu, ouvrir largement par incision périnéale transversale large. — *Chronique.* Traitement général : repos, tonique, hydrothérapie. Localement, révulsion au périnée, bains de siège très chauds, lavements chauds. Instillation d'une solution de nitrate d'argent au 1/50 portée sur la région.

#### Protargol.

Composé protéique d'argent qui renferme

8,3 p. 100 de ce métal et qui, tout en ne précipitant pas les albuminoïdes, présente encore l'avantage de posséder l'argent si bien masqué que ni les sulfures alcalins, ni les alcalis, ni le chlorure de sodium, ni les acides ne le mettent en liberté.

Ses solutions aqueuses, même concentrées, ne provoquent aucun phénomène irritant, ni sensation douloureuse, et de plus il est un bactéricide puissant envers les microbes pyogènes. De là son utilité contre les urétrites, les blennorrhagies et la possibilité d'en continuer longtemps l'emploi. Doit remplacer le nitrate d'argent en ophtalmologie (instillations à 10 p. 100).

Dans la blennorrhagie le meilleur mode d'agir, est de commencer par des injections à 0 gr. 25 p. 100, puis d'élever la concentration jusqu'à 0 gr. 50, 1 gr. p. 100.

En pommade, dose : 1/30.

#### Pruneaux.

Laxatif léger en décoction de 200 à 300 gr. p. 1000.

#### Prurigo.

Le matin, savonnage à l'eau chaude et au savon naphtolé, phéniqué ou au goudron, ensuite lotion chaude avec eau de camomille ou guimauve contenant vinaigre, 100 gr., ou chloral, 10 gr. par litre, puis saupoudrer la région avec talc contenant salicylate de bismuth, 10 p. 100 ou oxyde de zinc, 10 p. 100, recouvrir d'une toile caoutchoutée. Le soir, lotion chaude avec eau de guimauve chloralée ou vinaigrée, puis mettre emplâtre à huile de foie de morue ou une pommade à l'acide salicylique, 2 p. 100; au naphtol, 5 p. 100; au salol, 5 p. 100.

#### Prurits.

Régime rafraîchissant. Bains émollients. Cures à Nérès, Plombières, Royat, la Bourboule. Sau-

poudrer avec : talc, amidon, acide salicylique.

*Usage interne.* — **Prescrire des pilules au Guaco** (ainsi que des lotions avec le même médicament).

*Usage externe.* — Pommades à l'orthoforme, à la cocaïne.

Cautérisation des muqueuses anales et vaginales (nitrate d'argent, 20 p. 100, solution phéniquée, 10 p. 100. V. Herzen).

#### Psoriasis.

Faire tomber les croûtes avec des bains chauds amidonnés ou boratés (100 gr.), ensuite frictions deux fois par jour avec huile de cade pure ou étendue avec : vaseline ou lanoline (mauvaise odeur), ou employer l'acide chrysophanique en pommade à 8 p. 100, avec vaseline, lanoline, axonge (coloration violette du linge), ou l'acide pyrogallique en pommade à 8 p. 100 ou en solution dans la traumaticine (toxiques), ou le turbith minéral en pommade à 2/30. La médication arsenicale a donné de bons résultats; l'iodure de potassium à la dose de 5 gr. par jour aussi.

#### Ptyalisme.

Employer le sulfate d'atropine en pilule d'un demi-milligr. 1 à 2 par jour.

#### Pulva.

En Bohême : Eaux purgatives salines (sulfate de soude, 21 gr. et de magnésie, 33 gr.); dose : de un à deux verres à jeun.

#### Pulvérisations.

Réduction en gouttelettes très ténues, au moyen d'un vaporisateur. Antiseptie, anesthésie (éther).

#### Pupillaires.

(Modificateurs.)



Dilatation : atropine (en solution au 1 p. 100).

Contraction : éserine (en solution au 1 p. 100).

### Purgatifs.

1° Évacuants simples :

*Salins.* — Sulfate de soude, 30 gr., magnésie (4 à 10 gr.), sulfate de magnésie, 30 gr.

*Cathartiques.* — Séné (follicule, 5 à 15 gr.), rhubarbe (laxatif, 0 gr. 05 à 0 gr. 60; purgatif, 2 à 4 gr.), nerprun (sirop, 60 gr.), huile de ricin (30 à 40 gr.), teinture de cascara, XXX à XL gouttes.

*Mécaniques.* — Huiles végétales, 60 gr.

*Sucrès.* — Manne (50 à 60 gr.), tamarin (20 à 50 gr.), miel (100 à 150 gr.), casse (infusion, 50 gr.), mercuriale (50 gr.), pruneaux (150 gr.).

2° Dérivatifs ou drastiques :

*Cholagogues.* — Aloès (0 gr. 01 à 0 gr. 10), podophyllin (0 gr. 01 à 0 gr. 05).

*Hydragogues.* — Calomel, 0 gr. 30 à 1 gr.; enfants, 0 gr. 05 à 0 gr. 10.

Jalap, poudre (0 gr. 50 à 2 gr.).

Huile de croton (I à III gouttes).

### Purpura.

Supprimer iode et iodures, médication hémostatique.

### Pustule maligne.

Cautérisation, antisepsie.

### Pyramidon.

Analgésique, antipyrétique; mieux supporté que l'antipyrine, en cachets de 0 gr. 25, trois à quatre par jour.

### Pyridine.

( $C_5H_5Az$ ). En inhalation contre l'asthme, V gouttes sur un mouchoir.

### Pyrosis.

Employer la magnésie, 3 gr. par jour en cachets ou potion; on peut lui associer le sous-nitrate de bismuth, 3 à 4 gr. dans des cachets.

### Q

### Quassia amara.

(Simaroubées.) — Doses : extrait, 0 gr. 20 à 2 gr.; poudre, 0 gr. 50 à 2 gr.; teinture, 2 à 4 gr., vin, 50 à 100 gr.; apéritif, amer. Principe actif : quassine (dose, 1 à 4 milligr.).

### Quillaja saponaria.

Fournit l'écorce de Panama. Teinture au 1/5<sup>e</sup>.

### Quinine.

( $C_{20}H_{24}Az_2O_2 + 3Aq$ ). Alcaloïde du quinquina. On n'emploie que les sels; ne les employer qu'en cachets et pilules; tous les sels neutres sont très solubles et peuvent s'employer en injections hypodermiques ou potions.

Bromhydrate de Q. contient 75/100 de quinine; il est basique, insoluble ou neutre, soluble.

Chlorhydrate de Q. contient 80/100 de quinine; il est basique, insoluble ou neutre, soluble.

Chlorydrophosphate de Q. contient 50/100.

Chlorydrosulfate de Q. contient 74,2/100.

Lactate de Q. contient 75/100 de quinine; il est basique, insoluble ou neutre, soluble.

Sulfate de Q. contient 74/100 de quinine; basique peu soluble, neutre peu soluble.

Tannate de Q. contient 20/100 de quinine, peu soluble. (Employé contre sueurs des phthisiques.)

Tous ces sels s'emploient à la dose de 0 gr. 25 à 0 gr. 75 par jour (en lavement, 1 gr. 50.) On