

2.	Teinture de gentiane	} āā	4 grammes.
	— de badiane		
	— de noix vomique		
	— d'écorces d'oranges		
	Chloroforme		XL gouttes. XXV —

X à XX gouttes un quart d'heure avant chaque repas (Huchard).

5.	Eau distillée	220 grammes.	
	— de fleurs d'oranger	50 —	
	— de menthe	15 —	
	Teinture amère de Baumé	5 —	
	— de quinquina	} āā	6 —
	— de colombo		
	— de badiane		
	— d'écorces d'oranges		

Filtrez.

Une grande cuillerée un quart d'heure avant chaque repas (Vigier).

4.	Teinture de colombo	} āā	6 grammes.
	Liqueur d'Hoffmann		
	Teinture de badiane	} āā	2 —
	— de noix vomique		

(POTAIN.)

XX gouttes avant chaque repas.

5.	Teinture de noix vomique	5 grammes.	
	Gouttes amères de Baumé	} āā	10 —
	Teinture de gentiane		
	— de rhubarbe composée	} āā	20 —
	Eau distillée de laurier-cerise		
	— de menthe	q. s. pour	100 c. c.

Une cuillerée à café à chaque repas (Grasset).

6.	Teinture de badiane	8 grammes.
	— de fèves de Saint-Ignace	2 —

X gouttes à chaque repas.

7.	Teinture de rhubarbe	} āā	10 grammes.
	— de quassia		
	— d'écorces d'oranges amères		

XXX gouttes à chaque repas.

8.	Teinture de colombo	} āā	5 grammes.
	— de quinquina		
	— de gentiane		
	— de rhubarbe		
	— de noix vomique		2 —

XV à XX gouttes dans de l'eau sucrée à chaque repas.

9.	Teinture de Baumé	2 grammes.
	— de noix vomique	5 —
	— de rhubarbe	20 —
	— de gentiane	20 —
	Sirop d'écorces d'oranges amères	100 —

Une cuillerée à café avant chaque repas.

10.	Poudre de noix vomique	0 gr. 05
	— de rhubarbe	0 gr. 20
	Carbonate de chaux	0 gr. 15
	Oléo-saccharure de menthe	0 gr. 20

pour un paquet. Un à chaque repas (Hérard).

11.	Extrait de gentiane	} āā	0 gr. 10
	— de quassia		
	Poudre de gentiane		q. s.

pour une pilule. Deux à chaque repas.

12.	Quassine amorphe	5 à 4 centigrammes.
	Bicarbonat de soude	50 —

pour un cachet, à prendre avant chaque repas (Compardon)

15.	Quassia amara	1 gramme.
	Rhubarbe concassée	25 centigrammes.

pour un paquet; faire macérer ce paquet dans un verre d'eau froide; prendre un verre à bordeaux de la macération, une demi-heure avant le repas.

Citons encore une vieille préparation, l'élixir de Gendrin, qui peut rendre des services :

14.	Eau distillée de menthe	250 grammes.	
	Extrait de cascarrille	} āā	5 —
	— de gentiane		
	— d'absinthe		
	— de myrrhe		
	Fleurs de camomille	6 —	
	Écorces d'oranges amères	10 —	
	Sous-carbonate de potasse	15 —	

Une cuillerée à café dans un peu d'eau, de cinq minutes à un quart d'heure avant le repas.

M. Mathieu est d'avis, contrairement à l'opinion courante, qu'il vaut mieux donner les teintures amères un certain temps après le repas qu'avant le repas.

Chez les anorexiques hypopeptiques, nous donnons après le repas quelques gouttes d'une teinture amère, dans un peu d'eau additionnée de V à VI gouttes d'acide chlorhydrique officinal.

Les ferments digestifs ont constitué pendant longtemps, avec les alcalins et les acides, tout l'arsenal thérapeutique des dyspepsies. Quand Corvisart eut introduit la pepsine en thérapeutique, on fonda sur ce médicament de grandes espérances et on alla jusqu'à dire : « Avec la pepsine maintenant on peut se passer d'estomac ». Aujourd'hui on accorde moins de confiance à ces ferments, parce que l'on a reconnu qu'ils font assez rarement défaut ou bien qu'ils perdent leur activité par suite des transformations qu'ils subissent dans les voies digestives; il convient cependant de les étudier, car ils peuvent être utiles dans l'hyperchlorhydrie (maltine), l'apepsie (pepsine) et dans les cas où la digestion intestinale est insuffisante (pancréatine). On a surtout employé la pepsine et la pancréatine.