

malades. Il est effectivement préférable de laisser les malades au repos et de remplacer les bains par les enveloppements dans le drap mouillé.

VERS INTESTINAUX

Les oxyures siègent à peu près exclusivement dans le rectum, aussi est-il très facile d'en débarrasser rapidement les malades.

On a prescrit en lavement l'eau salée (40 grammes de sel pour 200 grammes d'eau), l'eau savonneuse (2 à 5 grammes de savon pour 200 grammes d'eau), l'huile mentholée (0 gr. 25 de menthol pour 60 d'huile), l'infusion d'absinthe (8 à 10 grammes pour un lavement), de tanaisie (2 grammes pour 500 grammes d'eau), de semen-contrà (2 à 10 grammes par 100 grammes d'eau) ou l'eau mélangée avec égale partie de glycérine; d'autres fois on a recours aux suppositoires d'onguent mercuriel ou de calomel (0 gr. 10 d'onguent mercuriel double ou de calomel pour 2 grammes de beurre de cacao), aux onctions intranales d'onguent napolitain incorporé au glycérolé d'amidon (10 grammes pour 20 grammes); aux moyens locaux il faut joindre l'emploi à l'intérieur des préparations vermicides comme le calomel, la santonine (voir plus loin). La santonine et le calomel seront administrés pendant trois jours consécutifs.

Si l'on ne veut pas employer la santonine, on peut la remplacer par le semen-contrà, qu'on donne en électuaire, avec du miel (1 à 2 grammes par dose) ou infusion :

Semen-contrà	5 grammes.
Faire infuser dans eau bouillante	100 —
Ajouter : sirop	20 —

Le semen-contrà serait d'ailleurs plus actif que la santonine; il renferme, en effet, outre la santonine (2 pour 100), une huile essentielle (8 pour 100) plus anthelminthique que la santonine, tout en étant moins toxique.

On peut encore associer le semen-contrà à la mousse de Corse :

Poudre de semen-contrà	0 gr. 50 — 1 gramme.
Mousse de Corse	5 grammes.
Lait bouillant	100 —
Sucre	q. s.

Quel que soit le médicament adopté, il est utile de maintenir l'enfant à la diète lactée pendant le traitement.

Si les oxyures émigrent le soir et déterminent au niveau de l'anus et du vagin de vives démangeaisons, il sera bon d'enduire pendant quelques jours la marge de l'anus et les lèvres avec une pommade au calomel (5 grammes de calomel pour 50 de vaseline) ou à l'oxyde jaune (0 gr. 50 pour 50 de vaseline).

Les lombrics siègent non plus dans le rectum, mais dans la première portion de l'intestin; ils peuvent émigrer du côté de l'estomac et être rendus par le vomissement, mais ils sont incapables de perforer les parois intestinales, si celles-ci ne sont pas préalablement altérées. Leur traitement est exclusivement

interne. Le calomel donné à la dose de 50 centigrammes à 1 gramme suffit le plus souvent; mais on emploie également la santonine, principe actif du semen-contrà. Elle se donne à la dose de 20 à 30 centigrammes aux adultes, de 5 à 10 centigrammes chez les enfants. En moyenne on doit donner 1 centigramme par année d'âge; on en fait des tablettes contenant chacune 1 centigramme, des pilules, des biscuits, dosés à 5 et 10 centigrammes. Il peut être avantageux d'associer la santonine et le calomel :

Santonine	5 centigrammes.
Calomel	15 —

à prendre dans du miel ou de la confiture (enfant de 5 ans). Prise à trop haute dose, la santonine peut donner lieu à quelques accidents tels que coliques, vomissements, voire la syncope; les objets sont vus en jaune, et les urines présentent une teinte jaunâtre, spéciale. Au-dessous de 2 ans il est préférable de s'en abstenir.

Le principe du traitement des ténias consiste à engourdir ou à tuer les helminthes au moyen d'un vermifuge et à profiter de cet état pour les expulser par une purgation, avant qu'ils n'aient eu le temps de se fixer en un autre point du tube digestif. Quel que soit l'anthelminthique auquel on ait recours, il faut supprimer le repas du soir, la veille du traitement, ou tout au moins recommander au malade de ne prendre que du lait. Il devra de plus prendre un lavement avant de se coucher.

Après avoir absorbé le vermifuge prescrit, le malade gardera le lit afin d'éviter les vertiges, les nausées qui se manifestent parfois et il se présentera à la selle sur un vase plein d'eau tiède, de telle sorte que la masse du ténia, soutenue par le liquide, exercera un moindre tiraillement sur la partie amincie voisine de la tête.

En cas d'insuccès, on recommande de ne pas avoir recours à un nouveau ténifuge avant que des anneaux ne reparassent dans les selles, c'est-à-dire avant trois mois environ.

La liste des anthelminthiques est longue, mais il n'en est en réalité que trois dont on se sert habituellement, contre le ténia inerme, le kouso étant aujourd'hui abandonné, en raison de sa cherté et surtout de sa saveur répugnante, le kamala, en raison de ses effets incertains. Ces trois anthelminthiques sont les graines de citrouille, la fougère mâle, l'écorce de grenadier et la pelletière qui en dérive.

Les graines de citrouille sont surtout usitées chez les enfants qui les prennent très facilement lorsqu'elles sont présentées sous forme de pâte sucrée ou incorporées à un looch; toutefois elles sont bien inférieures en efficacité aux deux autres vermicides. La dose est de 50 à 45 grammes chez l'enfant, de 80 à 100 grammes chez l'adulte.

Semences de courges mondées	q. variable.
Sucre	25 grammes.
Lait	60 —

A prendre en une fois (enfant).

Une heure après le malade prendra de l'huile de ricin.

On peut également administrer du sirop d'éther, avant l'ingestion des graines.