

prescrivant l'*hydrothérapie*, l'*exercice au grand air*, en leur conseillant de porter des bas et des caleçons de laine épais. On doit en outre traiter les lésions chroniques du nez qui sont la cause des récidives : ce sont les végétations adénoïdes dans l'enfance; la rhinite hypertrophique, les déviations de la cloison, chez l'adulte.

Le traitement abortif comporte l'emploi de divers moyens locaux et l'usage à l'intérieur de certains médicaments; il n'a chance de succès que s'il est appliqué, dès le début, à la période où il existe simplement un peu de sécheresse et de chatouillement; si les moyens abortifs échouent au bout de douze heures, on doit les mettre de côté, car ils n'auraient plus d'autre effet que d'augmenter l'intensité du coryza par leur action irritante prolongée.

On a conseillé l'inhalation d'un liquide volatil (Brand) :

Acide phénique.	} āā	5 grammes.
Ammoniaque.		10 —
Alcool à 90°.		15 —
Eau distillée.		

Verser X gouttes de ce mélange sur du papier buvard et en respirer les vapeurs pendant quelques secondes (à répéter toutes les demi-heures).

On a encore utilisé les inhalations de teinture d'iode, de chloroforme pur ou mentholé (1 pour 10), d'alcool mentholé (1 pour 50), d'ichtyol en solution éthéro-alcoolique (Unna) :

Icthyol	} āā	0 gr. 25
Éther.		25 grammes.
Alcool.		

Plus actives sont les nombreuses poudres abortives préconisées; citons entre autres les suivantes :

a) Chlorhydrate de cocaïne	50 centigrammes.
Menthol.	25 —
Salol.	15 grammes.
Acide borique	15 —
b) Salol.	40 grammes.
Acide salicylique.	2 —
Tanin.	1 gramme.
Acide borique.	40 grammes.

Priser une pincée toutes les heures (chez les arthritiques le salol provoque parfois des éruptions eczémateuses).

La douche nasale, à la température de 45 à 50 degrés, donnée au moyen du siphon de Weber, avec 300 ou 400 grammes d'eau salée ou boriquée, serait un moyen abortif puissant, d'après Courtade; mais ce moyen est loin d'être inoffensif.

Le traitement abortif interne n'a qu'une valeur relative. Cependant, chez certains malades, l'*atropine* (2 granules de 1/4 de milligramme) ou la teinture de belladone associée à parties égales avec l'alcoolature de racines d'aconit (XXX gouttes du mélange à prendre en 2 fois) donne de bons résultats.

D'après Ruault, le remède abortif le moins inconstant serait le benzoate de

soude à hautes doses (4 à 6 grammes chez l'enfant; 6 à 10 grammes chez l'adulte).

N'oublions pas de citer un dernier moyen bien connu du vulgaire et consistant à provoquer une sudation abondante par l'ingestion de boissons alcooliques chaudes, le séjour au lit et la révulsion sur les membres inférieurs. On peut encore, pour favoriser la sudation, donner l'acétate d'ammoniaque (6 à 10 grammes) dans du sirop de punch, ou la poudre de Dover (0 gr. 50 à 0 gr. 50).

Si le coryza n'a pu être enrayé, on peut cependant rendre service au malade en instituant un traitement palliatif destiné à atténuer les symptômes les plus pénibles : l'obstruction du nez, la céphalalgie, l'état infectieux.

Pour rétablir, au moins momentanément, la perméabilité nasale, on recommandera avec grand avantage les pulvérisations (avec l'appareil de Richardson) faites toutes les trois heures avec une solution de chlorhydrate de cocaïne à 1 pour 100 ou la projection dans le nez d'huile de vaseline mentholée à 1 pour 20, si la cocaïne détermine de légers incidents d'intoxication; les inhalations d'eau bouillante additionnée par bol de XXX gouttes de :

Menthol	2 grammes.
Alcool à 90°.	40 —

ou bien encore une poudre à priser non irritante :

Chlorhydrate de cocaïne.	50 centigrammes.
Menthol	25 —
Salicylate de bismuth.	} āā 5 grammes.
Sucre de lait	

ou :

Sous-nitrate de bismuth.	} āā 6 grammes.
Benjoin	
Acide borique	} 20 centigrammes.
Menthol	

ou :

Acide borique.	50 grammes.
Acéto-tartrate d'alumine	5 —

ou :

Sous-nitrate de bismuth.	} āā 5 grammes.
Poudre de talc.	
Lactose	} āā 40 centigrammes.
Camphre	

Par contre, il faut interdire absolument les lavages du nez, qui augmentent l'imperméabilité nasale et peuvent provoquer les otites.

Pour remédier à la céphalalgie et au malaise général, on prescrit l'*antipyrine* et la *quinine* associées.

Le contact des sécrétions nasales avec les narines et la lèvre supérieure détermine un érythème que l'on peut prévenir par l'application de la pommade suivante :

Sous-nitrate de bismuth	5 grammes.
Vaseline.	} āā 5 —
Lanoline	