

recouvrir la poitrine d'une couche d'ouate à la suite de cette application) ou bien de *cataplasmes sinapisés* ou d'un *liniment excitant* :

Liniment ammoniacal camphré	60 grammes.
Essence de térébenthine	40 —

L'emplâtre de thapsia, d'un usage si courant, a l'inconvénient de déterminer une éruption pustuleuse qui peut se généraliser par auto-inoculation.

Telle est la médication à employer dans les cas de bronchite légère au début; elle consiste à combattre la fièvre et à modérer la toux à l'aide des préparations calmantes; toute autre médication serait inutile, sinon nuisible: il faut se garder d'administrer à cette période les balsamiques qui contribueraient à augmenter la congestion de la muqueuse bronchique et à rendre la toux plus sèche et plus fatigante.

La seconde période de la bronchite est annoncée par l'apparition des crachats qui consistent en une mousse bronchique abondante (les bronches intéressées étant très riches en glandes en grappe). M. Renault (de Lyon) prescrit à ce moment les médicaments vaso-constricteurs: *seigle ergoté*, *ipéca* :

Julep gommeux ou looch blanc du Codex	125 grammes.
Poudre d'ipéca	50 centigrammes.
Ergotine Bonjean	2 grammes.
Fine champagne	40 —

ou :

Ipéca	2 grammes.
-----------------	------------

Faire infuser dans :

Eau	100 grammes.
---------------	--------------

Réduire à 90, passer et ajouter :

Sirop de polygala	50 grammes.
-----------------------------	-------------

Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

On peut aussi prescrire avec avantage la poudre de *Dover* (0 gr. 40 d'opium brut par 5 grammes) qui contient avec l'opium de l'azotate et du sulfate de potasse et de l'ipéca :

Goudron de Norvège	0 gr. 05
Poudre de Dover	0 gr. 10
— de benjoin	q. s.

F. S. Pour 1 pilule non argentée, 4 à 5 par jour.

La toux étant encore pénible à cette période, on peut ajouter de l'aconit à ces pilules et formuler ainsi :

Goudron	} āā	0 gr. 05
Poudre de Dover		
Extrait de racines d'aconit		0 gr. 005

Pour 1 pilule, 4 à 6 par jour.

Le sirop Désessartz (0 gr. 40 de poudre d'ipéca par cuillerée à soupe) constitue un excellent mode d'emploi de l'ipéca; on peut l'associer aux calmants :

Alcoolature de racine d'aconit	2 grammes.
Eau de laurier-cerise	20 —
Sirop de belladone	40 —
— de codéine	60 —
— Désessartz	q. s. pour 250 cm. c.

Trois cuillerées à soupe par jour.

Si l'expectoration est facile, on doit s'abstenir rigoureusement de l'emploi des antimoniaux.

Si l'expectoration est difficile, plusieurs moyens sont à la disposition du médecin :

Le plus énergique est l'*ipéca* à doses vomitives qu'il ne faut pas hésiter à employer quand les bronches sont encombrées de mucosités que le malade est impuissant à expulser. On prescrit :

Ipéca	1 gr. 50
-----------------	----------

En 3 paquets que l'on prendra de dix minutes en dix minutes dans un peu d'eau tiède.

L'ipéca ne doit jamais être employé chez les vieillards, chez les artério-scléreux et les cardiaques.

Dans les cas où il n'y a pas urgence à provoquer l'évacuation rapide des bronches, on peut prescrire avec discrétion le *kermès* (0 gr. 10 à 0 gr. 20) dont les effets ont été beaucoup trop vantés, mais qui peut cependant exercer une action utile :

Julep gommeux	80 grammes.
Sirop de tolu	} āā 20 —
Alcoolat de mélisse	
Kermès	25 centigrammes.

(BARTH.)

Une cuillerée à entremets de deux en deux heures.

Kermès	0 gr. 02
Gomme ammoniacque	0 gr. 10
Extrait de digitale	0 gr. 01

Pour 1 pilule, 4 à 10 par jour.

On peut encore prescrire le *tartre stibié*, l'*extrait de polygala* en pilules :

Extrait de jusquiame	0 gr. 002
Tartre stibié	0 gr. 001
Poudre de Dover	0 gr. 02

Pour 1 pilule, 8 à 10 par jour.

Poudre d'opium	} āā	0 gr. 005
Kermès		
Extrait de polygala		0 gr. 01

Pour 1 pilule, 2 à 6 par jour.