

Chez les enfants de moins de deux ans, il donne *pro die* 0 gr. 20 à 1 gramme.

Après un an la dose initiale est de 1 gramme, la dose maxima de 5 grammes.

On peut associer l'oxymel scillitique, dont il sera question plus loin, à l'antipyrine et à la belladone :

Antipyrine . . . . .	5 grammes.
Sirop de belladone . . . . .	20 —
Oxymel scillitique . . . . .	} <i>aa</i> 40 —
Sirop de gomme . . . . .	

Une cuillerée à café, 6 fois par jour.

Si l'antipyrine est mal supportée par l'estomac, on peut l'administrer par la voie rectale ; dans ce cas on fait dissoudre la dose dans une très petite quantité d'eau (40 grammes), que l'on injecte dans le rectum à l'aide d'une seringue en caoutchouc durci, à canule assez longue : on peut donner deux fois par jour un lavement de 0 gr. 20 d'antipyrine.

Le bromoforme, proposé et employé depuis quelques années par Stepp (de Nuremberg), Neumann, Lowenthal, est aujourd'hui très en faveur (Charpentier, *Thèse de Paris*, mars 1899). C'est un médicament très actif et qui rend de grands services, mais qui ne peut prétendre à l'infailibilité, pas plus que les précédents.

Stepp a montré que le bromoforme diminue le nombre et l'intensité des quintes, qu'il abrège la durée de la maladie, ce que conteste Neumann ; enfin il préviendrait les infections secondaires. Habituellement le nombre des quintes diminue notablement à la suite de son emploi, et dès le troisième jour on constate une détente manifeste. Le bromoforme est toxique et peut déterminer le coma, quand il est donné à doses excessives ; mais les accidents ne se produisent pas brusquement, et on peut les éviter en cessant le médicament dès que l'on constate une somnolence un peu trop prononcée, la tendance à la cyanose. En somme, c'est un assez bon médicament, qu'il est indiqué d'utiliser dès le début de la coqueluche.

Le bromoforme est un liquide d'une odeur assez agréable, rappelant celle du chloroforme, soluble dans la glycérine, l'huile et l'alcool, mais peu soluble dans l'eau. On peut le faire prendre par gouttes, dans du lait, mais on le fait prendre habituellement dans une potion huileuse ou alcoolisée (XXXVII gouttes pèsent 1 gramme).

Au-dessous de six mois on peut le prescrire à la dose initiale quotidienne de II à III gouttes ; de six mois à un an, à celle de III à IV gouttes. Au-dessous de six ans on donne autant de fois IV gouttes que l'enfant a d'années. Après six ans on donne XX gouttes par jour ; on augmente ensuite de II gouttes par jour (en moyenne ne pas dépasser XXX gouttes par jour).

Marfan prescrit la potion suivante :

Bromoforme . . . . .	7 grammes.
Huile d'amandes douces . . . . .	50 —
Gomme arabique . . . . .	50 —
Sirop de fleurs d'oranger . . . . .	40 —
Eau distillée, q. s. pour faire . . . . .	120 c. c.

Chaque cuillerée à café contient IV gouttes ; on peut encore prescrire la potion suivante, dont une cuillerée à café contient seulement II gouttes :

Bromoforme . . . . .	XLVIII gouttes.
Huile d'amandes douces . . . . .	15 grammes.
Gomme arabique . . . . .	15 grammes.
Sirop d'écorces d'oranges amères . . . . .	15 —
Eau distillée, q. s. pour faire . . . . .	120 c. c.

M. Helouin a proposé les formules suivantes d'élixir au bromoforme, formules qu'il est facile de retenir :

Bromoforme . . . . .	2 grammes.
Alcool . . . . .	50 —
Sirop simple, q. s. pour faire . . . . .	100 c. c.

IV gouttes par cuillerée à café.

ou :

Bromoforme . . . . .	2 grammes.
Alcool . . . . .	50 —
Teinture de belladone . . . . .	} <i>aa</i> XX gouttes.
Alcoolature de racines d'aconit . . . . .	
Sirop de codéine, q. s. pour faire . . . . .	100 c. c.

(Mêmes doses de bromoforme).

L'eau bromoformée saturée contient environ 5 grammes à 5 gr. 50 de bromoforme par litre, soit 0 gr. 50 à 0 gr. 55 pour 100, ou 0 gr. 05 à 0 gr. 06 par cuillerée à bouche. On peut la prescrire comme véhicule du sirop de belladone :

Eau bromoformée . . . . .	100 grammes.
Sirop de belladone . . . . .	20 ou 50 —

Par cuillerées à café.

L'eau bromoformée peut être utile contre les vomissements.

Les bromures sont, d'une façon générale, moins efficaces que les remèdes précédents. Ils conviennent surtout chez les enfants nerveux prédisposés aux convulsions. On peut prescrire :

Bromure de potassium . . . . .	10 grammes.
Sirop d'écorces d'oranges amères . . . . .	200 —

Une à cinq ou six cuillerées à café.

ou :

Bromure de potassium . . . . .	} <i>aa</i> 8 grammes.
Teinture de valériane . . . . .	
Eau distillée . . . . .	250 grammes.
	(VARIOT.)

Jusqu'à 2 ans, trois cuillerées à café ; de deux à cinq ans, trois cuillerées à dessert ; jusqu'à dix ans, trois cuillerées à soupe.

Le chloral est surtout utile comme hypnotique, mais on ne peut en faire un usage habituel ; les doses sont de 0 gr. 15 à 0 gr. 50 suivant l'âge :