

On peut encore prescrire les pilules suivantes :

Sulfate de spartéine	0 gr. 05
Extrait de noix vomique	0 gr. 02
— de chiendent	q. s.

Pour 1 pilule; 2 à 5 par jour.

Ou associér l'extrait de convallaria à la spartéine :

Extrait de convallaria	0 gr. 15
Sulfate de spartéine	0 gr. 05

Pour 1 pilule; 2 à 5 par jour.

On peut enfin associer la caféine à la spartéine :

Eau distillée	50 grammes.
Caféine	1 gr. 50
Salicylate de soude	40 centigrammes.
Sulfate de spartéine	2 grammes.
Acétate d'ammoniaque	

5 cuillerées à café par jour, dans du grog.

En injections hypodermiques la spartéine, s'emploie à la dose de 2 à 5 centigrammes par injection.

La *strychnine* a été parfois employée avec succès, surtout en injections hypodermiques et dans les cas où il existe de la sclérose du myocarde.

La strychnine élève la tension artérielle par suite de son action sur les centres vaso-moteurs et peut-être sur le myocarde. On l'emploie surtout en injections sous-cutanées à la dose de 1 à 5 milligrammes par jour, seule ou associée à la spartéine :

Eau distillée	10 c. c.
Sulfate de spartéine	50 centigrammes.
— de strychnine	1 centigramme.

Injecter 2 à 5 seringues de Pravaz par jour.

Desnos prescrivait la poudre de *noix vomique* à la dose de 5 à 10 centigrammes. L'*ergot de seigle* a été utilisé dans quelques circonstances :

Extrait aqueux d'ergot	10 centigrammes.
Sulfate de quinine	

Pour 1 pilule; 6 par jour;

ou :

Sirop de fleurs d'oranger	200 grammes.
Ergotine	5 —

2 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée contient 50 centigrammes d'ergotine. Donner 2 cuillerées par jour.

On peut encore prescrire, aux mêmes doses :

Sulfate de spartéine	āā	25 centigrammes.
— de strychnine		5 —
Sirop de tola	} āā	50 grammes.
— d'éther		
Eau de menthe		200 —

Bornons-nous à citer l'*adonis vernalis*, le laurier-rose, l'érythrophléine, la coronille qui ne font pas partie de la thérapeutique courante. Quant à la caféine, qui est à la période ultime des cardiopathies ce qu'est la digitale dans la période troublée, nous l'étudierons ultérieurement, ainsi que la théobromine.

II. — Traitement symptomatique.

Nous serons bref sur le traitement des symptômes propres aux lésions valvulaires; tous sont essentiellement justiciables du traitement général, car la digitale, en relevant l'énergie des contractions cardiaques et la tension artérielle, met un terme aux troubles fonctionnels qui dépendent de l'affaiblissement du cœur.

a. — Œdème.

Les hydropisies sont la première conséquence de cet affaiblissement; leur apparition n'implique nullement un pronostic fatal à brève échéance, car il suffit, au début, d'une légère fatigue du cœur pour en provoquer l'apparition, comme d'un repos très court pour les faire disparaître.

Il arrive journellement que l'on observe des malades chez qui les jambes ont enflé, pour la première fois, dix ou quinze ans auparavant.

Lorsque se manifeste un léger œdème des malléoles, que cet œdème survient seulement le soir et n'existe pas le matin, au réveil, le repos est la seule prescription qu'il convienne de faire; encore ne peut-on guère l'imposer aux travailleurs à qui les nécessités de la vie imposent un labeur quotidien. Le repos ne devient une impérieuse nécessité que quand l'œdème devient permanent, envahit les cuisses et les organes génitaux: même, à ce degré plus avancé, l'œdème peut encore céder sous la seule influence du repos au lit; sa disparition est favorisée par le régime lacté qui détermine la diurèse.

G. Sée, s'autorisant des recherches antérieures sur le pouvoir diurétique des sucres, a proposé l'emploi de la lactose comme succédané du lait. On prescrit la lactose en tisane (100 grammes dans 2 litres d'eau).

M. Dieulafoy administre la lactose, à la dose de 50 à 100 grammes par jour, en solution dans l'eau d'Évian ou de Vittel. Si l'on jette simplement la lactose dans l'eau, le malade se plaint du goût désagréable du mélange, ce qui est dû à ce que la lactose se dissout mal à froid; aussi M. Dieulafoy recommande-t-il de dissoudre d'abord la lactose dans une petite quantité d'eau chaude et de verser ensuite la solution dans une bouteille d'eau minérale diurétique. On peut aromatiser le mélange avec quelques gouttes de jus de citron ou 2 ou 3 cuillerées de champagne. On administre, alternativement toutes les heures, une tasse de lait et une tasse de la solution de lactose. L'eau d'Évian lactosée peut servir de