

courbe du poids donne des indications très précises sur l'élimination des chlorures; elle n'est pas rigoureusement en rapport avec la diurèse, mais bien avec l'élimination des chlorures. Quand le poids augmente, on peut être sûr que l'élimination est inférieure à l'ingestion, qu'il y a chlorurémie. La balance seule peut d'ailleurs renseigner sur la chlorurémie, avant que l'anasarque ne puisse être reconnue. A la période du précède, quand les tissus se surchargent en sel et en eau, la balance seule avertit du danger. La pesée journalière est donc le complément indispensable de l'observation clinique.

b. — *Accidents hépatiques.*

Nous sommes conduit à parler de l'ascite cardiaque. Les accidents hépatiques ont été remarquablement étudiés par Hanot qui a créé le mot d'asystolie hépatique. Andral, bien avant lui, avait noté la prédominance dans certains cas et la persistance des désordres hépatiques: « Assez souvent l'engorgement du foie survit aux graves accidents des maladies du cœur ». L'ascite ne survient, le plus souvent, que longtemps après le début de l'œdème des membres, dans les endocardites anciennes; d'autres fois, l'ascite est, au contraire, un symptôme précoce, qui peut se manifester alors qu'il n'existe pas encore d'infiltration des membres inférieurs ou seulement un très léger œdème; dans les cas d'« asystolie hépatique », il ne faut pas hésiter à évacuer le liquide, ce qui permet à la digitale d'exercer son action jusque-là impuissante. On combattra directement la congestion hépatique au moyen d'application de *ventouses scarifiées*.

Il va sans dire que le régime lacté absolu est indispensable.

Le calomel a été préconisé par de nombreux médecins, notamment par Stokes, dans les accidents cardio-hépatiques; il est nécessaire d'en continuer l'usage, à très petites doses (4 à 5 centigrammes), pendant longtemps.

M. Huchard recommande les pilules suivantes :

Extrait aqueux d'ergot de seigle	0 gr. 40
Poudre de scille	0 gr. 07
Calomel	0 gr. 05
Poudre de digitale	0 gr. 02

Pour 1 pilule; 3 à 4 par jour pendant 3 ou 4 jours.

On peut encore prescrire :

Calomel	} aa	5 centigrammes.
Scille		
Scammonée		
Poudre de digitale	}	5 milligrammes.
Podophyllin		

Pour 1 pilule; 4 par jour.

Les alcalins rendent des services dans les cas où les troubles digestifs sont manifestement sous la dépendance de l'état du foie. Le malade peut additionner son lait d'eau de Vichy (Grande-Grille), ou bien, le matin à jeun, prendre un grand verre de cette eau, tiédie au bain-marie.

Aux périodes avancées des cardiopathies ou bien chez les cardiaques alcooliques, goutteux, artério-scléreux, à la congestion simple, sur laquelle ont prise les moyens thérapeutiques, se substitue la sclérose que rien ne peut enrayer. L'iodure de potassium, prescrit dans ce cas, n'a qu'une influence douteuse. Le régime lacté constitue le seul moyen efficace pour retarder les accidents d'insuffisance hépatique qui viennent compliquer la cardiopathie et en précipiter l'issue fatale.

c. — *Troubles nerveux.*

Les troubles nerveux sont sous la dépendance de la congestion du cerveau; ils se traduisent par l'assoupissement, la torpeur ou bien, au contraire, l'insomnie; dans certains cas même, il existe un véritable délire cardiaque.

Les hypnotiques que l'on peut employer contre l'insomnie sont le bromure de potassium, la paralaldéhyde, l'uréthane, le sulfonal.

Les préparations opiacées peuvent être dangereuses, car elles entretiennent l'état congestif; le chloral doit être repoussé, car il exerce une action nuisible sur le cœur; la paralaldéhyde, qui en possède les propriétés utiles, lui sera substituée avec avantage; on peut donner 2 à 3 grammes de ce dernier médicament :

Paralaldéhyde	25 grammes.
Eau	250 —

Donner 2 ou 3 cuillerées de cette solution dans un verre d'eau sucrée, additionnée d'un peu de rhum ou d'eau-de-vie (Dujardin-Beaumetz). Il est nécessaire d'ajouter de l'alcool pour masquer le goût désagréable de la paralaldéhyde.

Le sulfonal, étant insipide en raison de son insolubilité, peut être employé de préférence à la paralaldéhyde. On l'administre en cachets à la dose de 1 gramme. Il est bon de faire prendre au malade, immédiatement après le cachet, une tasse d'infusion aromatique chaude. Pour obtenir un effet hypnotique, à l'heure où le malade s'endort d'habitude, il faut donner le sulfonal au moment du dîner, car ses effets ne se manifestent que tardivement.

d. — *Troubles pulmonaires.*

Contre la congestion pulmonaire on utilise la révulsion. L'ipéca à doses vomitives doit être rejeté, car les efforts de vomissement peuvent déterminer des ruptures vasculaires chez les cardiaques.

Par contre, on peut prescrire la poudre de Dover :

Poudre de Dover	} aa	0 gr. 10
— de scille		
— de noix vomique		

Pour 1 cachet; 4 par jour.

Lorsque la congestion pulmonaire est intense, lorsque le malade a la face cyanosée et que le pouls est à peine perceptible, surtout s'il s'agit d'un sujet jeune, on ne doit pas hésiter à pratiquer une saignée. La digitale n'agit parfois