

et détermine parfois de la dyspepsie et la constipation. Pour remédier à cette dernière, on peut lui associer l'extrait de noix vomique (10 centigrammes pour 100 grammes de sirop), la rhubarbe :

Sirop de sucre	500 grammes.
Extrait de rhubarbe	5 —
Iodure de fer	4 —

2 cuillerées à bouche par jour.

Les pilules doivent être préférées au sirop; mais elles ont l'inconvénient d'être facilement altérables; les pilules du codex renferment 5 centigrammes d'iodure de fer par pilule; toujours pour remédier à la constipation on peut leur associer 20 centigrammes de poudre de rhubarbe ou 2 centigrammes d'extrait, ou bien encore le cascara sagrada :

Iodure de fer	10 centigrammes.
Cascara sagrada	10 —
Extrait de gentiane	5 —

Pour 1 pilule; en prendre 2 à 5 par jour.

Le *protochlorure de fer* a été très vanté par Rabuteau, qui pensait qu'il était immédiatement absorbé en nature; mais nous avons vu que les recherches contemporaines doivent faire plutôt admettre l'absorption du fer sous forme de composé chloro-albumineux. Le protochlorure se donne exclusivement en pilules.

Protochlorure de fer	10 centigrammes.
Extrait de rhubarbe	2 —
Savon médicinal	q. s.

Pour 1 pilule; 2 à 4 par jour.

Le protochlorure est irritant pour l'estomac et inférieur aux autres protosels. Le *lactate de fer* se donne en sirop.

Lactate de fer	5 grammes.
Sirop de gentiane	250 —

2 cuillerées à bouche par jour;

en pilules de 10 centigrammes :

Lactate de fer	0 gr. 10
Aloès	0 gr. 01
Extrait de rhubarbe	q. s.

Pour 1 pilule; 2 à 6 par jour;

en poudre :

Lactate de fer	} āā 0 gr. 50
Poudre de rhubarbe	
— de sucre	

Pour 1 paquet; 1 à chaque repas.

Le *protoxalate* est la préparation ferrugineuse préférée par M. Hayem, qui le prescrit en cachets à la dose de 20 à 40 centigrammes par jour.

Nous prescrivons habituellement :

Protoxalate de fer	0 gr. 05
Extrait de quinquina	0 gr. 10

Pour 1 pilule; 4 à 8 par jour.

Outre les préparations ferrugineuses que nous venons d'énumérer, il en est d'autres encore qui sont très employées, tel est le *tartrate ferrico-potassique*.

Ce sel peut se donner à hautes doses, de 50 centigrammes à 4 grammes, car 50 centigrammes de tartrate ferrico-potassique ne correspondent qu'à 10 centigrammes de fer métallique.

La teinture de Mars, tartarisée, fréquemment utilisée autrefois, est une solution aqueuse au 5^e; elle doit avoir été récemment préparée, sinon elle se trouble par dépôt d'une matière terreuse contenant de l'oxyde de fer. On prescrit le plus habituellement le tartrate en sirop ou en pilules.

Tartrate ferrico-potassique	} āā 0 gr. 05
Extrait de quinquina	
— de rhubarbe	
— de gentiane	
— de noix vomique	5 milligrammes.
Glycérine	q. s.
Huile essentielle d'anis	V gouttes.

(HUCHARD.)

Pour 1 pilule; 2 à chaque repas.

Tartrate ferrico-potassique	0 gr. 01 0/0
Extrait de gentiane	0 gr. 08
— de noix vomique	} āā 5 milligrammes.
— thébaïque	

Pour 1 pilule. Mêmes doses (chlorose avec gastralgie).

Tartrate ferrico-potassique	0 gr. 10
Extrait d'armoise	} āā 0 gr. 04
— d'absinthe	
Poudre d'aloès	0 gr. 02
Huile essentielle d'anis	q. s.

Pour 1 pilule. Mêmes doses (chlorose avec aménorrhée).

Tartrate ferrico-potassique	} āā 0 gr. 10
Ergotine	
Huile essentielle d'anis	

Pour 1 pilule. Mêmes doses (chlorose et ménorrhagie, etc.).

On peut encore prescrire le tartrate de fer et de potasse en sirop :

Tartrate ferrico-potassique	} āā 5 grammes.
Eau distillée	
Sirop de gentiane	} āā 200 grammes.
— d'écorces d'oranges amères	

2 cuillerées à bouche par jour.