

Diagnostic des abcès péri-hystériques.	736
Traitement préventif des abcès péri-hystériques. — Intervention active seulement dans les abcès iliaques.	740
XCVIII. — Nouvelle espèce d'anasarque suite de rétention d'urine.	742
On voit l'anasarque et l'on méconnaît la rétention d'urine. — On méconnaît, à plus forte raison, la relation de causalité entre l'anasarque et la rétention. — La vessie distendue prise pour une tumeur de mauvaise nature. — Accumulation d'urine.	<i>ib.</i>
Anasarque rapidement guérie par l'évacuation de l'urine. — Comment la rétention d'urine peut-elle produire l'anasarque	746
XCIX. — Des reins mobiles.	750
Fréquence de la mobilité des reins. — Raison de cette fréquence dans la faiblesse des moyens de fixité de ces organes. — Fréquence plus grande de la mobilité du rein à droite et chez la femme. — Pourquoi.	<i>ib.</i>
Les reins mobiles ne sont pas toujours douloureux. — Comment ils le deviennent	758
Erreurs de diagnostic multiples. — Moyen de les éviter. — Traitement contentif et protecteur	759
C. — Du relâchement des symphyses du bassin.	762
Accident ordinairement méconnu. — On croit à une affection de la moelle ou de l'utérus. — Difficulté ou impossibilité de la locomotion.	<i>ib.</i>
Marche particulière des malades. — Douleur au niveau des symphyses du bassin. — Marche rendue tout à coup facile par un lien constricteur. — Conditions auxquelles doit satisfaire ce bandage d'ailleurs très-simple.	767
L'état puerpéral peut entraîner la suppuration des articulations du bassin et la mort.	768
CI. — De la percussion.	770
Influence de la philosophie sensualiste sur le mouvement scientifique contemporain et sur les tendances de l'école de Paris. — Pinel et l'histoire naturelle des maladies. — Anatomie pathologique et sémiotique inaugurées par Corvisart. — Découverte de la percussion par Avenbrugger, et de l'auscultation par Laennec. — Succession de travaux en sémiotique. — Percussion immédiate et percussion médiate	<i>ib.</i>
Du plessimètre.	774
Du plessigraphe; manière de s'en servir. — Valeur comparée des divers procédés de percussion	775
Toute la médecine n'est pas dans l'étude des lésions et dans la sémiotique. — Micrographie et nihilisme en thérapeutique. — Nécessité d'associer la précision moderne aux doctrines médicales du passé.	777

FIN DE LA TABLE DU TOME TROISIÈME ET DERNIER.

TABLE ANALYTIQUE.

TABLE ANALYTIQUE

DES

MATIÈRES CONTENUES DANS LES TROIS VOLUMES (1).

ABCÈS multiples dans la variole couflente, 20; dans l'infection purulente puerpérale, III, 634 (*voy.* ces mots); une observation d'abcès développé entre le larynx et l'œsophage dans le cours d'une variole et ayant occasionné la mort, 21; — multiples dans la scarlatine, 115, 120; — pulmonaires dans la pneumonie lobulaire des enfants, 759; — pulmonaires métastatiques, 764; — pulmonaires vomiques, 759 (*voy.* VOMIQUES).

ABCÈS PÉRINÉPHRIQUES, III, 696.

ABSENCES (*voy.* VERTIGES ÉPILEPTIQUES).

ACÉPHALOCYSTES (*voy.* HYDATIDES DU FOIE).

ADDISON (Maladie d'), III, 542; symptômes fondamentaux, adynamie croissante, coloration noire de la peau; symptômes variables, troubles gastro-intestinaux, douleurs lombo-abdominales, III, 548; abaissement de la température, III, 550; rôle possible du grand sympathique, III, 553.

ADÉNIE, III, 568; adénie viscérale (glandes de Peyer), III, 587; ganglions mésentériques, III, 587; — du foie, de la rate, III, 589.

ADÉNOÏDE (Tissu), sa prolifération dans la dothiéntérie, 230; elle expliquerait la leucocytose dans cette affection, 230; sa prolifération dans l'adénie, III, 570, 588; et dans la leucocytémie, III, 561.

ADYNAMIE, 264.

AFFUSIONS FROIDES (Emploi et utilité des) dans la scarlatine, 126.

AGLOBULIE dans la dyspepsie, III, 36.

ALALIE. *Voy.* APHASIE.

ALBUMINURIE, dans la variole, 23; dans la scarlatine, 117; dans la dothiéntérie, 294; dans la diphthérie, 416; dans les maladies du cœur, II, 41; dans l'éclampsie puerpérale, II, 190; dans le diabète sucré, II, 742 et 747.

ALCALINS (le bicarbonate de soude en particulier), d'une utilité fort contestable dans les cas d'angine diphthérique vraie, 446; leur emploi et leur abus dans le diabète sucré, II, 764; leur utilité dans les vertiges dyspeptiques, III, 17; leur emploi dans la colique hépatique liée aux calculs biliaires, III, 240.

ALCOOLIQUES (Emploi des), dans la métrorrhagie, III, 510.

ALCOOLISME (Considérations générales sur l'), II, 358; accidents successifs multiples causés par l'alcool circulant à travers les tissus, III, 364; altération générale des vaisseaux et des parenchymes, III, 372.

ALGIDE (Fièvre pernicieuse), III, 432.

ALIÉNATION MENTALE (Rapports de l'épilepsie avec l'), II, 116; avec la spermatorrhée, II, 705.

ALIMENTATION (Influence d'une mauvaise) sur le rachitisme, III, 485.

ALIMENTATION insuffisante, cause de diarrhée, III, 122.

ALLAITEMENT (artificiel, mixte, natu-

(1) La toison n'est marquée que pour le second et le troisième volume. Le —, dans le cours d'un article, représente le mot en tête de l'article: ainsi, dans l'article ABCÈS, « — multiples dans la scarlatine », signifie « abcès multiples dans la scarlatine ».

rel), III, 143; utilité du pesage avant et après que l'enfant a tété, III, 147.

ALTÉRATION DU SANG dans la diphthérie, 415.

AMÉNORRHÉE, III, 595; son traitement, III, 598 et 600.

AMMONIAQUE (De l'emploi de l'), dans l'asthme, II, 470.

AMNÉSIE dans l'aphasie, II, 684, 687.

ANASARQUE, dans la variole, 23; dans la scarlatine, 147; dans la dothiéntérie, 294; influence des constitutions médicales sur le développement de l'— dans la dothiéntérie, 294; — dans le typhus, 325; — suite de rétention d'urine, III, 742.

ANÉMIE, III, 62; III, 500.

ANESTHÉSIE dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 577; où elle manque quelquefois, II, 587; — dans les névralgies, III, 382.

ANGINE aphtheuse, 336; — *couenneuse commune* (herpès du pharynx), 332; quelquefois difficile à diagnostiquer de l'angine couenneuse diphthérique, 335 et 339; suivant les constitutions médicales, peut se transformer en angine diphthérique, 344; angine couenneuse cantharidique, syphilitique, mercurielle, 333; angine pultacée de la dothiéntérie, 333; angine couenneuse scarlatineuse sans gravité, 111; très-grave quand elle se complique de diphthérie, 112; dans la rougeole, 158; — *diphthérique*, 360; quand elle se propage au larynx constitue le croup (*voy.* les mots **DIPHTHÉRIE** et **CROUP**), 360; — *gangréneuse*, par excès d'inflammation, 343; complication de maladies septiques et graves: dysenterie, dothiéntérie, 343; des angines couenneuses scarlatineuse et diphthérique, 344; — *gangréneuse primitive* telle, 349; — *laryngée œdémateuse*, 561; accident dans les maladies du larynx, 561; causée par la pharyngite catarrhale; par l'érysipèle du pharynx; par l'angine phlegmoneuse; par le phlegmon de la base de la langue; par le cancer de cet organe, 566; par la laryngite aiguë, 567; par la laryngite ulcéreuse aiguë ou chronique non spécifique ou spécifique (comme la laryngite syphilitique, la laryngite cancéreuse, la laryngite tuberculeuse), 568 (*voy.* **PHTHISIE LARYNGÉE**); — dans la variole, 17 et 24; dans la scarlatine 117; dans la dothiéntérie, 300 et 305; exemples de guérison spontanée dans ce cas, 306; chez les jeunes enfants à la suite de

l'ingestion de thé bouillant, 571; traitement de l'angine laryngée œdémateuse, scarifications (procédé de Gordon Buck), 576; trachéotomie, 300, 578; — *pultacée* de la dothiéntérie, 333; — *phlegmoneuse*, 353; son peu de gravité en général, 355; la médecine doit être expectante, 356; — *rhumatisme*, 357; — s'occasionnées par la présence du produit concrété et altéré des sécrétions des amygdales, 358.

ANGINE DE POITRINE (ANGOR PECTORIS), névrose, II, 501; symptomatique d'affections du cœur ou des gros vaisseaux, II, 502; dans ces cas même, les lésions organiques ne sont que l'occasion du développement de la névrose, II, 503; — essentielle, ses causes prédisposantes, 507; liée à la diathèse rhumatismale ou goutteuse, II, 508; elle peut être l'expression de l'épilepsie et constituer alors, soit une variété de névralgie épileptiforme, soit une variété de l'*aura epileptica*, II, 513, et II, 114 (*voy.* **ÉPILEPSIE PARTIELLE**); ses causes occasionnelles et rôle de l'hérédité, II, 512; ses symptômes variables, II, 513; elle peut entraîner la mort subite, II, 516; son diagnostic différentiel d'avec la pleurodynie, les névralgies thoraciques et cervico-brachiales, II, 516; son traitement, II, 517.

ANTIMONIAUX dans la pneumonie franche, 778.

ANTIPHLOGISTIQUE (Médication). *Voy.* SAIGNÉE.

APHASIE, II, 639; passagère (sans paralysie), II, 640; persistante, II, 648; discussion nosologique sur la cause prochaine de l'aphasie, II, 664; l'intelligence n'est pas lésée en proportion de la perte de la parole, II, 676; il y a amnésie, II, 684; amnésie des mots au service de la pensée, II, 688; généralement dans l'aphasie avec hémiplegie, on trouve une lésion matérielle de l'hémisphère cérébral gauche, mais exceptionnellement cette lésion occupe l'hémisphère cérébral droit, II, 667; la lésion est surtout dans un lobe antérieur et du côté gauche, II, 674; cette lésion est le plus souvent un ramollissement, II, 674; valeur diagnostique de l'aphasie dans les cas d'apoplexie, II, 675; aphasie chez les goutteux, II, 642; diagnostic de l'aphasie, II, 691; l'aphasie n'est pas l'alalie des auteurs, II, 691; confusion et erreurs grossières à ce sujet, II, 692.

APHONIE chronique (De la cautérisation du larynx dans certains cas d'), 581; dans quelques cas la simple introduction du laryngoscope a suffi pour guérir l'aphonie, 585; — nerveuse, rôle méconnu du nerf laryngé supérieur, 582; complète par lésion du nerf laryngé inférieur, 582.

APHTHES CONFLUENTS (*aphthæ lactantium*), 484 (*voy.* MUGUET).

APOPLECTIFORMES (Accidents), subits et transitoires liés à l'épilepsie; stupeur apoplectique, II, 81; l'état apoplectique qui s'observe si souvent chez les aliénés paralytiques serait sous la dépendance de l'éclampsie, comme l'état apoplectique qui succède à une attaque de mal comitial est sous la dépendance de l'épilepsie dans la troisième période de l'attaque, II, 95.

APOPLEXIE, II, 49; ne doit pas être confondue avec l'hémorrhagie cérébrale, l'apoplexie séreuse, l'apoplexie nerveuse, II, 52.

APOPLEXIE (Paralysie dans l'), II, 52, 53, 54.

ARSENIC et des préparations arsenicales (Emploi de l'), dans le traitement de la bronchorrhée, 605; dans l'asthme, II, 470 et 474; arsenic à l'intérieur dans le diabète sucré, II, 764; dans la fausse chlorose, III, 500; dans les fièvres palustres, III, 454; dans le rhumatisme nouveau (emploi du bain d'arséniate de soude), III, 382.

ARTÈRE TEMPORALE (Section de l'), dans les névralgies rebelles, II, 408.

ARTÉRIELLE (Oblitération), cause de gangrène, 311.

ASTHME, II, 439; ses attaques nocturnes, II, 440; quelquefois diurnes, II, 441; le coryza (*voy.* ce mot), le catarrhe, un des éléments de l'asthme, en constitue en quelques cas la seule manifestation, II, 442; causes occasionnelles des attaques, leurs variétés, leurs bizarreries, II, 447; influences des milieux, des climats, des saisons, des températures, II, 449; nature de l'asthme, II, 452, asthme symptomatique d'une maladie du cœur ou des gros vaisseaux, II, 452; de l'emphysème pulmonaire qui n'est que consécutif à l'asthme essentiel, II, 456; d'un catarrhe chronique, II, 457; l'asthme essentiel est une névrose diathésique, III, 461; son traitement, II, 468.

ASTHME THYMIQUE, II, 177. *Voy.* CONVULSIONS INTERNES.

ATAXIE en général, 266, 287.

ATAXIE CÉRÉBELLEUSE, II, 601.

ATAXIE LOCOMOTRICE PROGRESSIVE, II, 573; paralysie dans l'—, II, 579, 580, 581, 587, 590; — fruste, II, 588; discussion à propos du sens musculaire de Ch. Bell, et du sentiment d'activité musculaire de Gerdy, II, 591.

ATROPHIE musculaire progressive, II, 619; sa nature, II, 636.

AURA epileptica, II, 411; viscérale, II, 112; diagnostic différentiel avec l'*aura hysterica*, II, 113; *aura intellectuelle*, II, 120.

AVORTEMENT, une des conséquences de la syphilis du fœtus, III, 295.

BAINS ARSÉNIQUÉS, III, 382.

BAINS SINAPISÉS, III, 134.

BALSAMIQUES (Emploi des préparations) à l'intérieur et en inspirations dans le traitement de la bronchorrhée, 603; dans la diphthérie, 449.

BASEDOW (Maladie de). *Voy.* GOÛTRE EXOPHTHALMIQUE et GRAVES (Maladie de).

BASSIN (Relâchement des symphyses du), III, 762.

BELLADONE et atropine dans l'épilepsie, II, 145; dans les névralgies en applications locales, en injections sous-cutanées, II, 394; dans l'asthme, à l'intérieur et en fumigations, II, 468; dans la coqueluche (son mode d'administration à doses croissantes), II, 495; dans l'angine de poitrine, II, 519; dans l'incontinence nocturne de l'urine, II, 721, 725 et 729; dans la spermatorrhée, II, 714; dans la dyspepsie, III, 45; dans la diarrhée, III, 115; dans la constipation, III, 181.

BILIAIRES (Calculs), III, 210, 212; distension de la vésicule à la suite des calculs biliaires, III, 222; kélotomie, III, 226; gravelle, III, 215; *hydropisie de la vésicule* par —, 226; *atrophie de la vésicule* par —, III, 223; *rupture de la vésicule* par —, III, 224.

BILIAIRES (Fistules), III, 224; internes, III, 228.

BILIEUSE (Dothiéntérie), 263.

BILIEUSE (Dysenterie), III, 164.

BLENNORRHAGIE, ses rapports avec les diathèses, 600; — pulmonaire. *Voy.* BRONCHORRHÉE.

BLENNORRHÉE GOUTTEUSE, III, 323.

BOUCHE (Gangrène de la) dans la rougeole, 158.

BOULIMIQUE (Dyspepsie), III, 33.

BRONCHES (Dilatation des), 588; son diagnostic différentiel avec la phthisie tuber-

culeuse, 589; avec la pleurésie, 595; avec la perforation pulmonaire, 595; la fétidité de l'haleine peut en imposer pour l'existence d'une gangrène pulmonaire, 595; le pronostic est sans gravité, sauf dans les cas où l'affection est considérable, 598.

BRONCHITE (dans l'asthme), II, 442; dans la coqueluche, 488.

BRONCHITE capillaire dans la rougeole, 453.

BRONCHITE DIPHTHÉRIQUE, sa fréquence, 373.

BRONCHORRHÉE, 599.

BRONZÉE (Maladie). *Voy.* MALADIE D'ADDISON, III, 542.

BRUIT SKODIQUE, 643. *Voy.* PLEURÉSIE.

BRUITS DU CŒUR, II, 29.

BUBONS dans les maladies pestilentiennes : dans la scarlatine, 114; mésentériques dans la dothiéntérie, 228; dans le typhus, 326; dans la diphthérie maligne, 385; dans l'érysipèle, 179.

BUCCALE (Diphthérie), 406.

BULLEUSE (Éruption de la varicelle), 93.

CACHEXIE exophthalmique (*Voy.* MALADIE DE GRAVES), II, 526.

CACHEXIE palustre (Névralgies dans la), II, 385.

CALCULS biliaires, III, 210 et 212.

CANCER de l'estomac, III, 93; cancer de l'estomac en nappe, III, 94.

CANULE MOBILE après la trachéotomie pratiquée pour le croup, 477.

CARTILAGES (Nécrose des). *Voy.* NÉCROSE.

CATARRHALE (Diarrhée), III, 99; consécutive, III, 105; par indigestion, III, 109.

CATARRHE intestinal dans la diarrhée, III, 99; catarrhe intestinal de la dothiéntérie, sa spécificité, 258.

CATARRHE péripneumonique consécutif à la rougeole (Urtication dans le), 150.

CATARRHE pulmonaire dans l'asthme, II, 442; spécifique dans la coqueluche, II, 480 et 481; dans la goutte, III, 344; dans la dothiéntérie, 260; — morbilieux de la trompe d'Eustache, cause de surdité, dans la rougeole, 143; — pulmonaire au début, 143; — suffocant comme complication, 149; — péripneumonique (bronchite capillaire), d'une excessive gravité, 153; — dans la coqueluche, II, 488.

CATHÉTÉRISME du larynx dans le croup, 461.

CAUSTIQUES (Emploi des) dans l'angine diphthérique, 454; acide chlorhydrique, 457; azotate d'argent, 458; ses inconvénients et les avantages du sulfate de cuivre, 460; caustiques dans le traitement du croup, 460; cautérisation de la plaie après la trachéotomie, 474.

CÉPHALÉES rebelles (Section de l'artère temporale dans les), II, 408.

CÉRÉBELLEUSE (Ataxie), II, 601.

CÉRÉBRAL (Ramollissement), II, 62; l'aphasie indice du —, II, 675.

CÉRÉBRALE (Congestion) dans l'épilepsie et l'éclampsie, consécutive aux attaques, II, 81 et 83; ce qui se passe dans l'attaque d'épilepsie ressemble bien plus aux phénomènes de la syncope qu'à ceux de la congestion cérébrale, II, 81; la même modalité encéphalo-rachidienne qui cause l'attaque épileptique ou éclamptique, l'insultus, l'ictus épileptique, suffit pour produire la stupeur apoplectique qui suit l'attaque, II, 83; congestion consécutive dans les convulsions de l'enfance, II, 183; dans la coqueluche, II, 493. *Voy.* APOPLECTIFORMES (Accidents) et RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL.

CÉRÉBRALE (Fièvre), II, 280; cri hydrocéphalique, II, 295; tache cérébrale ou méningitique (sa valeur dans la méningo-encéphalite), II, 288; son apparition dans la maladie de Graves, II, 541.

CÉRÉBRALE (Hémorrhagie), II, 49; la forme apoplectique proprement dite est rare, II, 53; observation montrant l'apoplexie arrivant graduellement, II, 54; observation d'apoplexie subite, II, 56; ramollissement cérébral, conséquence et non cause de l'hémorrhagie, II, 57; traitement, II, 59; hémorrhagie cérébrale dans l'épilepsie, suite et non cause, II, 97; dans la maladie de Graves, II, 548.

CÉRÉBRO-SPINALE (Forme) de la dothiéntérie, 268.

CERVICO-BRACHIALE (Névralgie), II, 517.

CHALEUR (Influence de la) dans le traitement de la syphilis des enfants nouveau-nés, III, 315.

CHALEUR dans les maladies. *Voy.* TEMPÉRATURE.

CHIMIE (Son rôle en médecine), introduction, XXI et passim, II, 518, 763; III, 49, 50, 239, 353, 359.

CHIRAGRE (*Voy.* GOUTTE), III, 347.

CHLORATE DE POTASSE, s'il est avan-

tageux dans l'angine diphthérique, c'est dans les cas de moyenne intensité, 448.

CHLORHYDRIQUE (Emploi de l'acide) à l'intérieur, dans certaines formes de la dyspepsie, III, 54; principalement dans la dyspepsie liée à la diathèse tuberculeuse, III, 56.

CHLOROFORME (Inhalations de) dans les convulsions de l'enfance, II, 187; dans l'éclampsie des femmes en couches, II, 194; dans la danse de Saint-Guy, II, 249; dans l'asthme, II, 478; dans les névralgies, II, 403; dans les coliques hépatiques, III, 240; en applications topiques dans les névralgies, II, 402; dans la tétanie, II, 213.

CHLOROSE (Névralgies multiples dans la), II, 385.

CHLOROSE ménorrhagique, III, 507.

CHLOROSÉS VRAIE ET FAUSSE, III, 498.

CHOLÉRA INFANTILE, III, 130; diffère du choléra-morbus, III, 131.

CHOLÉSTÉRÉMIE dans la cirrhose, III, 534.

CHORÉES, II, 214, 254 (*chorea saltatoria, festinans*, II, 255); chorées laryngées ou diaphragmatiques, II, 257; *chorea scriptorum* (*Voy.* CRAMPE DES ÉCRIVAINS et SPASMES FONCTIONNELS IDIOPATHIQUES); chorées hystériques, II, 261; chorée de Saint-Guy, II, 217 (*Voy.* DANSE DE SAINT-GUY).

CICATRISATION DES PUSTULES, dans la variole, 12; dans la variole confluente, 20; dans la variole modifiée, 33.

CIRRHOSE DU FOIE, III, 517; est une phlegmasie chronique, III, 520, 522; par maladie du cœur, III, 520; par alcoolisme, II, 367 et III, 522; formes spéciales de — suivant la cause de celle-ci, III, 524; — syphilitique, III, 522, 537; — palustre, III, 523; veines portes accessoires, III, 526; *circulations de compensation* : 1° pariétale, III, 526; 2° dans l'artère hépatique, III, 528; symptomatologie, III, 530; acholie, III, 532; cholestérémie, III, 534.

CLAVELISATION, 38.

COCTION DANS LES MALADIES, XVI.

CŒUR (Affections organiques du), II, 28; albuminurie dans les maladies du, II, 41; théorie des bruits du — : celle de Rouanet seule admissible, II, 29; phénomènes généraux, II, 30; renseignements diagnostiques fournis par le sphygmographe, II, 31; pronostic difficile, II, 35; dans le rhumatisme articulaire, III, 388; dans le rhumatisme noueux,

III, 374; dans la goutte, III, 341; état du cœur dans la maladie de Graves, palpitations, II, 527; hypertrophie, II, 530, 548, 551.

COLALGIE, III, 28.

COLIQUES HÉPATIQUES, III, 210 et 215; causées par des hydatides du foie, III, 257, 261 et 265; douleurs gastralgiques et névralgies intercostale, brachiale, cervicale, II, 379.

COLIQUES DE MISÉRERE. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES.

COLIQUES NÉPHRÉTIQUES, III, 333 et 340.

COLITE dans la rougeole, ne doit pas être confondue avec la dysenterie, 152.

COMATEUSE (Fièvre intermittente pernicieuse), III, 432.

COMPENSATION (Circulation de) dans la cirrhose : 1° pariétale, III, 526; 2° dans l'artère hépatique, III, 528.

COMPRESSEUR DE LA PROSTATE (Emploi du) dans l'incontinence nocturne de l'urine, II, 734; dans la spermatorrhée, II, 716.

CONFLUENTS (Aphthes), 484.

CONGESTION de cause nerveuse dans l'asthme, II, 461; dans la maladie de Graves, II, 556 et 557; ses conséquences matérielles (elles ont pour résultat une exsudation plastique interstitielle, l'hypertrophie et consécutivement l'atrophie des tissus dans lesquels la congestion s'est fréquemment répétée), II, 566.

CONGESTION CÉRÉBRALE (la); coup de sang, II, 52; n'est niée par personne, II, 84; on confond avec elle les vertiges liés à une affection de l'oreille interne, II, 76; les vertiges dyspeptiques, II, 77; dans l'épilepsie et dans l'éclampsie, est consécutive aux attaques, II, 81 et 83; ce qui se passe dans l'attaque d'épilepsie ressemble bien plus aux phénomènes de la syncope, qu'à ceux de la congestion cérébrale, II, 81; la même modalité encéphalo-rachidienne qui cause l'attaque épileptique ou éclamptique, l'insultus, l'ictus épileptique, suffit pour produire la stupeur apoplectique qui suit l'attaque, II, 83.

CONGESTION CÉRÉBRALE CONSÉCUTIVE dans les convulsions de l'enfance, II, 183; dans la coqueluche, II, 493. *Voy.* ACCIDENTS APOPLECTIFORMES.

CONSANGUINS (Mariages), leur fâcheuse influence sur la propagation de l'espèce, II, 134; influence d'un premier mari sur les enfants du second, II, 132.

CONSTIPATION, III, 175; son traitement, 179; la — est le phénomène le plus habituel dans la variole discrète des adultes, 4; la — se montrant quelquefois dans la dothiéntérie, 259; —, le fait ordinaire dans la fièvre cérébrale, II, 293; — cause de dyspepsie, III, 27.

CONSTITUTIONS MÉDICALES (Influence des) sur l'action des médicaments, 780.

CONTAGION, 512; de la variole, 3; de la scarlatine, 99; de la rougeole, 144; de la dothiéntérie, 276; de la diphthérie, 444; de l'érysipèle, 181; de la coqueluche, II, 480.

CONTRACTILITÉ MUSCULAIRE électrique, conservée dans la paralysie faciale de cause cérébrale, éteinte dans la paralysie de Bell, II, 321.

CONTRACTURE consécutive aux paralysies, II, 65; consécutive à la paralysie faciale, II, 326; et spasme de la portion dure de Bell, II, 327.

CONTRACTURE essentielle des extrémités, spasmodique des nourrices, II, 197. *Voy.* TÉTANIE, II, 195.

CONVULSIONS (de l'enfance. *Voy.* ÉCLAMP-SIE DES ENFANTS), II, 162; elles peuvent être protopathiques, essentielles ou symptomatiques, II, 163; deutéropathiques, sympathiques (par action réflexe), II, 167; causes prédisposantes, II, 165; causes occasionnelles, II, 166; dans toute convulsion on distingue trois périodes: une tonique qui ne manque jamais, II, 169; l'autre clonique, II, 170; la troisième, période de stupeur, II, 170; elles sont intermittentes, II, 172; quelquefois cependant elles paraissent continues (*état de mal, status eclampticus*), II, 172; quelquefois elles sont réellement continues, II, 173; convulsion générale, II, 174; convulsions partielles, II, 173; des membres, du tronc, du visage, II, 174; de la langue, des muscles de l'œil, II, 175; convulsions internes, II, 176; convulsion du diaphragme, II, 176; convulsion laryngée (*asthme thymique*), II, 177; accidents consécutifs aux convulsions, II, 170; comment arrive la mort à la suite des convulsions, II, 181; 1° par *asphyxie*, c'est le fait le plus ordinaire, l'asphyxie peut être causée par des accès de suffocation, II, 181; elle peut être causée par l'insuffisance de l'hématose, II, 182; 2° par *syncope*, II, 183; convulsions initiales dans les maladies, II, 184; au début de la variole chez les enfants, 4 et 25; dans la scarlatine 105; dans la

rougeole, 142 et 145; dans la fièvre cérébrale, rares dans la première période, dans la deuxième réapparaissent, et jouent le rôle principal dans la troisième, II, 299; dans la coqueluche, II, 491 et 493; les convulsions terminales de beaucoup plus graves que les convulsions initiales, II, 185; dans la variole, 13 et 23; dans la scarlatine, 138; dans la rougeole, 160; les convulsions des chorées et en particulier de la danse de Saint-Guy, interrompues pendant le sommeil, II, 232; le pronostic varie suivant les causes et suivant les individus, II, 185; traitement, II, 186.

COPAHU dans la diphthérie, 449.

COQUELUCHE, II, 480; pleurésie dans la —, II, 488; — toux convulsive dans la —, II, 482.

CORYZA dans la rougeole, 140 et 155; coryza syphilitique chez les enfants nouveaux-nés, III, 299; coryza, seule manifestation de l'asthme, II, 441.

COUENNEUSE (Angine) commune, 332; quelquefois difficile à diagnostiquer de l'angine couenneuse diphthérique, 335 et 339.

COURBE des températures dans les maladies. *Voy.* TEMPÉRATURE.

COWPOX. *Voy.* VACCINE.

CRACHATS de la rougeole, nummulaires, rappelant ceux des phthisiques, 144; des vomiques, 767; des hydatides des poumons, 755; de la pneumo-hémorragie (apoplexie pulmonaire), 615.

GRAMPE DES ÉCRIVAINS, II, 258. *Voy.* CHORÉES ET SPASMES FONCTIONNELS IDIOPATHIQUES.

CROUP, 365; chez l'adulte, 375; trachéal, laryngé, bronchique, d'emblée, 371; dans la variole, 22; sa propagation aux bronches plus ou moins rapide suivant les épidémies, 365 et 373.

CROUP (Faux) (*Voy.* LARYNGITE STRIDULEUSE), dans la rougeole, 148; le diagnostic différentiel entre le vrai et le faux croup est quelquefois embarrassant, 566.

CROUP (Trachéotomie dans le), 464.

CROUPALE (Toux). Cette expression s'applique bien plus à la toux du faux croup qu'à celle du croup, 367, 558, 567; voix —, 367.

CUBÈBE dans la diphthérie, 449.

CUTANÉES (Affections) et dyspepsie, III, 31; dans la goutte, III, 340; dans la dentition, III, 155; affections — syphilitiques des enfants nouveaux-nés, III, 301; diphthérie —, 398; hé-

morrhagies —, *Voy.* HÉMORRHAGIES; sécrétions — chez les diabétiques, II, 743.

DALTONISME, II, 131.

DANSE DE SAINT-GUY, ce nom préférable à celui de chorée, II, 218; conditions de développement, II, 218; âges (une observation chez une vieille femme), II, 219; rapport du rhumatisme articulaire aigu avec la —, II, 222; — suite de la scarlatine, 114; la — peut précéder le rhumatisme articulaire aigu, II, 223; la —, partielle au début, l'est rarement jusqu'à la fin, II, 227; elle peut se terminer par la mort, qui est la suite d'épuisement nerveux ou de vastes suppurations, II, 233; par les complications du rhumatisme, II, 236; influence des maladies fébriles intercurrentes sur la —, II, 238.

DÉLIRANTE (Fièvre pernicieuse), III, 432.

DÉLIRE: dans la variole discrète normale sans gravité, grave au contraire dans la variole discrète anormale, 13; dans la variole confluente, 19; dans la scarlatine, 109 et 132; dans l'érysipèle de la face, 180; dans la convalescence de la dothiéntérie, 239; dans la pneumonie, 786 et 791; dans la coqueluche, II, 493; conditions qui, dans la marche de l'épilepsie, favorisent le plus la production du délire, II, 129.

DESQUAMATION de la scarlatine, 107; l'élévation de la température à ce moment peut expliquer les accidents parfois redoutables de cette période, 108; dans la rougeole, 144.

DIABÈTE SUCRÉ, II, 733; intermittent, périodique, II, 738; ses caractères, II, 739; la polyurie n'en est pas le caractère essentiel, II, 739; affaiblissement de la vue dans le —, II, 745; albuminurie dans le —, II, 740, 746; influence des affections intercurrentes sur le —, II, 748; physiologie pathologique du —, II, 750; sa cause prochaine, II, 759; son traitement, II, 760.

DIAPHRAGMATIC GOUT, III, 339.

DIAPHRAGME (Convulsion du), II, 173.

DIARRHÉE, III, 99; catarrhale, III, 99; sudorale, III, 101; nerveuse, III, 103; catarrhale consécutive, III, 104; par tonicité exagérée, III, 107; par indigestion, III, 109; traitement de ces diverses espèces, III, 111; — dans la variole confluente au début, sur-

tout chez les enfants, chez lesquels elle remplace la salivation, 14; cessant chez l'adulte vers le 3^e jour de l'invasion de la maladie, c'est un phénomène fâcheux quand il est violent et qu'il persiste le 8^e, 9^e et 10^e jour, 19; son traitement dans ces cas, 27; — dans la scarlatine, 110; dans la rougeole, 142, 152; dans la dothiéntérie, fait habituel, 259; dans la pneumonie, 773; dans la convalescence de la dothiéntérie, 288; dans les maladies du cœur, II, 38; dans la coqueluche, II, 490.

DIARRHÉE CHRONIQUE, III, 119; liée à la tuberculisation, III, 120; syphilitique, III, 123; herpétique, III, 124; dépendant d'une alimentation insuffisante, III, 122.

DIATHÈSES, III, 320; III, 418.

DIGITALE (Emploi de la) dans l'épilepsie, II, 148; dans la maladie de Graves, II, 569.

DILATATION FORCÉE DE L'ANUS, dans le traitement de la fissure à l'anus, III, 191; dans le traitement de la spermatorrhée, II, 719.

DIPHTHÉRIE, 359; maligne, 380; son extrême gravité, elle tue à la façon des maladies septiques, 382, 383, 384; contagion, 414; tentatives impuissantes d'inoculation, 415; — nasale, et sa propagation à la trompe d'Eustache, 386; larmolement causé par l'obstruction du canal nasal et des conduits lacrymaux, 387; la — nasale, d'une excessive gravité, guérit cependant quelquefois spontanément, 388; — bronchique, sa fréquence, 373; — palpébrale, 392; — vaginale, 395; — utérine, 396; — des parties génitales; — vulvaire, préputiale, 396, 397; — cutanée, 398; — buccale, 406; nature de la — 410; on peut la comparer à la variole, en ce sens qu'il existe une — modifiée comme une variole modifiée, 411, 412.

DIPHTHÉRIE (Albuminurie dans la), 416.

DIPHTHÉRIQUE (angine), 360; — (ophtalmie), 392; — (paralyse), 418.

DOIGTS (Déformation hippocratique des), dans la phthisie, 745.

DOTHIÉMENTÉRIE, 226; fièvre typhoïde et autres synonymes, 227; la lésion spécifique est l'éruption furonculaire de l'intestin, 228; lésion des plaques de Peyer et leucocytose, 230; la gravité des symptômes généraux n'est pas en rapport avec l'intensité de l'éruption intestinale, 232; hémorrhagies intestinales