

dans la dothiéntérie, 238; leur pronostic plutôt favorable, 239; catarrhe intestinal spécifique dans la dothiéntérie, 258, 259; élément catarrhal dans cette affection, 260; dégénérescence granuleuse et cirreuse des muscles striés, 245; marche de la température caractéristique, 249, 250, 251; parallélisme entre les lésions intestinales et la marche de la température, 253; taches rosées lenticulaires, leur valeur, 254; miliaire pellucide, 257; taches bleues, 257; formes de la dothiéntérie: muqueuse, 263; bilieuse, 263; inflammatoire, 264; adynamique, 264; ataxique, 266; spinale et cérébro-spinale, 267; maligne, 269; phénomènes intermittents dans la dothiéntérie, 271; conditions du développement de la dothiéntérie, 276; contagion, 276; faits qui la démontrent, 276, 277; âge des sujets, encombrement; acclimatation, 280; traitement, 280; importance du régime, 282; accidents multiples de la convalescence, 288; affaiblissement des facultés intellectuelles, 290; albuminurie, 294; paralysies, 294; accidents de la période d'état ou de déclin, 295; fonte de la cornée, 295; nécrose des cartilages du larynx, 299; des cartilages du nez, 304; eschares et accidents consécutifs, 307; gangrène spontanée des membres, 310; par thrombose artérielle, 312; diagnostic différentiel entre la dothiéntérie compliquée d'accidents cérébraux et la fièvre cérébrale (encéphalo-méningite), souvent des plus embarrassants, II, 297.

DYSENTERIE, III, 159; bilieuse, III, 164; inflammatoire, rhumatismale, III, 164; intermittente, III, 165; lésions, III, 166; traitement, III, 168.

DYSENTÉRIQUE (Fièvre pernicieuse), III, 434.

DYSPEPSIE, III, 19; sympathique des maladies du foie, de l'utérus, etc., III, 27; ses formes: boulimique, III, 33; flatulente, III, 33; acide, III, 34; ces formes se confondent, III, 37; son retentissement sur le système nerveux, III, 35; agglutination dans la dyspepsie, III, 36; la dyspepsie dans le diabète, II, 745; dans la goutte (symptôme prémonitoire de l'attaque), III, 322; liée à l'affection hydatique du foie, III, 253; son traitement des plus variables, III, 38.

DYSPNÉE nerveuse dans la scarlatine, 409; dans le typhus (sa gravité pro-

nostique), 324; dans le croup et accès intermittents de suffocation, 368.

DYSPNÉE symptomatique. *Voy.* ASTHME.

DYSURIE au début de la variole, 5.

EAUX AUX JAMBES (*Grease*) chez le cheval. *Voy.* COWPOX et VACCINE.

ECCHYMOSES SOUS-CUTANÉES, II, 96.

ECHINOCOQUES. *Voy.* HYDATIDES.

ÉCLAMPSIE des enfants (*Voy.* CONVULSIONS); des femmes en couches, II, 189.

ECZÉMA des parties génitales chez les diabétiques, II, 744; eczéma et asthme, II, 442.

EMBOLIES, II, 43; embolie pulmonaire, III, 664; embolie cardiaque, III, 671; anatomie pathologique de l'embolie, III, 685.

EMPHYSÈME PULMONAIRE, vésiculaire et interlobulaire dans la diphthérie, 378, 379; dans l'asthme; plus souvent effet que cause de l'affection pulmonaire, II, 457; dans la coqueluche, II, 489; sous-cutané consécutif et trachéotomie, 471.

EMPIRISME thérapeutique, XXIV.

ENCÉPHALIQUES (Lésions) dans l'épilepsie, II, 97; dans l'éclampsie des enfants, II, 163; dans la fièvre cérébrale, II, 304.

ENCÉPHALO-MÉNINGITE, qu'elle soit ou non tuberculeuse, la maladie affecte les mêmes allures, II, 305.

ENDOCARDITE dans le rhumatisme articulaire aigu, III, 388; dans la scarlatine, 419.

ENDOCARDITE ULCÉREUSE, II, 47; III, 385.

ENFANTS (Convulsions des), II, 162; coryza syphilitique des —, III, 299; croup, 360, 366; syphilis des nouveau-nés, III, 293; sécrétions syphilitiques, III, 302; érysipèle des —, 186; muguet chez les —, 486; pemphigus dans la syphilis du fœtus et de l'enfant nouveau-né, III, 296; tuberculisation pulmonaire, chez les —, 629; variole chez les — 23.

ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES. *Voy.* ADÈNE et BUBONS.

ENTÉRITE et **GASTRO-ENTÉRITE**, III, 404; entérite dans la diphthérie, 378; dans la rougeole, etc. *Voy.* DIARRHÉE et COLITE.

ÉPANCHEMENTS PLEURAUX. *Voy.* PLEURÉSIE et PARACENTÈSE DE LA PLEURIS.

ÉPANCHEMENTS TRAUMATIQUES DE SANG DANS LA PLÈVRE, 735; rapidité

avec laquelle se fait la coagulation du sang épanché, 737; la sérosité sanguinolente en impose quant à la nature du liquide auquel on donne issue, 739; le sang n'est pas irritant pour la plèvre, 741; rapidité avec laquelle il se résorbe, 742.

ÉPILEPSIE. La prétendue congestion cérébrale apoplectiforme, liée beaucoup plus souvent qu'on ne le croit en général à l'épilepsie, II, 78 [*Voy.* APOPLECTIFORMES (Accidents)]; l'épilepsie et l'éclampsie sont des névroses identiques avec elles-mêmes dans leur expression phénoménale et leur cause prochaine, II, 80; la grande attaque d'épilepsie, II, 90; ses synonymes (haut mal, grand mal, etc.), II, 94; l'attaque simulée, II, 90; trois périodes dans l'attaque d'épilepsie: 1^o de convulsions toniques, II, 92; 2^o de convulsions cloniques, II, 93; 3^o de stupeur apoplectique, II, 94; variétés, II, 401; épilepsie partielle, II, 144, 145, 146; angine de poitrine, II, 514; *aura epileptica*, II, 144; névralgie épileptiforme, II, 145 et 150; l'— et l'éclampsie (diagnostic différentiel entre), II, 437; la seconde peut se transformer en la première, II, 440; diagnostic différentiel avec l'hystérie, II, 440; traitement de l'épilepsie, II, 444; rapports de l'épilepsie avec l'aliénation mentale, II, 446 (*Voy.* ÉTAT MENTAL); — symptomatique, II, 80, 142.

EPILEPTICA (*Aura*), II, 144.

EPILEPTIFORME (Névralgie), II, 145, 150.

EPILEPTIQUES (Vertiges), II, 103.

ÉPISTAXIS dans la diphthérie maligne, 389.

ÉRUPTION de la variole; sa marche dans la *variole discrète*; ses caractères varient suivant les différentes parties du corps où elle se fait; est généralement plus abondante dans les parties les plus vasculaires, 6 à 10; dans la *variole confluente*, 15. Dans la variole modifiée, elle se fait comme dans la variole normale jusqu'au moment où, dans celle-ci, les pustules entrent en suppuration; dans la variole modifiée elles sèchent et en général cessent brusquement de se développer, 32; — de la rougeole; ses caractères, 142; rougeole boutonneuse, 143; — *bulleuse* de la *varicelle*, se fait après vingt-quatre heures de fièvre par poussées successives pendant 4 à 5 nychthémères, 93; — de la *scarlatine*; ses caractères, 104; la gravité

de la maladie dans la scarlatine comme dans la variole est en raison directe de l'intensité de l'éruption. Il y a exception à cette règle quand l'éruption est empêchée par quelque grande fluxion antagoniste, par de grandes hémorrhagies, par des perturbations nerveuses profondes, 107.

ÉRUPTIONS CUTANÉES, taches rosées lenticulaires, 228 et 254; miliaire pellucide, 257; taches bleues de la dothiéntérie, 257; éruption furonculaire de l'intestin, 232; — particulières; morbilliformes, scarlatiniformes dans la variole modifiée, 30; morbilliformes, scarlatiniformes, érythémateuses, miliaires, ortiées et pemphigoides dans la diphthérie maligne, 385.

ÉRYSIPELATO-PHLEGMONEUSE (Pneumonie), 784.

ÉRYSIPELE et principalement de l'érysipèle de la face, 174; sa pathogénie, 175; action des causes externes et des causes générales, 176; quelquefois il se développe indépendamment de tout traumatisme, 177; sa gravité suivant les épidémies, 184; contagion de l'—, 181; généralement l'— de la face n'est pas une maladie sérieuse, 184; — ambulante, 180; — des enfants nouveau-nés, manifestation de la fièvre puerpérale, est une maladie presque fatalement mortelle, 186 (et *Voy.* FIÈVRE PUERPÉRALE); traitement de l'— des enfants nouveau-nés par les lotions faites avec une solution de camphre et de tannin dans l'éther, 493; — compliquant la dothiéntérie, survenant consécutivement aux eschares, 308; dans le typhus, 325; *érysipélateuse* (rougeur) dans la diphthérie maligne, 385.

ÉRYTHÈME des fesses et des talons dans le muguet, se produisant sous l'influence des causes qui ont amené celui-ci, 489.

ÉRYTHÈME noueux, 163; douleurs articulaires, 166; — papuleux, 168; accidents thoraciques, 170.

ESTOMAC (Cancer de l'), III, 93; perforation de l'— dans l'ulcère simple, III, 84; ulcère chronique simple de l'—, III, 72, 76; — ulcère simple et cancer de l'—, III, 88.

ÉTAT de mal dans l'épilepsie, II, 404; dans l'éclampsie, II, 73.

ÉTAT mental des épileptiques dans l'inter-valle des accès, II, 148; pendant les attaques, II, 149; après les attaques, II, 121; — des rachitiques, III, 461.

ÉTONNEMENT cérébral, II, 59, 70. *Voy.* STUPEUR APOPLECTIFORME.

ÉTRANGLEMENT interne. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES.

EXANTHÈMES sudoraux, 213; multiplicité de formes; exanthèmes cutanés, muqueux, 214; médicamenteux, 218; chez les individus qui font du pus, chez les femmes en couche, 220, 221; analogie des exanthèmes produits par des virus et de ceux dépendant de maladies diathésiques avec les exanthèmes sudoraux, 222.

EXOPHTHALMIQUE (Goître et cachexie), II, 526. *Voy.* GRAVES (Maladie de).

EXPECTATION en médecine, XX; fondée sur la connaissance de la marche naturelle des maladies (exemples, entre autres, variole, 26; scarlatine, 124; érysipèle, 185; dothiéntérie, 281); — dans la pneumonie franche, 775; c'est elle qui a fait le succès de l'homœopathie.

EXPECTORATION, dans la pneumonie franche, 773; dans les abcès pulmonaires, 767; dans la rougeole, où elle a le caractère de celle de la phthisie, 144; dans les hydatides des poumons, 744 et 755.

FACE (Érysipèle de la), 174.

FACIALE (Paralysie) dépendant d'une hémorrhagie cérébrale, II, 51; — ou paralysie de Ch. Bell (*Voy.* PARALYSIE FACIALE); paralysie double de la face, II, 330.

FACULTÉS intellectuelles (Trouble des) consécutifs à la dothiéntérie, 290; dans l'épilepsie, II, 116; dans la danse de Saint-Guy, II, 230 et 231; dans la dyspepsie, III, 35.

FARADISATION dans la névralgie épileptiforme, II, 161; dans l'angine de poitrine, II, 520.

FER, son inconvénient dans les fausses chloroses, III, 499; dans la maladie de Graves, II, 568; ses avantages dans la chlorose vraie, III, 513.

FESSES (Érythème des) et des talons dans le muguet, 489.

FIÈVRE, d'invasion dans la variole, 4; tombe au moment où l'éruption s'est faite dans la variole discrète, 6; pour revenir au moment de la maturation des pustules, 10; elle persiste dans la variole confluyente en raison de la vive inflammation de la peau couverte de pustules, 13; — initiale dans l'encéphaloméningite, II, 293.

FIÈVRE (Influence de la) sur la danse de Saint-Guy, II, 238; sur la coqueluche, II, 488.

FIÈVRE CÉRÉBRALE, la paralysie dans la; — n'est mobile qu'en apparence, II, 300.

FIÈVRE INTERMITTENTE (Stades dans la) de froid, III, 424; de chaud, III, 425; de sueur, III, 425; — (types des), III, 426; quotidiennes, tierces, quarts (plus grande ténacité de la fièvre quarte); fièvres doublées et redoublées, III, 427; — retardante et anticipante, III, 428.

FIÈVRE MÉNORRHAGIQUE, III, 595.

FIÈVRES PALUSTRES, III, 417; leurs causes, III, 420; *fièvres intermittentes*, III, 419; *fièvres palustres continues*, III, 422; une — peut simuler à son début une fièvre typhoïde et réciproquement, 283, et III, 428; *fièvres palustres pernicieuses*, III, 430; algide, ardente, sudorale ou diaphorétique, III, 431; les *comitæ*: comateuse, délirante, convulsive, III, 432; syncopale, cardiaque, III, 433; hémorrhagique, III, 433; hématomésique, III, 434; péripneumonique ou catarrhale, III, 433; pleurétique, III, 434; cholériforme, dysentérique, III, 434; fièvres intermittentes *subintrantes*, anticipantes, III, 435.

FIÈVRE TYPHOÏDE; sa non-identité avec le typhus, 329 (*Voy.* DOTHIÉNTÉRIE), *fièvre putride hémorrhagique*, 242.

FIÈVRE URticaire, 200.

FISSURE à l'anus, III, 184.

FISTULES biliaires, III, 225; — internes, III, 228.

FOIE (Atrophie jaune aiguë du) dans l'ictère grave, III, 276; état du — dans le diabète sucré, II, 742; hydatides du —, III, 242, 248; maladies du — et diabète, II, 738; coliques hépatiques, III, 210.

FOLIE épileptique, II, 122; petit mal intellectuel, II, 123; grand mal intellectuel, II, 125.

FONTE de la cornée dans la fièvre putride, II, 295.

FRISSON (Le) n'est qu'une convulsion, 145.

FROID (Influence fâcheuse du) dans la scarlatine, 137.

FRONTAL (Lobe), ses délimitations, II, 672; rapports des lésions du lobe — avec l'aphasie, II, 667.

FROTTEMENTS (Bruits de) pleuraux, 644-645.

FURONCULAIRE (Diathèse) dans la variole confluyente, 20.

FURONCLEUSE (Éruption) de l'intestin, 228.

GANGLIONNAIRES (Engorgements), III, 568. *Voy.* ADÉNIE et BUBONS.

GANGRÈNE PULMONAIRE, 635; difficulté du diagnostic, 637; deux espèces, l'une d'elles, bronchite gangréneuse, curable, 638; gangrène consécutive à la pneumonie franche, 636; gangrène pulmonaire chez les diabétiques, 636; suite d'embolie, 636; gangrène des poumons chez les individus affectés de kystes hydatiques du foie, III, 253.

GANGRÈNES spontanées à la suite de la dothiéntérie, 310; conséquence d'une oblitération artérielle, 311; gangrène humide, conséquence d'une oblitération veineuse, 315; dans le typhus, 326; gangrène de la bouche, de la vulve, dans la rougeole, 158; gangrène spontanée chez les diabétiques, II, 746.

GANGRÈNEUSE (Angine) par excès d'inflammation, 343.

GANGRÈNEUSE (Bronchite) curable, 638.

GASTRALGIE, III, 218; — et coliques hépatiques, II, 379.

GASTRIQUE (Hémorrhagie) dans la maladie de Graves, II, 554; troubles — dans la maladie de Graves, II, 554.

GASTRITE chronique, III, 31, 66.

GASTRORRHAGIE dans l'ulcère simple et dans le cancer de l'estomac, III, 87-88.

GASTROTOMIE, III, 192; III, 202.

GÉNITALES (Diphthérie des parties), 395; eczéma des parties génitales chez les diabétiques, II, 744.

GLOSSO-PHARYNGÉE (Paralysie), II, 334.

GLOTTE (Oedème de la). *Voy.* ANGINE LARYNGÉE OEDÉMATEUSE.

GLYCOSE (Réactions chimiques pour découvrir la), II, 741.

GLYCOSURIE, II, 733; passagère, II, 735; symptomatique d'affections cérébrales, II, 736; dans l'épilepsie, dans l'hystérie, II, 736; alternante chez les goutteux, II, 738; dans les maladies du foie, II, 738; chez les femmes enceintes, II, 761; cause prochaine de la —, II, 759; c'est une maladie (*Voy.* DIABÈTE SUCRÉ); c'est un symptôme, II, 760.

GOÏTRE EXOPHTHALMIQUE, II, 526. *Voy.* GRAVES (Maladie de).

GOUTTE, III, 317; valeur de ce mot, III, 321; aiguë régulière, III, 322; attaque, III, 324-325; attaque par série de petits paroxysmes, III, 328; chronique régulière, III, 330; ses conséquences, III,

332; chronique d'emblée, III, 336; — *larvée*, III, 337; anormale et viscérale, III, 340; remontée, III, 344; — viscérale et angine de poitrine, II, 508; — viscérale et aphasie, II, 642, 651; — et gravelle (*Voy.* ce mot), III, 340; — et asthme (*Voy.* ce mot), II, 462; — et migraine (*Voy.* ce mot), II, 462; — et affections cutanées, III, 340; parallèle entre la — et le rhumatisme articulaire aigu, III, 345; le rhumatisme chronique, III, 349; le rhumatisme noueux, III, 351; nature de la goutte, III, 351; traitement, dangers des remèdes prétendus spécifiques, III, 354; troubles sensoriaux dans la —, III, 339; urines dans la —, III, 323; vertiges dans la —, III, 339.

GOUTTEUSE (Métastase), III, 345; ophthalmie —, III, 324.

GRANULEUSE (dégénérescence) et cireuse des muscles striés dans la dothiéntérie, 245.

GRAVELLE urinaire, III, 340; — de la peau dans la goutte, III, 336; — biliaire et goutte, III, 215.

GRAVES (Maladie de), synonymes: goître exophtalmique; cachexie exophtalmique; exophtalmos cachectique; maladie de Basedow, II, 526; ses trois principaux symptômes (triade symptomatique): 1° hypertrophie du corps thyroïde, II, 529; augmentation des vaisseaux, II, 532; accès de suffocation, II, 548; anatomie pathologique du goître, II, 553; 2° l'exophtalmos, II, 527; état des yeux, II, 528; anatomie pathologique, II, 528; 3° les palpitations du cœur, II, 530; hypertrophie, II, 530, 548, 551; anatomie pathologique, II, 551; symptômes secondaires, II, 532; phénomènes nerveux habituels, II, 541; troubles gastriques et intestinaux, III, 754; relations avec les fonctions utérines, II, 547; forme aiguë, II, 542; forme lente et chronique, II, 544; exacerbations, II, 547; la maladie peut être *fruste*, II, 538, 540; fréquence habituelle du pouls et élévation de la température périphérique, II, 540; tache cérébrale, II, 541; nature de la maladie, II, 556; c'est probablement une névrose du grand sympathique, II, 556; faits et arguments à l'appui, II, 559; traitement, II, 565.

GROSSESSE (Glycosurie dans la), II, 761.

GYMNASTIQUE dans la danse de Saint-Guy, II, 242.

HABITUDE (Effets de l'), dans le traitement de la constipation, III, 479.

HALLUCINATIONS dans la chorée, II, 234.

HAUT MAL, II, 94.

HAY FEVER, II, 451.

HÉMATÉMÈSE. *Voy.* CASTORRHAGIE.

HÉMATÉMÉSIE (Fièvre), III, 434.

HÉMATOCÈLE PELVIENNE, III, 604; ovarienne et cataméniale, III, 606; cachectique, III, 607; par atrophie des organes génitaux externes, III, 612.

HÉMATURIE dans la variole, 24; dans la fièvre putride hémorrhagique. *Voy.* ce mot.

HÉMIPLÉGIE (La paralysie du membre inférieur dans l') cède en général plus promptement que celle du membre supérieur; le contraire est d'un mauvais augure, II, 64.

HÉMIPLÉGIE ALTERNE, II, 344; le plus souvent sous la dépendance d'une lésion de la protubérance annulaire, elle n'en est pas le signe absolu, II, 343 et 346.

HÉMOPTYSIE, 606; supplémentaire, 607; le diagnostic entre l'— symptomatique de la phthisie pulmonaire et l'— symptomatique de l'apoplexie pulmonaire loin d'être simple, 611; diagnostic avec les hématomésés, 617; — par les hydatides du poumon, 753.

HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALE ne doit pas être confondue avec l'apoplexie, II, 52; la forme apoplectique proprement dite est rare, II, 53; observation montrant l'apoplexie arrivant graduellement, II, 54; observation d'apoplexie subite, II, 56; ramollissement cérébral, conséquence et non cause de l'hémorrhagie, II, 57 et 63; traitement, II, 59; hémorrhagie cérébrale dans l'épilepsie, suite et non cause, II, 97.

HÉMORRHAGIES intestinales dans la dothiéntérie, 238; leur peu de gravité, 239; elles sont indépendantes des ulcérations, 243; — méningées, cérébrales, II, 548; dans l'alcoolisme, II, 374; — intestinales, gastriques, pulmonaires, dans la maladie de Graves, II, 554; — intestinales essentielles, III, 84 (*Voy.* MELÈNA); les — par le fait de la trachéotomie dans la maladie de Graves peuvent être mortelles, II, 574; — traumatiques dans l'épilepsie, II, 93; ecchymoses sous-cutanées, II, 96; — dans la coqueluche, par la bouche, par les yeux, II, 491; — par les membranes muqueuses sous-cutanées, par l'oreille,

II, 492; — dans la variole (*Voy.* VARIÈLES NOIRES); dans la scarlatine, 110, 116; dans la rougeole, 143; épistaxis, 151; *purpura*, 158; dans la diphthérie, 389; dans la dyspepsie (*purpura*), III, 36; — cutanées dans la dothiéntérie (*Voy.* PÉTÉCHIES), 257.

HÉMORRHAGIQUES (Pleurésies); 707.

HÉMORRHÔIDES et goutte, III, 340.

HÉPATALGIE à propos des coliques biliaires, III, 218, 220.

HÉPATIQUES (Coliques), III, 210, 215; les vers intestinaux, cause de —, III, 220. — causées par des hydatides du foie, III, 227, 264; — à propos des névralgies, II, 379.

HÉPATITE AIGUE à propos des coliques biliaires, III, 220, 222; à propos des kystes hydatiques du foie, III, 254; dans la goutte, III, 323; hépatite chronique dans la goutte, III, 344.

HÉRÉDITÉ, cause prédisposante de l'épilepsie, II, 429; des convulsions de l'enfance, II, 465; de la danse de Saint-Guy, II, 221; de l'asthme, II, 466; de l'ataxie locomotrice progressive, II, 582; de l'ataxie musculaire progressive, II, 636; du rachitisme et de l'ostéomalacie, III, 486; des calculs biliaires, III, 214; de la goutte, III, 320, etc.

HERPÈS des lèvres, des narines, du visage dans la pneumonie, 773.

HERPÈS du pharynx. *Voy.* ANGINES COUENNEUSES COMMUNES.

HERPES zoster, 205. *Voy.* ZONA.

HERPÉTIQUE (Ozène), 544.

HYDATIDES du foie, cause de colique hépatique, III, 219, 257; — leur histoire, III, 242; — du poumon, 743.

HYDATIQUE (Frémissement), III, 252.

HYDROPIE dans la convalescence de la dothiéntérie, dans la scarlatine (*Voy.* ANASARQUE); hydropisie de poitrine, 642.

HYDROTHERAPIE dans la maladie de Graves, II, 570; dans la spermatorrhée, II, 716; dans le diabète, II, 764; dans la dyspepsie, III, 52, etc.

HYPERESTHÉSIE CUTANÉE au niveau des points d'expansion terminale des nerfs, dans les névralgies, II, 380.

HYSTERICA (*Aura*), II, 143 et 144.

HYSTÉRIE (Diagnostic différentiel de l') avec l'épilepsie, II, 144.

HYSTÉRIQUES (Chorées), II, 261; — (Toux), II, 264; influence du changement de lieu, II, 267.

ICTÈRE dans la colique hépatique, III,

212, III, 216 et suiv.; dans les kystes hydatiques du foie, III, 253; — grave, III, 271; — hémorrhagique, malin ou typhoïde, III, 272; l'atrophie jaune aiguë du foie n'en est pas la lésion indispensable, III, 273, 283; destruction de la cellule hépatique, III, 282; hémorrhagies multiples, III, 279; — grave des nouveau-nés, III, 286; leucine et tyrosine dans l'urine par le fait de l'— grave, II, 278; état du foie dans l'— grave, III, 279; nature de l'— grave, III, 289.

ILÉUS. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES.

IMPUISSANCE, ses rapports avec la spermatorrhée, II, 700, 743.

IMPULSIONS SOUDAINES ET IRRÉSISTIBLES chez les épileptiques principalement, et conséquences à en tirer au point de vue médico-légal, II, 70, 74, 121.

INCITABILITÉ MUSCULAIRE (Perte de l'), II, 273, III, 26.

INCONTINENCE NOCTURNE de l'urine, II, 720; dans la spermatorrhée, II, 705; rapports de l'incontinence de l'urine avec la spermatorrhée et d'autres névroses, II, 705; dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 578; dans l'épilepsie, II, 95.

INCUBATION de la variole: sa durée démontrée par l'expérimentation (inoculation) est en général de 8 à 11 jours, 3; dans la varicelle, de 15 à 17 jours, 96; dans la scarlatine ne peut être rigoureusement fixée, 99, 100; semble pouvoir ne durer que vingt-quatre heures, 100; phénomènes qui la caractérisent, 102; fièvre vive, accidents nerveux, 103.

INDUCTION (La méthode d') d'une bien autre valeur que la méthode numérique, XLIV.

INFECTION PURULENTE, III, 628; puerpérale, III, 622; infection purulente dans la variole confluente; 22; dans la dothiéntérie, 309; par otite suppurée dans la rougeole, 156; dans le typhus, 325; dans l'affection hydatique du foie, III, 254.

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES d'atropine et de morphine dans le traitement des névralgies, II, 398; procédé de M. Lafargue (de Saint-Emilion), 402.

INOCULATION VARIOLIQUE, 36.

INTELLECTUELLE (*Aura*), II, 120.

INTERMITTENCE, III, 423; — des névralgies, II, 386; liées même à des lésions constantes, II, 386.

INTERMITTENTES (Fièvres). *Voy.* FIÈVRES PALUSTRES, III, 417.

INTERMITTENTES (Névroses), toux, migraine, hoquets, insomnies, flux périodiques, muqueux, façons d'être des fièvres intermittentes palustres, III, 441.

INTESTINAL (Catarrhe); cause de diarrhée, III, 98; de la dothiéntérie, 258.

INTESTINALES (Hémorrhagies) dans la dothiéntérie, 238; occlusions —, III, 192; perforations — dans la dothiéntérie, 232.

INTESTINAUX (Troubles) dans la maladie de Graves, II, 554; vers — causes de convulsions; II, 469; de toux spasmodique, II, 266; de coliques hépatiques, III, 220.

INVAGINATION. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES, III, 492.

INVASION (Période d') dans la variole, ses caractères, 3; sa durée ordinaire dans la variole discrète et dans la variole confluente, 5; d'autant plus prolongée que la maladie moins sérieuse, 54; sa durée dans la rougeole, 144; sans limites régulières dans la scarlatine, bien qu'ordinairement très-courte, 101.

IODE, ses mauvais effets dans la maladie de Graves, II, 565; son utilité dans le rhumatisme nouveau, III, 383.

IPÉCACUANHA à doses vomitives dans l'hémoptysie, 619; dans la dysenterie, III, 171.

IRRIGATION dans l'angine diphthérique, 457.

ISCHIAGRE. *Voy.* GOUTTE.

IVROGNES (Pneumonie des), 788.

KÉLOTOMIE dans le traitement chirurgical des calculs biliaires, III, 226.

KERMÈS dans la pneumonie, 780; manière de l'administrer, 783.

KYSTES hydatiques du foie, cause de coliques hépatiques, III, 220; leur histoire, III, 242; — de la surface convexe du foie, III, 259; traitement chirurgical, III, 266; ponction simple, III, 267; ponction avec le trocart capillaire, III, 267; incision par couches (procédé Bégin), III, 269; incision après l'application préalable de caustiques (procédé Récamier), III, 269; incision après acupuncture, III, 270; injections iodées, III, 270.

LACTATION, causes qui l'influencent, III, 444.

LARVÉE (Goutte), III, 337.

LARVÉES (Fièvres), III, 440.

LARYNGÉE (Angine) couenneuse dans la variole, 22.

LARYNGÉE (Angine) œdémateuse, 561.
LARYNGÉE (Convulsion), asthme thymique, II, 177.
LARYNGÉE (Phthisie), 567.
LARYNGITE STRIDULEUSE (faux croup), 551; a quelquefois entraîné la mort, 555; diagnostic différentiel du vrai et du faux croup, 556; quelquefois embarrassant, 557; survient généralement la nuit, 557; la toux a un caractère spécial, 557.
LARYNGITE ULCÉREUSE syphilitique et tuberculeuse, et diagnostic différentiel, 579.
LARYNGOSCOPE (Emploi du) dans l'aphonie, 581.
LARYNGO-TRACHÉAL (Sifflement), dans la coqueluche, II, 482, 484.
LARYNX (Cathélérisme du) dans le croup, 461.
LEUCINE dans l'urine, dans le cas d'ictère grave, III, 278.
LEUCOCYTHÉMIE, III, 555; splénique, III, 558; lymphatique, III, 559; anatomie pathologique, III, 560; hyperplasie du tissu propre de l'organe nécessaire dans la leucocythémie, III, 561; symptômes, III, 564.
LEUCOCYTOSE, dans la fièvre typhoïde, 230; théorie de Virchow, 230.
LÈVRES (Herpès des) dans la pneumonie, 773.
LOCOMOTRICE (Ataxie) progressive, II, 573. *Voy.* ATAXIE LOCOMOTRICE.
MAL (Haut). *Voy.* ÉPILEPSIE.
MALIGNITÉ, 269, 787; III, 465; III, 431.
MARIAGES consanguins, leur influence fâcheuse sur la propagation de l'espèce, II, 434; influence d'un premier mari sur les enfants du second, II, 432; influence des — sur la surdi-mutité, II, 435.
MÉDECINE (La) un art bien plus qu'une science, XLVII à LI.
MELÈNA, III, 85.
MÉNINGÉES (Hémorragies), II, 481.
MÉNORRHAGIQUE (Chlorose), III, 507; fièvre —, III, 595.
MERCURIAUX (Les) utiles dans le traitement de la diphthérie à titre de modificateurs topiques, 446.
MÉSÉNTÉRIQUES (Ganglions), leur altération dans l'adénie, III, 587.
MÉTASTASES gouteuses, III, 345. (*Voy.* ASTHME et MIGRAINE) — des oreillons sur l'appareil génital; 196; — de certaines affections des organes génitaux sur la parotide, 198.

MÉTHODES en médecine; méthode numérique et méthode d'induction, XXXIX.
MICROSCOPE. Son utilité souvent exagérée, III, 555.
MIGRAINE, II, 462; III, 338; III, 442.
MILIAIRE dans la scarlatine, 105; dans la dothiéntérie, 257. *Voy.* aussi EXANTHÈMES SUDORAUX.
MILIAIRES (Tubercules), 623.
MORT à la suite d'hémorragies par la trachéotomie dans la maladie de Graves, II, 574.
MORT à la suite de convulsions: 1° par asphyxie, II, 181; 2° par syncope, II, 183.
MORT SUBITE dans l'angine de poitrine, II, 516.
MUGUET, 483; chez l'adulte, 485; chez l'enfant, 486; causes, affection locale, 487; muguet mixte, 488.
MUQUEUSES (Affections des membranes) dans la syphilis des enfants nouveau-nés, III, 299.
MUQUEUSES (Membranes), hémorragies par les — dans la coqueluche, II, 491.
MUSC dans le traitement de la pneumonie avec délire, 786.
MUSCLES, leur altération spéciale dans la dothiéntérie, 245.
MUSCULAIRE (Atrophie) progressive, II, 619; — (contractilité) électrique conservée dans la paralysie faciale de cause cérébrale, éteinte dans la paralysie de Bell, II, 321; — (perte de l'incitabilité), II, 273; III, 26; — (sens) de Ch. Bell, II, 591; sentiment d'activité — de Gerdy, II, 591.
NARINES (Herpès des) dans la pneumonie, 773.
NASALE (Diphthérie), 386.
NATURE MÉDICATRICE, son rôle dans les maladies, XVIII.
NÉCROSE DES CARTILAGES du larynx dans la dothiéntérie, 299; accidents d'œdème de la glotte consécutif, 300; — de la cloison du nez, 304.
NÉPHRÉTIQUES (Coliques), III, 333, 340.
NERVEUSE (Apoplexie), II, 52.
NERVEUSE (Diarrhée), III, 105.
NERVEUSES (Affections); leurs transformations les unes dans les autres, II, 131; II, 582; expressions de diathèses très-différentes, telles que la diathèse tuberculeuse (exemples, Pastiche, II, 465; la dyspepsie, III, 53).
NÉVRALGIE épileptiforme, II, 115; II, 150; l'angine de poitrine en est une forme, II, 114; II, 511; son traitement:

impuissance des moyens chirurgicaux, II, 156; bons effets de l'opium, II, 158; de la faradisation superficielle, II, 161.
NÉVRALGIE solaire, III, 443.
NÉVRALGIES, II, 376; ordinairement symptomatiques, II, 379; hyperesthésie cutanée au niveau des points d'expansion terminale des nerfs, II, 380; points douloureux dans les névralgies, II, 382; point apophysaire, II, 383; point d'expansion terminale, II, 384, 385; névralgies multiples dans la chlorose, II, 385; — ophthalmique dans la cachexie palustre, II, 385; — occipitale et sciatique dans le rhumatisme, II, 385; — dans la sphère d'irritation et de douleur autour de l'accident local des diathèses syphilitique et cancéreuse, II, 386; traitement des —, II, 392; — rebelles à la suite du zona, 210; — palustres (*Voy.* FIÈVRES LARVÉES), III, 440; — rhumatismales, leurs manifestations multiples, II, 388; alternent souvent avec les douleurs articulaires, II, 389; avantageusement traitées par les médications irritantes locales, II, 406; par le sulfate de quinine, II, 404; l'iodure de potassium, II, 404; — solaire, III, 443; — syphilitiques diffèrent des douleurs produites par les exostoses, II, 390; — thoracique et cervico-brachiale, II, 517.
NÉVROSES périodiques, peuvent être des formes de fièvres palustres larvées (toux spasmodiques, migraine, hoquet, insomnies), III, 441.
NITRATE D'ARGENT, dans l'épilepsie, II, 147; dans la diarrhée, III, 116; dans la dysenterie, III, 172.
NOMENCLATURE et **NOSOLOGIE**, XXXI; inutilité en clinique, XXXIV; nécessité de conserver aux maladies leurs noms anciens, sans signification nosologique, et pourquoi, XXX.
NOUEUX (Érythème), 163; — (rhumatisme), III, 351, 364.
NOURRICE (Choix d'une), III, 144.
OCCLUSIONS INTESTINALES, III, 192; causes, III, 196; symptômes, III, 199; traitement, III, 200; ponction abdominale, III, 201; gastrotomie, III, 202.
OCULO-PUPILLAIRES (Phénomènes) dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 580 et 616. *Voy.* VISION (Troubles de la) et YEUX (État des).
ŒDÈME DE LA GLOTTE. *Voy.* ANGINE LARYNGÉE ŒDÉMATEUSE.
OIDIUM ALBIGANS. *Voy.* MUGUET.
OMBILICATION (L') des pustules varioli-

ques n'a pas la valeur qu'on lui attribue, 8.
OPHTHALMIE exanthémateuse dans la rougeole, 155; ophthalmie diphthérique, 387; ophthalmie gouteuse, III, 324.
OPHTHALMOSCOPIE, son utilité dans quelques maladies cérébrales, II, 300-302.
OPIUM dans la névralgie épileptiforme, II, 158; dans la danse de Saint-Guy, II, 249; peut être donné à doses énormes, II, 251; cas où il est indiqué dans la coqueluche, II, 499; dans la dyspepsie, III, 45; dans la diarrhée, III, 145, 147; dans la dysenterie, III, 173.
OREILLE (Hémorragies par l'), II, 492.
OREILLONS, 194.
OSTÉOMALACIE (rachitis des adultes), III, 486.
OTITE dans la rougeole, 151; peut entraîner l'infection purulente, 156; — grave entraînant la paralysie faciale, II, 322.
OURLET. *Voy.* OREILLONS.
OVARITE varioleuse, 11.
OXYGÈNE (Inhalations d') dans la dyspepsie liée à l'anémie, III, 64.
OZÈNE, 540; constitutionnel, 541; herpétique, 544; syphilitique, 544; traitement et nécessité d'y insister longtemps, 546.
PALPÉBRALE (Diphthérie), 392.
PALUSTRES (Fièvres), III, 417. *Voy.* FIÈVRES INTERMITTENTES et FIÈVRES PALUSTRES; — (névralgies). *Voy.* FIÈVRES LARVÉES, III, 440.
PAPULEUX (Érythème), 168.
PARAGENTÈSE DU PÉRICARDE. *Voy.* PÉRICARDE.
PARAGENTÈSE DE LA POITRINE. *Voy.* POITRINE.
PARALYSIE dans l'apoplexie, II, 51, 52, 53; — du membre inférieur généralement moins persistante que celle du membre supérieur, valeur pronostique du contraire, II, 65; — dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 579, 580, 581, 585; — de la sensibilité, II, 586; — dans la danse de Saint-Guy, II, 229; — à la suite de l'attaque d'épilepsie, II, 98; — dans la fièvre cérébrale n'est mobile qu'en apparence, II, 300.
PARALYSIE DIPHTHÉRIQUE, 418; paralysie du voile du palais consécutive à une diphthérie cutanée, 430; forme bénigne, 429; mort possible par asphyxie, 435; forme grave, 436; sa nature, 441; traitement, 443.