

**PARALYSIE DOUBLE** de la face, II, 330.  
**PARALYSIE FACIALE**, symptomatique d'une hémorrhagie cérébrale, moins complète que par affection de la septième paire, II, 50; le muscle orbiculaire n'est jamais complètement paralysé dans l'hémorrhagie cérébrale, II, 324; la contractilité musculaire électrique est conservée dans cette affection et ne l'est pas dans la lésion de la septième paire, II, 324; — de Ch. Bell, II, 317; ses causes, II, 319; ses symptômes, II, 323; perversion du goût, II, 325; conservation de la sensibilité tactile et même, en quelques cas, douleurs dans les parties affectées, II, 326; la paralysie exclusivement faciale peut être la conséquence d'une hémorrhagie cérébrale, II, 320; peut dépendre d'une olite, II, 322; traitement de la paralysie faciale, II, 329.  
**PARALYSIE LABIO-GLOSSO-LARYNGÉE**, II, 334; ses symptômes, II, 337; ses lésions, II, 342, 343.  
**PARALYSIS AGITANS**, II, 269; n'est pas une paralysie au moins à son début, II, 273; la sclérose du bulbe et de la protubérance n'est pas constante, II, 278.  
**PARAPLÉGIE**, au début de la variole, passagère, quelquefois persiste ou revient dans la convalescence, 5; dans la convalescence de la dothiéntérie, 291; au début, 293; dans le typhus, 325; — réflexe à la suite de coliques hépatiques graves, III, 233.  
**PAROTIDES** comme signes pronostiques dans la dothiéntérie, 270; dans le typhus, 326; dans la dysenterie, III, 166.  
**PEMPHIGUS** dans la syphilis du fœtus et de l'enfant nouveau-né, III, 296.  
**PERCHLORURE DE FER** dans l'angine diphthérique, 463.  
**PERCUSSION**, III, 770; découverte par Avenbrugger, III, 772; son procédé, III, 773; procédé de Corvisart, moins parfait, III, 774; plessigraphe, II, 776; plessimètre, III, 774.  
**PERFORATIONS** intestinales dans la dothiéntérie, 232; possibilité de leur guérison, 237.  
**PÉRICARDE** (Paracentèse du), II, 1; observations, II, 4-19; aperçu historique, II, 10; innocuité de la ponction et des injections iodées, II, 19; l'opération doit être faite de préférence avec le bistouri, son lieu d'élection, II, 24.  
**PÉRICARDITE** scarlatineuse, 119.  
**PÉRINÉPHRIQUES** (Abscess), III, 696; considérations anatomiques, III, 699; cau-

ses, III, 700; migration possible du pus, III, 705; symptômes, III, 713; traitement, III, 721.  
**PÉRIPNEUMONIQUE** (Catarrhe), dans la rougeole, 153.  
**PÉRIPNEUMONIQUE** (Fièvre pernicieuse) ou catarrhale, III, 433.  
**PÉRIPNEUMONIQUES** (Abscess), 758. *Voy.* VOMIQUES PÉRIPNEUMONIQUES.  
**PÉRITONITES** sans perforation dans la dothiéntérie, 233; leur pathogénie, 237.  
**PERNICIEUSES** (Fièvres), III, 430.  
**PERTES SÉMINALES**. *Voy.* SPERMATORRÉE.  
**PÉTÉCHIES** dans la dothiéntérie, 257; dans le typhus (éruption mûricolore) (*mulberry rash*), 321.  
**PEYER** (Glandes de) dans l'adénie, III, 587; leur lésion caractéristique dans la dothiéntérie, 228; parallélisme entre leur lésion et la marche de la température dans la dothiéntérie, 253.  
**PHARYNX** (Herpès du), 334.  
**PHLEGMATIA ALBA DOLENS** dans la dothiéntérie, 295; dans le typhus, 325; — et phlébite oblitérante, III, 652.  
**PHLEGMONEUSE** (Angine), 353.  
**PHLEGMONS** péri-hystériques, III, 723; considérations anatomiques, III, 723; causes, III, 725; pelvi-péritonite, III, 732; sa différence d'avec le phlegmon péri-hystérique, III, 734; traitement, III, 739.  
**PHTHISIE** consécutive à la rougeole, 156; à la coqueluche, II, 489; au diabète sucré, II, 748.  
**PHTHISIE DYSPEPTIQUE**, III, 37.  
**PHTHISIE LARYNGÉE**, 567.  
**PHTHISIE PULMONAIRE**, 624; phthisie rapide (c'est la phthisie ordinaire marchant rapidement), 622; phthisie aiguë ou galopante, 623; deux formes: 1° catarrhale, 626; 2° typhoïde, 627.  
**PHTHISURIE**, II, 733, 741.  
**PIGMENTISATION** (Théorie de Frerichs sur la) dans les fièvres intermittentes pernicieuses, III, 435; sa réfutation, III, 437.  
**PILULES** (Formule de) anti diarrhéiques, III, 113, 129.  
**PITUITÉ** (Vomissements de) dans la dyspepsie, III, 31, 70.  
**PLAQUES DE PEYER**. *Voy.* PEYER (Glandes de).  
**PLESSIGRAPHE**, III, 776. *Voy.* PERCUSSION.  
**PLESSIMÈTRE**, III, 774. *Voy.* PERCUSSION.

**PLEURAUX** (Bruits de frottements), 644, 645.  
**PLEURÉSIE**, 642; bruit skodique, 643; interprétation des bruits de frottement (râles crépitants de la pleurésie), 644, 645; persistance du souffle dans les épanchements excessifs, 645; souffle et voix amphoriques, 646; leur explication, 646; fluctuation intercostale, 652; difficulté du diagnostic entre certains cas de pleurésie chronique et la tuberculisation pulmonaire, 648; pleurésie purulente dans la scarlatine, 118, 122; pleurésie dans la coqueluche, II, 488; pleurésies suppuratives, 682, et vomiques pleurales, 770; pleurésies traumatiques, 692; la pleurésie latente manifestation fréquente de la diathèse tuberculeuse, 696; pleurésies hémorrhagiques généralement cancéreuses, 707; température dans la pleurésie, 681; sert au diagnostic différentiel d'avec la pleurodynie, 681; d'avec la pneumonie, 777; s'abaisse brusquement après la paracentèse de la poitrine, 681.  
**PLEURÉTIQUE** (Fièvre pernicieuse), III, 434.  
**PLEURODYNIE** (Diagnostic différentiel de la) d'avec l'angine de poitrine, II, 516; d'avec la pleurésie, 681.  
**PLÈVRE** (Épanchements traumatiques de sang dans la), 735.  
**PNEUMO-HÉMORRHAGIE** (Apoplexie pulmonaire), 615.  
**PNEUMONIE** chronique, 629; — érysipélate-phlegmoneuse, 784; — franche, 773; catarrhe péripneumonique; — bilieuse; ataxique; adynamique; arthritique; rhumatismale, 773; traitement de la — franche, 777; — avec délire par excès de fièvre, 786; par suppuration du parenchyme pulmonaire, 786; par des complications phlegmasiques siégeant ailleurs que dans la poitrine, 787; par la malignité de la cause qui a produit la pneumonie, 787; — ataxique, 787; (ici le musc trouve son indication) (*Voy.* MUSC), 789; — des ivrognes, 789; — du sommet, 791; n'est pas nécessairement accompagnée de délire, 792; ni nécessairement grave, 792; sinon en cas de diathèse tuberculeuse, 793; — suppurative dans la variole confluente, 23; — dans le typhus, 325; — dans la diphthérie, 378; — consécutive à la trachéotomie, 473; marche de la température dans la —, 776; éclaire le diagnostic différentiel d'avec la pleurésie, 777.

**PODAGRE**. *Voy.* GOUTTE.

**POIS MÉDICAMENTEUX** (Formule de) dans le traitement de la névralgie sciatique, II, 400.

**POITRINE** (Angine de), II, 501; — essentielle, 501; — liée à une diathèse rhumatismale ou goutteuse, II, 508.

**POITRINE** (Paracentèse de la), observation, 653; historique, 663; circonstances qui nécessitent la paracentèse de la poitrine, 671; dans la pleurésie suppurative, 682; dans la pleurésie traumatique, 693; dans la pleurésie latente, 696; dans l'hydropneumothorax, 698; indications de l'opportunité de la paracentèse de la poitrine, 711; les signes fournis par la percussion et par l'auscultation peuvent seuls servir de guide, 713; opération (procédé opératoire), 715; instruments, lieu d'élection, 717; nécessité de ponctionner hardiment, 720; phénomènes survenant pendant l'écoulement du liquide, 721; quintes de toux, 721; écoulement de sang par la plaie, 722; couleur rosée de la sérosité, 723; complication de l'opération dans la pleurésie aréolaire, 720; objections contre la paracentèse, 724; craintes imaginaires de syncope, de rupture de vésicules pulmonaires et de l'introduction de l'air dans les veines, 725; de blesser l'artère intercostale, 725; possibilité de reproduction du liquide, 726; la paracentèse ne prolonge pas la durée de la pleurésie, 727; elle ne convertit pas les épanchements séreux en épanchements purulents, 728; — dans les cas d'épanchements traumatiques de sang dans les plèvres, 735; son inutilité, ses dangers et pourquoi (*Voy.* ÉPANCHEMENTS DU SANG), 740; la température s'abaisse brusquement après la ponction de la poitrine, 681.

**POLYDIPSIE**, II, 765; sa gravité, II, 774.

**PORTE** (Veine), constriction de ses rameaux capillaires dans la cirrhose et ce qui en résulte, III, 526, 528, 529.

**PORTES** (Veines) accessoires, ce que c'est, III, 526.

**POULS**, dans les maladies du cœur, différents tracés par le sphygmographe, II, 31; servent au diagnostic, II, 31; — veineux, II, 32; (lenteur du) — dans la seconde période de la fièvre cérébrale, II, 294; sa fréquence extraordinaire dans la troisième période, II, 299.

**POUMON** (Gangrène du). *Voy.* GANGRÈNE PULMONAIRE; hydatides du —, 743;

beaucoup plus fréquentes que celles de la plèvre, 746; conséquences de leur ouverture spontanée dans la cavité pleurale, 747; difficulté du diagnostic, 748, 752; valeur de la voussure thoracique, 752; symptômes, 753; passage des hydatides du foie dans la cavité pleurale, 749; III, 263; rareté des hydatides de la plèvre, 754; caractères de l'expectoration, 755; pronostic, 756; conséquences possibles: hémorragies mortelles; hydropneumothorax, 756; nécessité de l'expectation, 756.

**PRONOSTIC**, son importance en médecine, 104.

**PROSTATE** (Compresseur de la); son emploi dans l'incontinence nocturne de l'urine, II, 734; dans la spermatorrhée, II, 716.

**PUERPÉRALE** (Infection), III, 622.

**PULMONAIRES** (Abscess) dans la pneumonie lobulaire des enfants, 759; abcès — métastatiques, 759; vomiques —, 761; catarrhe — dans l'asthme, II, 442; dans la goutte, III, 344; dans la dothiéntérie, 260; emphyème —. *Voy.* EMPHYÈME; gangrène —, 635; chez les diabétiques, 636; par embolie, 636; perforation —, diagnostic différentiel d'avec la dilatation des bronches, 595; phthisie —, 621; tuberculisation —, chez l'enfant, 629.

**PURGATIFS** dans la diarrhée, III, 414; dans la dothiéntérie, 282; dans la dysenterie, III, 469.

**PURULENTE** (Infection), III, 622.

**PUS** (Empyème de) (Paracentèse dans l'), 729; laisser une canule à demeure et faire des injections iodées, 729.

**PUSTULES** (Cicatrisation des) dans la variole, 12; dans la variole confluente, 20; dans la variole modifiée, 33;

**PUTRIDITÉ** dans la dothiéntérie, 264; dans la dysenterie, III, 465.

**QUININE** (Sulfate de); cinchonine, III, 448, 453; et succédanés des préparations quinquiques, III, 453. *Voy.* ARSENIC.

**QUINQUINA** (son mode d'administration dans les fièvres intermittentes palustres), III, 444; méthode romaine (de Torti), III, 444; méthode anglaise (de Sydenham), III, 446; méthode française (de Bretonneau), III, 447; méthode française modifiée, III, 448; mode d'administration du quinquina dans les fièvres pernicieuses et dans les fièvres larvées, III, 452.

**RACHIALGIE** dans la variole, 4.

**RACHITIS**, III, 457; historique, III, 458; déformations rachitiques, III, 462; ordre de succession des déformations, III, 468; ne sont pas exclusivement dues à l'action des muscles ou de la pesanteur, III, 470; fractures rachitiques, III, 470, 475; anatomie pathologique, III, 471; physiologie pathologique, trois périodes: 1<sup>o</sup> période de fluxion et d'épanchement, III, 472; 2<sup>o</sup> période de ramollissement et de transformation, III, 473; 3<sup>o</sup> période de reconstitution et de consolidation, III, 476; cette période peut manquer et être remplacée par la consommation, III, 478; symptômes généraux, III, 478; marche de la maladie, III, 482; étiologie, III, 482; — intra-utérin, III, 470; action possible de l'acide lactique dans le —, III, 480; — et scrofule, leurs différences, III, 482; influence du rachitis sur la dentition, III, 453; III, 462; traitement (huile de foie de morue), III, 494.

**RAGE**, II, 412.

**RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL**, II, 52; conséquence de l'hémorragie II, 57; diagnostic différentiel avec l'hémorragie, II, 15; l'aphasie est un indice très-probable de —, II, 674.

**RATANHIA** dans les fissures à l'anus, III, 518.

**RATE** (Adénie de la), III, 587.

**RÉGIME** des malades, 27, 185, 284, 286, 463; II, 751; III, 39; III, 473; III, 514.

**REINS MOBILES**, III, 750; fréquence méconnue de cette lésion, III, 753; causes anatomiques, III, 756; physiologiques, III, 753; erreurs de diagnostic nombreuses, III, 755, 756, 759; traitement, III, 761.

**RELACHEMENT DES SYMPHYSES** du bassin, 762; ordinairement méconnu, III, 762; traitement, III, 767.

**RESPIRATION** (L'irrégularité de la), phénomène de grande valeur dans la fièvre cérébrale, II, 297.

**RÉTENTION D'URINE** au début de la variole. *Voy.* DYSURIE; — cause d'anasarque, 742.

**REVACCINATIONS** (leur utilité), 78.

**RÉVULSIVE** (Médication), ses inconvénients dans la coqueluche, II, 497.

**RHUMATISMALE** (Dysenterie), III, 164; pneumonie —, 773.

**RHUMATISME** dans la scarlatine, 114; dans l'érythème noueux, 166; dans l'érythème papuleux, 171; — et danse de

Saint-Guy, II, 222; — et asthme, II, 464; — et angine de poitrine, II, 508; — articulaire aigu, III, 385; — cérébral, II, 772; — noueux, III, 364; névralgies occipitale, sciatique dans le —, II, 385.

**ROSÉOLE**, 161; ce qui la distingue de la rougeole, 161.

**ROUGEOLE**, 140; longueur de la période d'invasion, 141; éruption, 143; marche de la température, 144; complications, 144 et suiv.

**SAIGNÉE** (De la) dans la diphthérie et le croup (son utilité et ses inconvénients), 444; dans la pneumonie franche (son inutilité le plus souvent), 777; dans la maladie de Graves, II, 569; dans l'aménorrhée, III, 600; dans l'apoplexie et l'hémorragie cérébrale (son inutilité et pourquoi), II, 60; inconvénients des saignées locales par les sangsues dans les convulsions, 146.

**SALIVATION** (La) dans la variole confluente, 46, 47.

**SANG** (Altération du) dans la leucocythémie, III, 556.

**SCARLATINE**, 97; sa gravité varie suivant les épidémies; c'est une maladie, très-simple quelquefois, et quelquefois singulièrement grave, 97; la durée de la période d'incubation ne peut être rigoureusement fixée, 99, 100; semble ne pouvoir durer que vingt-quatre heures, 101; période d'invasion, 101; phénomènes qui la caractérisent, 103; fièvres vives, accidents nerveux, 103; albuminurie, 117; suppurations consécutives, 120; température dans la scarlatine, 104, 108; tuméfaction des mains et des pieds, 106; — fruste, 121; emploi et utilité des affusions froides dans la scarlatine, 129; gravité de la scarlatine compliquant la fièvre puerpérale, 130.

**SCARLATINEUSE** (Péricardite), 149.

**SCARLATINIFORMES** (Éruptions) dans la variole, 30, 32; dans la diphthérie maligne, 385.

**SCLÉROSE** du bulbe et de la protubérance dans la paralysie agitante, II, 278; n'est pas une lésion constante, II, 278.

**SCROFULE** et rachitis (leurs différences), III, 482.

**SÉMINALES** (Pertes). *Voy.* SPERMATORRÉE.

**SÉNILE** (Tremblement), II, 269.

**SENSIBILITÉ** (Paralysie de la), dans l'ataxie locomotrice progressive où elle peut manquer, II, 587; troubles de la

— dans la tétanie, II, 204; dans la danse de Saint-Guy, II, 230.

**SEVRAGE**, III, 157; accidents du —, III, 132, 486.

**SINAPISÉS** (Bains), III, 134.

**SOLAIRE** (Névralgie), III, 443.

**SOUFFLE** et voix amphoriques dans la pleurésie, 646; — dans l'oreille et — voilé, valeur très-peu pratique de ces signes, 766.

**SOUFFLES** vasculaires, III, 502; leur valeur, III, 503; discussion à ce sujet, III, 504.

**SPASME** de la portion dure de Ch. Bell, II, 327; —s fonctionnels idiopathiques, II, 258.

**SPASMODIQUE** (Toux) causée par des vers intestinaux, II, 266.

**SPÉCIFICITÉ**, son importance en médecine, 493; spécificité de la cause, 496 et 498; spécificité des symptômes, 499, 501; des médicaments, 509.

**SPERMATORRÉE**, II, 695; troubles des sens dans la —, II, 703; — par suite d'une trop grande longueur du prépuce, II, 704; relation de la — avec d'autres affections nerveuses, II, 705; dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 579.

**SPHYGMOGRAPHE**, son utilité diagnostique dans les maladies du cœur, II, 31; son application dans le vertige épileptique, II, 109.

**SPINALE** (Forme) de la dothiéntérie, 267.

**STATISTIQUE EN MÉDECINE**, ses prétentions étrangement exagérées, XLIV; III, 150.

**STÉATOSE** des organes dans l'alcoolisme chronique, II, 367; sa pathogénie, II, 373, 374.

**STOMACHO LÆSO** (Vertiges a), III, 1.

**STRIDULEUSE** (Laryngite) (faux croup), 554; a quelquefois entraîné la mort, 555; diagnostic différentiel du vrai et du faux croup, 556; quelquefois embarrassant, 556; la — survient généralement la nuit; la toux a un caractère spécial, 557.

**STRYCHNINE** dans la danse de Saint-Guy, II, 246; dans l'incontinence nocturne d'urine, II, 731; en applications locales dans la paralysie faciale, II, 329.

**SUCRÉ** (Diabète), II, 733. *Voy.* DIABÈTE.

**SUDORALE** (Diarrhée), III, 101; — (Fièvre pernicieuse), III, 431.

**SUFFOCATION** (Accès de) dans le goître exophthalmique, II, 548.

**SURDI-MUTITÉ** (Influence des mariages consanguins sur la), II, 135.

**SURDITÉ** comme signe pronostique dans la dothiéntérie, 270; dans le typhus, 325.

**SYMPATHIQUE** (la maladie de Graves est une névrose du grand), II, 556.

**SYNCOPALE** (Fièvre pernicieuse), III, 433.

**SYPHILIS DES ENFANTS NOUVEAUX-NÉS**, III, 293; chez le fœtus, III, 295; ses conséquences: avortement, III, 295; pemphigus; suppurations du thymus, des poumons, III, 296; chez l'enfant nouveau-né, elle se développe rarement avant la deuxième semaine et après le huitième mois, III, 298; incubation, évolution essentiellement chronique chez les uns, essentiellement aiguë chez les autres, III, 298; affection des membranes muqueuses dans la syphilis des enfants nouveau-nés, III, 299; aspect particulier du visage, III, 304; lésions viscérales, III, 305; conditions pathogéniques, III, 305; syphilis héréditaire de par la mère, III, 307; de par le père, III, 308; syphilis inoculée, III, 309; transmission de la syphilis à la nourrice par son nourrisson, III, 310; syphilis transmise par la vaccination, 65 et III, 314; transmission de la syphilis du fœtus à sa mère, III, 312; traitement, III, 313.

**SYPHILITIQUE** (Coryza) chez les enfants nouveau-nés, III, 299; diarrhée —, III, 122; névralgies — s, II, 390; ozène —, 544.

**TACHES** bleues dans la dothiéntérie, 257; — méningitique dans la fièvre cérébrale, II, 282; on la rencontre aussi dans d'autres maladies, dans la maladie de Graves, II, 541; — rosées, lenticulaires, miliaires, 221, 228, 254, 257.

**TALONS** (Erythème des), dans le muguet, 489.

**TANNIN** (Insufflations de), dans l'angine diphthérique, alternées avec les insufflations d'alun, 456; inhalations au moyen de l'appareil pulvérisateur, d'eau saturée de tannin dans les mêmes cas, et surtout dans l'angine laryngée œdémateuse, 577.

**TARTRE STIBIÉ** à haute dose dans la danse de Saint-Guy, II, 244.

**TEMPÉRATURE**, sa marche caractéristique dans les fièvres éruptives; dans la variole discrète, 6; son tracé graphique représente matériellement la marche de la fièvre, 12; dans la variole confluente, 15; dans la variole modifiée, 30; la

scarlatine exalte au plus haut degré la force de calorification, 104; sa courbe de —, 104; la — s'élève de nouveau au moment de la desquamation, 108; ce qui explique peut-être les dangers de cette période, 108; courbe de la — dans la rougeole, 144; marche de la — dans la dothiéntérie, 249; parallélisme entre la marche de la — et l'évolution des lésions des plaques de Peyer, 253; — dans la pleurésie, 681; différencie immédiatement cette affection de la pleurodynie, 681; tombe brusquement après la paracentèse de la poitrine, 684; — dans la pneumonie, 576; moyen de diagnostic différentiel d'avec la pleurésie, 577; — dans la phthisie aiguë, 627; bon moyen de diagnostic d'avec la dothiéntérie, 627; — dans le tétanos, II, 209; pourrait le différencier de la tétanie, II, 209; — dans le typhus, 326; bon moyen de diagnostic différentiel d'avec la dothiéntérie, 327.

**TÉNESME** dans la dysenterie, III, 163.

**TÉNIA** (Influence de l'usage de la viande crue sur le développement du), III, 141.

**TÉRÉBENTHINE** dans les névralgies, II, 404; dans l'asthme, II, 473; dans les coliques biliaires, III, 240; dans certaines espèces de diarrhées nerveuses, III, 116.

**TÉTANIE** (Contracture essentielle des extrémités), II, 195; ses causes les plus ordinaires: allaitement, état puerpéral, II, 197; diarrhée, II, 198; trois formes: 1<sup>o</sup> bénigne, II, 200; 2<sup>o</sup> moyenne, II, 204; 3<sup>o</sup> grave, II, 205; une observation de mort, II, 206; nature de la maladie, 209; son diagnostic différentiel, II, 211; influence de la compression sur la production de la contracture, II, 201; anesthésie, II, 204; traitement de la tétanie, II, 212.

**TÉTANOS** (Température dans le), II, 209.

**THYROÏDE** (Hypertrophie du corps), dans la maladie de Graves, II, 529.

**THORACIQUE** (Névralgie), II, 517.

**TICS** douloureux (Voy. NÉVRALGIE ÉPILEPTIFORME), — non douloureux, II, 257.

**TOPHUS** (dans la goutte), III, 333; III, 343.

**TOUX** croupale, c'est bien plus la toux du faux croup que celle du vrai croup, 367, 552, 558; — hystérique, II, 264; influence du changement de lieu, II, 267; — convulsive dans la coqueluche, II, 483; accident spasmodique de la gorge,

sifflement laryngo-trachéal, II, 484; — spasmodique, II, 266.

**TRACHÉOTOMIE** dans le croup, 464; dans l'angine laryngée œdémateuse, 299, 578; dans la maladie de Graves, II, 571.

**TREMBLEMENT SÉNILE**, II, 269.

**TROMPE D'EUSTACHE** (Catarrhe morbilleux de la), 155.

**TROUBLES SENSORIAUX** dans la goutte, III, 339.

**TUBERCULES MILIAIRES** (d'après M. Ch. Robin), 623.

**TUBERCULEUSE** (Phthisie), difficulté du diagnostic différentiel d'avec la dilatation des bronches, 589.

**TUBERCULISATION** liée à la diarrhée chronique, III, 120.

**TUBERCULISATION PULMONAIRE** chez l'enfant et pneumonie chronique, 629; difficultés de leur diagnostic différentiel, 632; — conséquence du catarrhe morbilleux, 456; de la coqueluche, II, 489.

**TUMÉFACTION** des mains dans la variole discrète, 9; — des mains et des pieds dans la variole confluente, 17; — des mains et des pieds dans la scarlatine, 106; — du visage dans la variole discrète, 7; — du visage dans la variole confluente, 15.

**TYPHOÏDE** (Fièvre), 227; Voy. DOTHIÉNTÉRIE, 226; sa non-identité avec le typhus, 330.

**TYPHUS**, 296; sa non-identité avec la fièvre typhoïde (dothiéntérie), 330.

**TYROSINE** dans l'urine, dans le cas d'ictère grave, III, 278.

**ULCÉRATIONS** du frein de la langue dans la coqueluche, II, 493; — du larynx dans leur rapport avec l'aphonie, 579; avec la syphilis et la tuberculose, 579, 580; — des plaques de Peyer dans la dothiéntérie, 228; — de la trachée-artère à la suite de la trachéotomie et par le fait de la canule, 477.

**ULCÈRE CHRONIQUE SIMPLE** de l'estomac, III, 72 et 76; diagnostic différentiel avec le cancer de l'estomac, III, 92; traitement, III, 96.

**ULCÉREUSE** (Endocardite), II, 47; III, 385.

**URINE** (Incontinence nocturne de l'), II, 720; dans la spermatorrhée, II, 705; dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 578; dans l'épilepsie, II, 95; rétention d' — au début de la variole, 5; — dans la goutte, III, 323.

**URIQUE** (Diathèse), ce qu'il faut entendre par là, III, 353.

**URTICAIRE** (fièvre ortiée), 200; il doit en quelques cas être respecté, 204; son rôle dans quelques cas d'asthme, II, 465.

**URTIGATION**, dans le catarrhe morbilleux, 150.

**UTÉRINE** (Diphthérie), 396; hématoécèle —, III, 604.

**VACCINE**, 43; historique, 43; eaux aux jambes chez le cheval, cowpox chez la vache, 47 à 59; transmission de la vaccine de l'homme à l'homme, 62; conditions d'une bonne vaccination, 63; choix des sujets qui fournissent le vaccin, 65; transmission de la syphilis par la vaccine, 65; conditions de santé des sujets qui reçoivent le vaccin, 68; éruptions vaccinales, 70; conservation du vaccin, 73; utilité des nombreuses piqûres, 74; avantage de vacciner sur les *navi materni*, 75; moyen de régénérer le vaccin, 77; la vaccine et la variole ne sont pas identiques, 59; l'inoculation de la variole à la vache ne reproduit pas la vaccine, expériences à ce sujet, 59 et suiv.; procès de la vaccine favorable à celle-ci, 84.

**VAGINALE** (Diphthérie), 397.

**VALÉRIANE** (Emploi de la) dans la polydipsie, II, 765.

**VARICELLE** (vérolette, petite vérole volante), 92; diffère essentiellement de la variole, 28, 93; expériences à ce sujet, 93; incubation de la —, 96.

**VARIOLE**, 1; — discrète, 3; — discrète anormale, peut tuer plus promptement que la variole confluente, 12; — confluente, 13; sa gravité, 22; complications de la — confluente, 23; — chez les petits enfants, 24; albuminurie dans la —, 23; angine laryngée dans la —, 21; incubation de la —, 3; période d'invasion dans la —, 29; température dans la —, 6, 12, 15, 30; — s noires, 24 (Voy. ÉRUPTIONS MORBILLIFORMES, SCARLATINIFORMES, 30); — modifiée, 27; analogies et différences avec la — normale, 29 à 33.

**VARIOLEUSE** (Ovarite), 41.

**VARIOLIQUE** (Inoculation), 36.

**VEINEUSE** (Oblitération), cause de gangrène humide, 315.

**VERTIGES** dyspeptiques (*a stomacho læso*), III, 1; dans la convalescence de maladies graves, III, 7; dans la convalescence de la dothiéntérie, 289; —

- épileptiques (absences), petit-mal, II, 403; diverses formes, II, 406; — labyrinthiques (*ab aure læsa*), II, 76; III, 40; — symptomatiques dans les maladies du foie, des reins, de la vessie, de l'utérus, III, 40; — dans la goutte, III, 339.
- VÉSICATOIRES** dans la pneumonie, 783; leurs dangers dans la diphthérie, 399 et 452; leur inutilité dans les convulsions, sauf quelques indications spéciales, II, 187; — ammoniacaux, procédé d'application, II, 396.
- VÉSICULAIRES** (Vers). *Voy.* HYDATIDES.
- VÉSICULE BILIAIRE** (Atrophie de la), à la suite des calculs biliaires, III, 223; distension de la —, III, 222; hydro-  
pisie de la —, III, 223.
- VIANDE CRUE** (Usage de la), dans la diarrhée chronique, III, 424; et principalement dans la diarrhée survenant après le sevrage prématuré, III, 437.
- VIN DIURÉTIQUE DE L'HOTEL-DIEU DE PARIS** (Formule du), II, 36.
- VISAGE** (Herpès du), dans la pneumonie, 773.
- VISCÉRALE** (Adénie), III, 570; aura —, II, 443; goutte —, III, 340; goutte — et aphasie, II, 642, 651; lésions — dans l'alcoolisme chronique, II, 364; leur enchaînement hiérarchique, II, 365; leurs rapports avec l'altération des vaisseaux, II, 372; lésions — dans la syphilis des enfants nouveau-nés, III, 305.
- VISCÉRAUX** (Troubles), dans la goutte chronique régulière, III, 334.
- VISION** (Troubles de la), dans l'ataxie locomotrice progressive. *Voy.* OCULO-PUPILLAIRES (Phénomènes) et YEUX (État des), II, 580; dans la spermatorrhée, II, 703; dans le diabète, II, 745.
- VOIX** amphorique, 646; — croupale, 367.
- VOLVULUS**. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES.
- VOMIQUES PÉRIPNEUMONIQUES**, 758; observations, 758 et 762 à 766; rares en dehors du cas où l'on a affaire à une *vomique tuberculeuse*, à des abcès pulmonaires métastatiques, 764; moins rares chez les enfants où elles se montrent dans la pneumonie lobulaire, 759; diagnostic différentiel, 766; elles peuvent être confondues avec des abcès pleuraux, 767; valeur très-peu pratique des signes tels que le *souffle dans l'oreille* et le *souffle voilé*, 766; caractères des crachats, 767; les vomiques pulmonaires se vident plus tôt que les vomiques pleurales, 767; des abcès circonscrits dans la grande cavité pleurale (pleurésie suppurée enkystée), 768; vomissement de grande quantité de pus dans ces cas, 770; ces vomiques pleurales ne sont pas rares chez les enfants, 770.
- VOMISSEMENTS** dans la période d'invasion de la variole, 4; dans la fièvre cérébrale au début, leur valeur diagnostique, II, 293; vomissements dans la coqueluche, leurs inconvénients et leurs dangers, II, 490; vomissements dans la convalescence de la dothiéntérie, 288; vomissements glaireux dans l'ulcère simple de l'estomac, III, 91, et dans la gastrite chronique (*voy.* PTUITE).
- VOMITIFS**, ont plus d'inconvénients que d'avantages dans l'angine diphthérique et le croup, 450, 452.
- VOMITUS STERCORIS**. *Voy.* OCCLUSIONS INTESTINALES.
- VULVAIRE** (Diphthérie), 397.
- VULVE** (Gangrène de la), dans la rougeole, 458.
- YEUX** (État des), dans le goitre exophtalmique, II, 528; dans l'ataxie locomotrice progressive, II, 580 et 616. *Voy.* OCULO-PUPILLAIRES (Phénomènes) et VISION (Troubles de la).
- YEUX** (Hémorragies par les), dans la coqueluche, II, 491.
- ZONA** (Herpès zoster), ses caractères, 205; douleurs qui l'accompagnent, sa tendance à suivre les trajets nerveux, 206; névralgies consécutives rebelles à toute espèce de traitement et persistant durant des années, 210.
- ZOSTER** (Herpès). *Voy.* ZONA, 205.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.