

rubéole et les roséoles, IV, 85.
Traitement, IV, 88; nécessité de l'isolement, IV, 89; photothérapie, IV, 91; indication des bains froids.

ROUGEUR ÉRYSIPELATEUSE de la peau du cou dans la diphtérie maligne, II, 97.

RUBÉOLE, IV, 91; est-elle identique à la roséole saisonnière, IV, 92.

RUPTURES DE L'AORTE dites spontanées, I, 870.

RUPTURE DU CŒUR, I, 782; rupture des cordages tendineux des valvules du cœur, I, 733.

RUPTURES MUSCULAIRES de la dothiëntérie, IV, 466.

RUPTURE DE LA RATE dans la fièvre récurrente, IV, 225.

RUPTURE DE LA VÉSICULE dans la lithiase biliaire, péritonite consécutive, gravité de cette péritonite, II, 887; des canaux cystique et cholédoque, la rupture peut survenir au moment d'une colique hépatique, II, 865.

S

SABLE INTESTINAL, II, 498.

SACCHAROMYCES ALBICANS, II, 12.

SAIGNÉE dans l'œdème suraigu du poumon, I, 294; dans l'urémie, III, 124.

SALIVATION mercurielle, II, 4.

SANG (examen clinique du), IV, 490; coloration, IV, 492; fixa-

tion, IV, 491; dosage de l'hémoglobine, IV, 492; valeur globulaire, IV, 495; dans l'anémie aiguë (réparation), IV, 495; sang gélifié glycérimé, pour culture du liquide pleural, I, 499; sang gélifié pour la culture du bacille de Ducrey, IV, 459; du gonocoque, IV, 409; du bacille de Koch, III, 679; I, 504.

SARCOME des fosses nasales, I, 10; du cœur, I, 785; de la langue, I, 52.

Saturnisme, IV, 797; étiologie, état discrasique, IV, 797; anémie, liséré saturnin, 798. *Colique de plomb*, IV, 798. *Paralytic saturnine*, IV, 799; elle siège surtout aux *extenseurs* des mains, IV, 799 (le long supinateur est respecté, IV, 800); tumeur dorsale du poignet, IV, 800; paralysies; types Aran Duchenne, Duchenne-Erb, péronien, IV, 800; tremblement, atrophie musculaire. Hystérie saturnine, IV, 801; encéphalopathie, IV, 802.

Goutte saturnine, IV, 805; elle a la plus grande analogie avec la goutte diathésique, IV, 804; *néphrite* saturnine, IV, 805; III, 50; parotidite, IV, 808.

Scarlatine, IV, 51; étiologie, durée de l'incubation, bactériologie, IV, 65; la scarlatine est contagieuse surtout pendant la desquamation, IV, 65; l'*invasion* est marquée par l'angine,

IV, 52; l'*éruption* est de teinte vineuse, écarlate, IV, 55; aspect souffleté de la face, IV, 54; évolution de l'angine, IV, 55; langue framboisée, IV, 55; fièvre rouge, IV, 55.

Desquamation. Elle dure parfois un mois et au delà. Elle est surtout abondante aux pieds et aux mains, IV, 56; les lambeaux épidermiques peuvent prendre la forme de doigts de gant, IV, 56.

Scarlatines graves, IV, 57; maligne (description de Trouseau), IV, 57; hémorragique, IV, 59.

Scarlatine fruste, IV, 59; observations de Trouseau, IV, 40; l'éruption peut manquer totalement et la scarlatine ne se révèle que par l'angine, la desquamation ou la néphrite, IV, 40.

Complications, IV, 42.

Angines membraneuses précoces non diphtériques (la diphtérie n'aime pas le larynx), IV, 42; angines diphtériques tardives, IV, 44.

Néphrite, IV, 46; albuminurie précoce, IV, 46; mal de Bright, IV, 48; hématurie, IV, 52; anurie, IV, 55; anasarque, IV, 54.

Pseudo-rhumatisme, IV, 56; IV, 591; *suppurations*, IV, 57.

Œdème, IV, 58; reliquats, IV, 59.

Diagnostic, IV, 60; avec l'érythème scarlatiniforme infectieux, IV, 60. *Traitement*, régime lacté.

SCARLATINE puerpérale, IV, 61.

SÉROTHÉRAPIE antistreptococcique, son utilité est contestée, IV, 69.

SCIATIQUE (névralgie), III, 855.

SCLÉRÈME, III, 925.

SCLÉRODERMIE, III, 925; les plaques ont une disposition symétrique et métamérique, III, 925; sclérodémie dactylée, III, 926.

SCLÉROSE cérébrale infantile lobaire primitive, III, 566.

SCLÉROSE du cœur, I, 774; circonscrite, I, 774; diffuse, I, 775; péri-vasculaire ou dystrophique, I, 776.

Scléroses de la moelle; *des cordons postérieurs* (ataxie locomotrice), III, 552; *des cordons latéraux* (descendants), III, 599; III, 519; latérale symétrique (tabès dorsal spasmodique), IV, 400.

Sclérose latérale amyotrophique, IV, 401; c'est une sclérose antéro-latérale primitive avec altérations cellulaires des cornes antérieures, III, 405; troubles paralytiques spasmodiques, III, 405; atrophies musculaires, III, 404; évolution rapide, III, 405.

Scléroses combinées (des cordons postérieurs et latéraux), III, 575; dans le tabès (tabès combiné), III, 574; de la paralytic générale, III, 575; forme spasmodique, III, 576; formes subaiguës, III, 576.

Sclérose en plaques, III, 406; les plaques peuvent être

spinales, cérébrales et cérébro-spinales, III, 407; le type cérébro-spinal est le plus fréquent, III, 407; démarche cérébello-spasmodique, III, 408; tremblement intentionnel, III, 409; nystagmus, III, 409; embarras de la parole, III, 410.

SCLÉROSE du pancréas, II, 977; *du poumon*, I, 244.

Scorbut, IV, 451; sa nature épidémique, IV, 551; *buccal*, II, 6; tuméfaction des gencives, IV, 552; *ulcères* (maladie de Barlow) *scorbutiques* des membres, IV, 552; œdèmes, IV, 552. *Scorbut infantile*, IV, 554; il ne s'observe pas chez les enfants élevés au sein, IV, 555; tuméfactions osseuses, épanchements sanguins sous-périostés, IV, 555. Traitement.

SCROFULATE DE VÉROLE, I, 441; lésion syphilitique tuberculeuse du nez, I, 22.

SCROFULE, IV, 722; adénopathies et arthropathies, IV, 725, 726; scrofulo-tuberculose du nez (diagnostic avec la syphilis), I, 20.

SECOURS ÉLECTRIQUES des brightiques, III, 74.

SEIN hystérique, III, 745.

SELLES riziformes du choléra, IV, 276.

SENS DES ATTITUDES, III, 556; *de l'espace*, III, 556.

SENSIBILITÉ RÉCURRENTÉ, III, 901.

SÉPARATION DES URINES, III, 168; description de la méthode: séparateur de Luys, III, 168;

dans l'albuminurie non brightique, III, 145; dans le rein mobile avec néphrite, III, 508; dans les néphrites *unilatérales*, III, 129.

Sérodagnostic de la fièvre typhoïde, IV, 179; technique de la méthode, IV, 179; c'est un procédé sûr et incontesté IV, 181; *séro-diagnostic* de la tuberculose, I, 500; du choléra, IV, 278; de la psittacose, IV, 407; des infections pneumococciques, I, 214.

Sérothérapie diphthérique, II, 129; principe de la méthode, II, 149; application thérapeutique, technique de l'injection, II, 151; résultats, II, 152; accidents, II, 155; néphrite aiguë, III, 49; sérothérapie diphthérique dans la scarlatine, IV, 68; dans le croup, I, 96; sérothérapie préventive, II, 155.

Sérothérapie de l'érysipèle, IV, 250; de la scarlatine, IV, 69; du tétanos, IV, 526; de la fièvre typhoïde, IV, 209; de la vaccine, IV, 25; de la lèpre, IV, 375; de la peste, IV, 505.

SÉRUM ANTICARBONNEUX, IV, 594.

SÉRUM ARTIFICIEL (grandes injections de), IV, 846; sérum de Chéron, de Hayem, IV, 846; préparation, IV, 847; injections, IV, 847; appareil de Hallion-Carrion, 848.

SÉRUM hémolytique, hépatolytique, néphrolytique, IV, 577.

STALORRHÉE, urémique, III, 91.

STÉROSE, I, 250.

SIGNES d'Argyl-Robertson, III, 554; *de Babinski*, technique de sa recherche, III, 357; sa valeur chez les tabétiques, III, 575; *signe de Bolognini*, IV, 84; *signe de Kernig*, technique de sa recherche, III, 671; il témoigne de la participation des méninges médullaires, III, 672; dans les méningites aiguës, III, 677; III, 646; dans les méningites rachidiennes, III, 665. *Signe de Koplik*, IV, 84; *du peaucier* (dans l'hémiplégie), III, 557; *de Romberg* (tabes), III, 557; *de la temporale* (mal de Bright), III, 74; *de Trousseau* (raie méningitique) III, 657; *de Westphal* (tabes), III, 531.

SIMULATEURS HYSTÉRIQUES, III, 745.

SOMMEIL NERVEUX, III, 758; manière de le provoquer, III, 759.

SOMNAMBULISME, III, 761.

SON SKODIQUE, I, 456.

SOUFFLES CARDIAQUES, I, 726; de l'insuffisance aortique, I, 750; I, 755; du rétrécissement aortique, I, 750; I, 757; de l'insuffisance mitrale, I, 729; I, 741; du rétrécissement mitral (présystolique), I, 729; I, 741; de l'insuffisance et rétrécissement pulmonaires, I, 764; de l'insuffisance tricuspide, I, 760; de rétrécissement tricuspide, I, 762.

SOUFFLES EXTRA-CARDIAQUES, I, 742.

SOUFFLE crural (double), I, 756; souffle tubaire, I, 219.

SPASMES FONCTIONNELS, III, 804;

spasme de la glotte, I, 121; spasme intestinal dans l'obstruction calculuse, II, 869; spasme réflexe des vaisseaux pulmonaires de Potain et Franck, I, 760.

SPÉCIFICITÉ des maladies (théorie de la), IV, 875, 889.

SPECTROSCOPIE des urines, dans l'ictère, II, 959.

SPHILLE cholérique, IV, 266 d'Obermeier, IV, 228.

SPIROCHÈTE, IV, 228.

SPLÉNECTOMIE, étude comparée du sang (avant et après la), IV, 469.

SPLÉNISATION PULMONAIRE, I, 141.

SPLÉNOMÉGALIES, IV, 485; palustre, IV, 485; primitive, IV, 486; leucocythémique, IV, 484; tuberculeuse, IV, 485.

SPLÉNOPNEUMONIE, I, 259.

SPLÉNOPTOSE, II, 585.

SPONTANÉITÉ des maladies, IV, 875.

SPORES du charbon (leur rôle dans la contagion), IV, 387; spores tétaniques (inoculation), IV, 519.

STAPHYLOCOQUE blanc (planche), II, 154; myélites expérimentales, III, 414.

STASOBASOPHOBIE, III, 771 (voir Astasie-abasie).

STÉARRHÉE, II, 966; II, 972.

STÉGOMYA FASCIATA, IV, 291.

STÉNOSES (voir Rétrécissements).

STÉPPAGE dans les polyneuropathies, III, 700; dans la paralysie alcoolique, IV, 789; dans la paralysie lépreuse, IV, 371.

STÉATOSE du foie, II, 815.

Stomatites : aphteuse, II, 17;

- érythémateuse, II, 4; couenneuse, ulcéreuse, spécifique, II, 7; crémeuse (muguet), II, 10; mercurielle, II, 5; stomatite d'alarme, II, 4; de la rougeole, IV, 80; ulcéro-membraneuse, II, 6; urémique, II, 1.
- STRABISME convergent, III, 892; divergent, III, 888.
- STREPTOCOCCIE, IV, 257 (voir Érysipèle).
- STREPTOCOQUE de l'érysipèle, IV, 254; sérum de Marmorek, IV, 255; myélites expérimentales, III, 444; (planche), II, 152.
- STREPTOTHRIX d'EPINGER (mycose pulmonaire), I, 581.
- SUBACUTE COMBINED DEGENERATION of the spinal Cord, III, 577 (scléroses combinées).
- SUETTE MILIAIRE, IV, 95.
- SUEURS des rhumatisants, IV, 562; intestinales des rhumatisants, IV, 562; de sang dans l'hystérie, III, 755; de la suette miliaire, II, 94; d'urée, III, 90.
- SUGGESTION chez les hystériques, III, 757.
- SULFURE DE CARBONE (intoxication), IV, 825; ivresse, IV, 827; hystérie, IV, 827; névrite, IV, 827.
- SUCCESSION hippocratique, I, 674.
- SURCHARGE graisseuse (obésité), IV, 696; graisseuse du cœur, I, 775.
- SURDITÉ après la rougeole, IV, 85; après les oreillons, IV, 260; après la fièvre typhoïde, IV, 171.
- SURDITÉ VERBALE, III, 552; III, 624.
- SURRÉNALE (insuffisance), III, 526.
- SURRÉNALITES AIGÜES, III, 528.
- SUSPENSION des tabétiques, III, 567.
- SYMPHYSE cardiaque du péricarde, I, 697; I, 698.
- SYNGINÉSIE, III, 551.
- SYNCOPE hystérique, III, 754; réflexe de la fièvre typhoïde, IV, 175.
- Syndromes** de Bonnier, III, 486; de Brown-Séquard, III, 441; cérébelleux, IV, 490; d'Erb, III, 474; hystériques simulateurs, III, 754; labyrinthique, III, 502; de Little, III, 400; médiastinal, I, 595; de Raynaud, III, 928; de Weber, III, 484.
- SYNOVITE purulente de la blennorrhagie, IV, 420.
- SYPHILIDES des lèvres, II, 24; de la langue, érosives, ulcéreuses, plaques lisses, crevasses, dos de crapaud, II, 25; du nez, I, 11; nasale tuberculeuse, I, 20; pigmentaires du cou, III, 520.
- Syphilis**, chancre, IV, 444; syphilis maligne hypertoxique (typhose syphilitique), IV, 177.
- Syphilis conceptionnelle*, IV, 444.
- Syphilis vaccinale*, IV, 22.
- Traitement* de la syphilis, IV, 854; protiodure d'hydrargyre, IV, 856; biiodure d'hydrargyre, IV, 857; biiodure d'hydrargyre huileux, IV, 858; biiodure d'hydrargyre aqueux, IV, 859; huile grise, IV, 857; calomel, IV, 857; technique de l'injection hypodermique, IV, 840;

- iodure de potassium, IV, 841.
- SYPHILIS de l'aorte et de l'orifice aortique (voir Aortites et Anévrysmes), I, 891; I, 902.
- Syphilis cérébrale**, III, 581.
- Artérites cérébrales syphilitiques*, leurs localisations, III, 582. Elles peuvent produire des anévrysmes. Rupture de l'anévrysmes et hémorragie méningée, III, 585; elles peuvent produire l'oblitération de l'artère (endartérite oblitérante) et le ramollissement cérébral, III, 586; elles peuvent également provoquer l'hémorragie cérébrale, III, 589.
- Description clinique*. Apoplexie, III, 590; hémiplegie, III, 591; aphasie, III, 594.
- Gommes cérébrales*. Le tissu gommeux peut se présenter sous forme d'infiltration diffuse ou de gomme circonscrite, III, 599. Prédilection pour le lobe frontal. Les lésions scléreuses et gommeuses cérébro-méningées sont souvent combinées.
- Symptômes*: la syphilis cérébrale est souvent annoncée par des prodromes: céphalée intense, troubles de la parole et de la mémoire, légère aphasie transitoire, lourdeur et fourmillements d'un pied; d'une main; paralysies oculaires, III, 602; hémianopsie, III, 605; paralysies des membres, III, 604; épilepsie jacksonienne, III, 605.
- Traitement* mercuriel rapide et intense.
- Pseudo-paralysie générale syphilitique*, III, 608.
- Syphilis cérébrale héréditaire*, III, 611.
- SYPHILIS DU CERVELET, III, 488.
- Syphilis de l'estomac**, II, 567; faits cliniques, II, 567; la syphilis stomacale est polymorphe dans ses lésions, II, 575; ses symptômes sont variables; tantôt elle ne se traduit que par des troubles dyspeptiques, tantôt elle revêt toutes les allures de l'ulcère simple de l'estomac: douleurs, vomissements, hématomèse, amaigrissement, cachexie, II, 576. Le traitement mercuriel est souverain.
- Syphilis du foie**, II, 781.
- Accidents secondaires*: ictère syphilitique bénin, II, 781; ictère grave, II, 782.
- Hépatite scléreuse diffuse*: foie ficelé, II, 785.
- Hépatite nodulaire gommeuse*, II, 784; elle peut prendre l'aspect de la maladie de Hanot, II, 785.
- Syphilis hépatique héréditaire*; elle peut être intra-utérine, II, 786; elle peut se continuer chez le nouveau-né, II, 787; elle constitue parfois une forme spléno-hépatique de l'hérédo-syphilis, II, 787; elle peut apparaître sous forme d'hérédo-syphilis tardive, II, 788.