

†**Cascara Sagrada** (Cortex rhamni Purshiana). In Pulverform zu 0,25 (wegen des schlechten Geschmacks in Tabletten und Kapseln). Am zweckmässigsten ist das

†**Extractum Cascarae Sagradae fluidum.** Zu 20–30 Tropfen 1–2 Male täglich. (10,0 = 15 Pf.)

148) Rp. Extr. Cascarae Sagrad. fluid.
Aq. destill.
Syrup. Zingib. aa 10,0.

M. D. S. 2 Mal täglich 1 Theelöffel.
(Habituelle Stuhlverstopfung u. Dysenterie.)

Castoreum. *Castoreum canadense.* Bibergeil. (Das *Castoreum sibiricum* ist sehr theuer und nicht officinell.) In Pulvern und Pillen zu 0,1–0,5 mehrmals täglich. (1,0 = 30 Pf.)

Tinctura Castorei. (Castor. 1, Spirit. 10.) Zu 20–30 Tropfen mehrmals täglich. (10,0 = 45 Pf.)

149) Rp. Kalii bromat. 0,5. 150) Rp. Tinct. Valerian. ather.
Castorei 0,05–0,1. Tinct. Castorei aa 7,5.
Sacch. alb. 0,5. M. D. S. 3 × täglich 20–30
M. f. pulv. D. t. dos. X. Tropfen.
(chart. cerat.) (Krämpfe, Hysterie, etc.)
S. 3 × tägl. 1 Pulver.

Catechu. (Extract aus *Area Catechu.*) In Pulvern und Pillen zu 0,5–2,0 mehrmals täglich, auch in Solution (5,0–10,0 : 180,0). 10,0 = 10 Pf.

Tinctura Catechu. (Catechu 1, Spirit. 5.) Zu 20–50 Tropfen mehrmals täglich. (10,0 = 10 Pf.)

151) Rp. Catechu 0,5–1,0.
Opii puri 0,01–0,02.
Sacch. alb. 0,5.

M. f. pulv. D. t. dos. X.
S. 2–3stdl. 1 Pulver.
(Chron. Diarrhoe.)

†**Cerium oxalicum.** Weisses, in Wasser unlösliches Pulver. Zu 0,06–0,3 mehrmals täglich. In grossen Dosen 0,5–1,0 gegen Seekrankheit und Cardialgie. (1,0 = 5 Pf.)

152) Rp. Cerii oxalici 0,1.
Sacch. lact. 0,5.

M. f. pulv.
D. tal. dos. X.
S. 2–3 × tägl. 1 Pulver.
(Erbrechen der Schwangeren.)

Cerussa. Bleiweiss. Siehe *Plumbum carbonicum.*

Chamomillæ flores. Kamillenblüthen. Im Infus (20,0–30,0 : 200,0) zu Species, zu Bädern (s. d.) und zu Klystieren. (100,0 = 70 Pf.)

Charta nitrata. Salpeterpapier. Mit Salpeterlösung (1 : 5) getränktes Fliesspapier. In kleine Streifen zerschnitten anzuzünden und die Dämpfe einzuathmen. (Asthma.) (400 □ Centim. = 5 Pf.)

Charta sinapisata. Senfpapier. (1 St. = 10 Pf.)

Chinæ cortex. Chinarinde. (Von *Cinchona succirubra.*) Im Infus und Decoct (zu 10,0–15,0 : 180,0). 10,0 = 20 Pf.

Extractum Chinæ aquosum und *Extractum Chinæ spirituosum*. Innerlich zu 0,5—1,0 in Pillen und Mixturen. (1,0 = 15 u. 35 Pf.)

Tinctura Chinæ (Cort. Chin. 1, Spirit. 5). Zu 20 Tropfen bis $\frac{1}{2}$ Theelöffel mehrmals täglich, allein oder als Zusatz zu roborirenden Mitteln und Stomachicis. (10,0 = 20 Pf.)

Tinctura Chinæ composita (Cort. Chin., Rad. Gent., Cort. Aurant., Cinnam. Spirit.).

Vinum Chinæ. (Tinct. Chinæ, Glycerin ää 100,0. Xereswein 300,0.) Kinder- bis esslöffelweise. 100,0 = 160 Pf.

153) Rp. Decoct. (oder Inf.) cort. Chinæ 10,0—15,0 : 180,0.

Acid. sulf. dil. 1,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.

M. D. S. 2stdl. 1 Essl.

(Amarum, Roborans.)

154) Rp. Tinct. Chin. comp. 155) Rp. Tinct. Chinæ comp. 30,0.
Tinct. aromat. Tinct. Nucum vomic. 3,0.
oder

Tinct. Rhei vinos. ää 15,0.

M. D. S. 3 \times tägl. $\frac{1}{2}$ —1 Theel.

M. D. S. 3 \times täglich 20—30 Tropfen.

(Stomachicum.)

† *Chininum bimuriaticum carbamidatum*. In Lösung von 1,0—2,0 : 10,0 Aqua zur subcut. Injection geeignet.

Chininum bisulfuricum. Leicht lösliches Präparat (1,0 : 12,0), daher zur subcut. Injection und Einspritzung bei Gonorrhoe (1,0 : 100,0) geeignet. Dosirung wie Chinin. sulf. (0,1 = 5 Pf.)

Chininum ferro-citricum. Siehe Ferrumpräparate.

† *Chininum hydrobromatum*. In Pulvern zu 0,2—0,8 (gegen hysterisches Erbrechen). 0,1 = 5 Pf.

Chininum hydrochloricum. Weisse Krystalle, bitter schmeckend, in 3 Th. Weingeist, in 34 Th. Wasser löslich. Dosirung und Anwendung wie Chinin. sulf. 1,0 = 20 Pf.

† *Chininum salicylicum*. In Pulvern zu 0,2. (1,0 = 20 Pf.)

Chininum sulfuricum. Weisse, in Wasser schwer lösliche Krystalle. (Bei Zusatz einiger Tropfen Acid. sulf. leicht löslich.) Innerlich zu 0,05—1,5 und darüber in Pillen, Pulver (Oblaten, Capseln) Solution. Auch zu Inhalationen (1,0 : 400,0). 1,0 = 20 Pf.

(Zur subcut. Injection ist dasselbe durch *Chininum bisulfuricum*, *Chinin. bimur. carbamid.* oder *Chininum mur. amorph.* zu ersetzen, da diese Präparate keines Säurezusatzes bedürfen.)

156) Rp. Chinini sulfur. 0,5.
In Capseln
od. in Pulv. u. Oblaten.
1—4 Stück pro die.

(Antifebrile, Intermittens,
Neuralgien, acuter Gelenkrheumatismus.)

157) Rp. Chinini sulfur. 0,5—1,0.
Acid. sulf. dil. 2,0.
Aq. Cinnamomi 50,0.
Aq. destill. 100,0.

M. D. S. 2ständl. 1 Essl.

- 158) Rp. Chinini sulf. 2,0. 159) Rp. Chinin. hydrochl. 5,0.
 Sacch. alb. f. c.
 Gummi arab. ãã 1,0. Acid. hydrochl. gtt. nonn.
 F. c. ungt. Glycerin. Pilul. 30. massae qua forma pilul.
 (Die Masse muss auf einem 20.
 mit Talcum abgeriebenen (Jede Pille enthält 0,25 Chinin.)
 Brette ausgerollt werden.)

NB. Die Salze des *amorphen Chinin* sind fast ebenso wirksam wie die des krystallisirten. Als gutes und billiges Ersatzmittel für dasselbe sind besonders die beiden folgenden Mittel zu empfehlen.

†*Chininum muriaticum amorphum*. Schwarze, in Wasser leicht lösliche Substanz. 1,0 kostet etwa 5 Pf.

- 160) Rp. Chinin. mur. amorph. 0,75—1,5. 161) Rp. Chinin. mur. amorph. 1,0.
 Extr. Opii 0,05—0,15. solve in 10,0.
 Pulv. et Succ. Liq. 0,5. D. S. Zur subcut. Injection.
 Mucil. Gum. arab. q. s. 1—2 Spritzen.
 ut f. pilul. Nr. 15. Consparg.
 D. S. 2stündl. 1 Pille.

†*Chininum tannicum*. Schwer löslich. Zu 0,1—0,2 mehrmals in Pulver. Besonders in der Kinderpraxis bei Keuchhusten beliebt. 1,0 = 10 Pf.

†*Chinolinum*. Farblose, ölige, in Wasser unlösliche Flüssigkeit, leicht löslich in Alkohol. (1,0 = 5 Pf.)

†*Chinolinum tartaricum*. Farblose, luftbeständige Krystalle. Als billiges Ersatzmittel (1,0 = 5 Pf.) für Chinin empfohlen. In Pulver (1,0—2,0 vor dem Intermittensanfall) und in Lösung (1,0 : 100,0). — Hat sich nicht besonders bewährt.

Chloralum hydratatum. Chloralhydrat. Farblose, leicht lösliche Krystalle. Innerlich zu 1,0—2,0 auf einmal
 ad 3,0 pro dosi! — ad 6,0 pro die!

in Lösung, auch in Form der 0,25 Chloral enthaltenden Chloralperlen (Chloral perlé Limousin). Aeusserlich in Clysmen (1,0—2,0 mit Mucilago Salep 60,0), zu Waschungen der Kopfhaut bei Pityriasis capitis (5,0 : 200,0), selten in subcut. Injection. Hauptsächlichste Indication: Insomnie (bes. Schlaflosigkeit der Greise), Delirium tremens, Delirium bei Pneumonie, Manie, Eclampsie, Lyssa, Strychninvergiftung, Singultus. 1,0 = 5 Pf. 10,0 = 25 Pf.

- 162) Rp. Chloral. hydrat. 4,0. 163) Rp. Chloral. hydrat. 6,0.
 Aq. dest. Mucil. Salep 150,0.
 Syr. cort. Aurant. ãã 40,0. Syr. Rub. Id. 30,0.
 M. D. S. 1—2 Essl. (1 Essl. M. D. S. Abends 1—2 Esslöffel
 = 1,0.) (= 0,5—1,0).
 (Schlaflosigkeit, Manie, (Habituelle Schlaflosigkeit,
 Delirium tremens etc.) Reizhusten, Eclampsie.)
- 164) Rp. Chloral. hydr. 5,0. 165) Rp. Chloral. hydrat.
 Aq. dest. 10,0. Aq. dest. ãã 5,0.
 M. D. S. 1 Theelöffel in 1 Glas D. S. Zur subcut. Injection.
 Wein, Bier oder Limonade. (2 Spritzen und darüber;
 Liebreich. giebt leicht Abscess!)

Für die Kinderpraxis sind folgende Formeln zu empfehlen:

- 166) Rp. Chlor. hydrat. (1,0) 30,0. 167) Rp. Chloral. hydr. 0,1—0,5.
 Aq. Valerian. 10,0. Mucil. Salep 50,0.
 Syrup. simpl. 20,0. D. S. Zum Klyisma.
 M. D. S. Von Zeit zu Zeit ein (Krampfstände etc.)
 Theelöffel.

Chloroformium. CHCl_3 . Klare, flüchtige Flüssigkeit, in Wasser wenig löslich, leicht löslich in Alkohol. Dargestellt durch Destillation von Alkohol mit Chlorkalk. Zu Inhalationen 5,0—20,0 und darüber; äusserlich als local wirkendes Mittel, zu Linimenten. Innerlich (selten) zu 2—10 Tropfen. Auch in subcut. Injection ($\frac{1}{2}$ —1 Spritze). Das beste Chloroform ist das in neuester Zeit aus Chloral (durch Zerlegen von Chloral mittelst Alkali) bereitete. Von der Reinheit des Chlorof. überzeugt man sich, wenn beim Verdampfen desselben auf der Hand kein reizender, widerlicher Geruch zurückbleibt. — Es ist in dunklen Gläsern aufzubewahren. (10,0 = 15 Pf. Chloroformium e Chloralo hydrato 10,0 = 30 Pf.)

- 168) Rp. Chloroformii 10,0. 169) Rp. Adipis suil. 40,0.
 Olei Hyoscyami 20,0. Chloroform. 15,0.
 M. D. S. Aeusserlich. Mixt. oleoso-bals. 5,0.
 (Locales Anæstheticum bei M. f. linim. D. ad vitr.
 Rheumatismus, Pleuritis.) S. 3 Mal tägl. 1 Theel. voll
 einzureiben.

Chrysarobinum. Gelbes, leichtes, krystallinisches Pulver, erhalten durch Reinigung des in Höhlungen der Stämme von Andira Araba ausgeschiedenen Secretes. 1,0 = 10 Pf.
 Anwendung: Aeusserlich (vorher in Alcohol zu lösen) in Salbenform, mit Adeps, Vaseline, Lanolin oder Collodium (0,5—1,0 : 10,0) gegen Psoriasis, Herpes, Chloasmata, Pityriasis vers. etc. (Die Augen zu schützen!)

- 170) Rp. Chrysarob. 1,0—2,0. 171) Rp. Chrysarobin. 1,0—2,5.
 Ungt. Paraff. 20,0. Adip. suil. 1,0.
 M. f. ungt. Lanolin. 8,0.
 D. S. Aeusserlich. M. f. unguent.

Cinæ flores. Zittwersamen. Von Artemisia maritima (Composite.) Wirksamer Bestandtheil ist das Santonin. Zu 1,0—2,5 mehrmals täglich in Pulver- und Latwergenform. (3 × täglich 1 Theelöffel voll mit etwas Syrup.) (10,0 = 10 Pf.)

- 172) Rp. Flor. Cinæ 5,0.
 Rad. Jalapæ 1,0.
 Mellis rosati 25,0.

M. f. Electuarium.
 D. S. Auf 3 Mal zu nehmen.
 (Ascaris lumbricoides.)

Santonin. Farblose Krystalle, schwer in Wasser, leicht in fetten Oelen löslich. Innerlich in Verbindung mit Abführmitteln zu 0,02—0,1 in Pulvern und als Wurmkekuchen: Trochisci Santonini zu 0,05 und 0,025, 2—3 pro Tag. (1,0 = 5 Pf.)
 ad 0,1 pro dosi! — ad 0,3 pro die!

- 173) Rp. Santonini 0,02—0,05. 174) Rp. Santonini 0,1—0,2.
 Calomel. 0,01—0,03. Olei Ricini 60,0.
 Sacch. alb. 0,5. M. D. S. 3 × täglich 1 Thee-
 M. f. pulv. D. t. dos. VI. bis Kaffeelöffel.
 S. Morg. u. Abs. 1 Pulv.
 (Anthelminthicum, bes. bei Kindern.)

†**Cocæ folia.** Von Erythroxyton Coca. Die von Südamerika zu uns gelangenden braunen Blätter sind weniger wirksam als die hellgrünen. Dieselben dienen zur Gewinnung des Cocains. Sie werden von den Indianern in grossen Mengen verbraucht, weil durch sie Hunger- und Ermüdungsgefühl unterdrückt wird. Sie stehen dem Kaffee und dem Thee in ihrer Wirkung nahe und werden gegen Magenleiden, Ermüdung, Morphinismus u. s. w. empfohlen. Aeusserlich in Substanz als Kaumittel, innerlich im Infus und Decoct (5,0—10,0 : 200,0), Pulverform (0,5—1,0 mehrmals) und als Thee (1 Thee- bis 1 Esslöffel auf 1 Tasse). Auch in Form von Cigaretten. (Leyden.) 10,0 = 20 Pf.

†**Extractum Cocæ (fluidum).** Innerlich in Mixtur zu 1,0—3,0. (1,0 = 10 Pf.)

†**Vinum Coca.** (2—3 Esslöffel *pro die* zu nehmen.)

175) Rp. Inf. fol. Cocæ 5,0—10,0 : 180,0.
Syrup. cort. Aurant. 20,0.
D. S. 2ständl. 1 Esslöffel.

176) Rp. Extr. Coc. fluid. 30,0.	177) Rp. Extr. Coc. fluid. 30,0.
Natr. carb. 2,5.	Natr. carbon. 2,5.
Aq. dest. 30,0—50,0.	Aq. Melissæ 100,0.
M. D. S. 1—2 × tägl. 1 Thee-	Vini Xerens. od. Tinct.
löffel auf 1 Tasse	Chin. 10,0.
Zuckerwasser oder	Elaeosach. Citri 5,0.
Thee.	M. D. S. 3 × tägl. 1 Esslöffel.
(Nervosität, Hysterie, Migräne etc.) Leyden.	

†**Cocainum muriaticum.** Weisse, in Wasser leicht lösliche, bitter schmeckende Krystalle. Vielfach in Gebrauch als Anæstheticum und Analgeticum (Einträufelung weniger Tropfen einer 2% Lösung) in der ophthalmologischen Praxis. In stärkerer Concentration (5—20% Lösung) macht es die Nasen-, Rachen- und Kehlkopfschleimhaut unempfindlich. Innerlich (in wässriger Lösung von 0,1—0,15 : 10,0; 3 × täglich 15—20 Tropfen) bei Gastralgie, Erbrechen, Morphiumsucht, Seekrankheit u. s. w. Zur subcut. Injection (0,1—1,0 : 10,0) $\frac{1}{2}$ —1 Spritze. Zu Suppositorien (0,03—0,05 : 2,0 Butyr. Cacao) 0,1 = 20 Pf. Bedenkliche Nebenwirkungen und Vergiftungserscheinungen nicht selten. Antidot: Amylnitrit. Von andern Salzen sind noch dargestellt:

Cocainum hydrobromicum und Cocainum tannicum,
Cocainum salicylicum, Cocainum phenylicum.

178) Rp. Cocain. mur. 0,2.
Aq. destill. 10,0.
D. S. Aeusserlich zum Einträufeln in den
Conjunctivalsack und zu Injectionen
in die Urethra und Vagina.

179) Rp. Cocain. mur. 0,1.	180) Rp. Cocain. mur. 0,03—0,05.
Aq. amygdal. amar. 10,0.	Butyr. Cacao 2,0.
M. D. S. Mehrmals täglich	M. f. supposit. D. tal. Dos. V.
10—15 Tropfen.	(Tenesmus.)
(Gastralgie, Erbrechen, Keuchhusten.)	

181) Rp. Cocain. mur. 0,4.

solve in solut. Hydrarg. bichlorat. (1:10,000) 10,0.

M. D. S. Zu subcut. Injection.

Hiervon $\frac{1}{4}$ —1 Spritze zu injiciren.

(Zur localen Anästhesie, Morphinismus.)

Codeinum. (Alkaloid des Opiums). Farblose oder weisse Krystalle, löslich in 80 Theilen Wasser. Wirkt ähnlich dem Morphin, von welchem 0,01 einer Codeindosis von 0,025—0,03 entspricht. Verabreichung in Pulverform oder Mixtur. 0,1 = 15 Pf.

ad 0,05 pro dosi! — ad 0,2 pro die!

Coffeinum. Weisse, glänzende Nadeln; löslich in 80 Th. Wasser, 50 Th. Weingeist. Innerlich in Pulver, Pillen und Pastillen zu 0,05—0,2 (gegen Hemicranie). 1,0 = 15 Pf. — Präparat: *Pasta Guarana*. S. d. ad 0,2 pro dosi! — ad 0,6 pro die!

182) Rp. Coffeini 0,1.

Sacch. alb. 0,5.

M. f. pulv. D. tal. dos. II.

S. 3stdl. 1 Pulver.

183) Rp. Coffeini 0,6.

Extr. Gramin. q. s.

ut f. pilul. Nr. 10.

D. S. 2stdl. 1 Pille.

(Hemicranie.)

†**Coffeinum hydrobromicum.** Farblose Krystalle. Anwendung: Wie das Vorige.

†**Coffeinum natro-benzoicum**, 1,0 = 15 Pf.,

†**Coffeinum natro-cinnamylicum** und

†**Coffeinum natro-salicylicum.** Von diesen 3 Doppelverbindungen enthalten die erste etwa 50%, die letzten 60% Coffein. Sie sind leicht löslich und zur subcut. Injection geeignet. Anwendung in grossen Dosen (0,8—2,0 pro die) als Ersatzmittel der Digitalis bei Herzaffectionen mit Schwächeständen des Herzens und als Diureticum bei Hydrops. (1,0 = 15 Pf.)

184) Rp. Coffein. natro-benzoic.

0,2—0,5.

Sacch. alb. 0,3.

M. f. pulv. D. tal. dos. X.

S. 3 × täglich 1 Pulver.

(Migraene, Herzaffection, Hydrops.)

185) Rp. Coffein. natro-benzoic.

2,0.

Aq. destill. 10,0.

D. S. $\frac{1}{3}$ —1 Spr. zu injiciren.

Colchici semen. Zeitlosensamen. In Pulverform zu 0,05—0,2. (Selten.)

Dafür:

Tinctura Colchici. (Sem. Colch. 1, Spirit 10). Zu 20—30 Tropfen 3—4 Mal täglich (10,0 = 10 Pf.)

ad 2,0 pro dosi! — ad 6,0 pro die!

Vinum Colchici. Ebenso (10,0 = 20 Pf.)

186) Rp. Tinct. Colchici 15,0.

Tinct. Opil croc. 2,0.

M. D. S. 3 × tägl. 15 Tropfen.

(Antirheumaticum.)

†**Colchicinum.** Amorphes, in Wasser leicht lösliches Pulver. Innerlich in Pillen oder in subcutaner Injection zu 0,001—0,003 1 bis 3 × täglich. (0,01 = 5 Pf.)

187) Rp. Colchicini 0,02.

Aq. destill. 10,0.

D. S. Zur subcut. Injection $\frac{1}{2}$ —1 Spritze.

(Gegen hartnäckigen Rheumatismus u. Ischias.)

Cold-cream = *Unguentum leniens*. (10,0 = 20 Pf.)

Colloidium. (Auflösung von Schiessbaumwolle 2 Th. in Aether 42 Th. und Weingeist 46 Th.) 10,0 = 10 Pf.

Colloidium elasticum. (49 Th. Colloidium und 1 Th. Ricinusöl.) 10,0 = 10 Pf.

Colocynthis fructus. Coloquinthen. Von *Citrullus Colocynthis*. In Pulvern und Pillen von 0,01—0,3. (1,0 = 5 Pf.)
ad 0,3 pro dosi! — ad 1,0 pro die!

Extractum Colocynthis. Trockenes Extract. Innerlich von 0,005—0,05 mehrmals täglich in Pillen. (0,1 = 5 Pf.)
ad 0,05 pro dosi! — ad 0,2 pro die!

Tinctura Colocynthis. Zu 10—20 Tropfen, 2—3 × täglich. (10,0 = 15 Pf.)
ad 1,0 pro dosi! — ad 3,0 pro die!

188) Rp.	Fruct. Colocynth.	189) Rp.	Extr. Colocynth.
	0,05—0,1.		Extr. Rhei aa 0,5.
	Sacch. alb. 0,5.		Succ. Liquirit. q. s.
	M. f. pulv. D. t. dos. VI.		ut f. pilul. Nr. 20.
	S. 2stdl. 1 Pulv.		D. S. Morgens 1—2 Pillen.
	(Gegen Obstipation und Hydrops.)		

Colombo radix. Vom *Jateorrhiza Calumba*. Zu 0,5—2,0 mehrmals täglich in Pulver, im Infus oder Decoct. (10,0 subt. pulv. = 15 Pf.)

190) Rp. Decoct. rad. Colomb. 10,0 : 180,0.

(Extr. Opii 0,1.)

Syrup. cort. Aurant. 20,0.

M. D. S. 2stdl. 1 Essl.

(Antidiarrhoicum.)

Condurango cortex. Innerlich im Decoct. (15,0 : 180,0). 10,0 = 20 Pf.

† *Vinum Condurango*. (Cort. Cond. 4., Vin. Xerens. 100.) 1/2 bis 1 Esslöffel mehrmals täglich zu nehmen.

† *Extractum Condurango*. Zu 0,3—0,5. (1,0 = 40 Pf.)

191) Rp.	Cort. Condurango 15,0.	192) Rp.	Extr. Condurango 2,0.
	Macera per horas XII		Chloral. hydr. 0,5—2,0.
	cum aqua font. 360,0.		Aq. dest. 180,0.
	Coque usque ad remanent.		Syr. cort. Aur. 20,0.
	180,0.		M. D. S. 2—3stdl. 1 Essl.
	Syr. cort. Aurant. 20,0.		Unna.
	M. D. S. 2—3 × tägl. 1—2 Essl.		
	(Stomachicum.)		

† **Conium hydrobromicum**. Farblose, in Wasser leicht lösliche Krystalle. Innerlich zu 0,002—0,005 mehrmals täglich in Lösung und subcut. Injection. Wirkt dem Curare ähnlich, daher bei Tetanus empfohlen (Demme). Es giebt verschiedene Präparate. Daher Vorsicht.

† **Convallamarin**. Glykosid aus *Convall. majalis*. Nicht zu empfehlen.

† **Convallaria majalis** und seine Präparate (Extract. Convall. u. Tinctur. Convall.) bei Herz- und Nierenaffectionen, besonders als Diureticum empfohlen. Ist indess durchaus nicht im Stande, die Digitalis zu ersetzen.

193) Rp. Inf. Convall. maj.

(0,3—0,6 : 180,0.)

D. S. 3—4stündl. 1 Esslöf.

†Cortex Coto. Innerlich zu 0,3—0,5 in Pulver (Antidiarrhoicum). 10,0 = 25 Pf.

†Tinctura Coto. (1 : 9.) Mehrmals tägl. 20—30 Tropfen. (10,0 = 20 Pf.)

†Cotoinum. Glykosid aus Cortex Coto. Gelbes, in Wasser unlösliches, bei Zusatz von Alkalicarbonat leicht lösliches Pulver. Innerlich in Mixtur, Pulver, Kapseln oder Oblaten, in Dosen von 0,05—0,1 2—3 X täglich. (0,1 = 165 Pf.)

195) Rp. Cotoini 0,05—0,1.

Sacch. alb. 0,3.

M. f. pulv.

D. t. dos. V.

S. 2—3stündl. 1 Pulver.

196) Rp. Cotoini 0,15.

Ag. destill. 150,0.

Spirit. vini 10,0.

M. D. S. 2—3stündl. 1 Esslöf.

(Antidiarrhoicum.)

†Paracotoin. Alkaloid der Cotorinde. Viel schwächer wirkend als Cotoin. Innerlich zu 0,1—0,2 in Pulver. (1,0 = 85 Pf.)

†Cremor Tartari. Siehe Tartarus depuratus.

†Creolin. Schwarzbraune, syrupöse, nach Theer riechende Flüssigkeit. Aus englischer Steinkohle gewonnen. Als billiger und unschädlicher Ersatz der Carbonsäure und anderer Antiseptica und Antiparasitica zu innerlichem und äusserlichem Gebrauch empfohlen. Anwendung und Dosirung wie Acid. carbol. Im Handel kommen mehrere, ganz verschieden (zuweilen schädlich) wirkende Präparate vor. Deshalb Vorsicht. (10,0 = 10 Pf.)

Creosot. Siehe Kreosot.

†Crotonis chloral. hydrat. Siehe Butylehloral.

Crotonis oleum. Crotonöl. Aus dem Samen von Tiglium officinale (Euphorb.). Innerlich $\frac{1}{2}$ —1 Tropfen (am besten in 1 Esslöf. Ricinusöl). Aeusserlich als intensives Derivans zu Einreibungen. (1,0 = 5 Pf.)

ad 0,05 pro dosi! — ad 0,1 pro die!

197) Rp. Olei Croton. 0,1 (gtt. II).

Olei Ricini 60,0.

D. S. 1—2stündl. 1—2 Esslöf.

(Bleikolik, Heus.)

198) Rp. Olei Crotonis 1,0.

Glycerini 5,0.

D. S. Aeusserlich! Zum Einreiben.

(Starker Hautreiz.)

Cubebæ. (Bacca sive Fructus Cubebæ.) In Pulvern (Oblaten), Capseln und Pillen. Zu 1,0—5,0—10,0 mehrmals täglich, auch in Verbindung mit Balsam. Copaivæ s. d. (10,0 sub. pulv. = 45 Pf.)

Extractum Cubebæ. Dünnes, ätherisches, in Wasser unlösliches Extract. Zu 0,5—2,0 mehrmals täglich in Pillen und Capseln. (1,0 = 45 Pf.)

199) Rp. Pulv. Cubebæ. 50,0.

D. S. 3—4x tägl. $\frac{1}{2}$ —1 Theel. in Oblate zu nehmen.

(Gonorrhoe.)

†Cucurbitæ semina. Kürbissamen. (Bandwurmmittel.) Etwa 50—100 frische, von ihrer äusseren Hülle befreite italienische Kürbiskerne werden mit Zucker verrieben und (nach vorhergegangener längerer Fasten) mit Milch oder Wasser auf einmal genommen. Darauf eine Dosis Ricinusöl. Die einheimischen Kürbissamen sind bezüglich der wurmtreibenden Wirkung wenig zuverlässig.

Acet. Digitalis. Innerl. 10–30 Tropfen mehrmals tägl. (10,0 = 10 Pf.)
ad 2,0 pro dosi! — ad 10,0 pro die!

209) Rp. Acet. Digital. (10,0) 100,0.
Syrup. spl. 20,0.

M. D. S. 3–4stündl. 1 Esslöffel.

Leyden.

Extractum Digitalis. Dickes Extract. Innerlich zu 0,03–0,2 mehrmals täglich in Pillen oder Lösung. (1,0 = 20 Pf.)
ad 0,2 pro dosi! — ad 1,0 pro die!

Tinctura Digitalis. Innerlich zu 5–20 Tropfen mehrmals täglich.
(10,0 = 10 Pf.)

ad 1,5 pro dosi! — ad 5,0 pro die!

210) Rp. Tinct. Digital. 5,0.
Aq. Amygd. amar. 7,5.
M. D. S. 3 × tägl. 10–20
Tropfen.

(Gegen Herzklopfen.)

Oppolzer.

211) Rp. Tinct. Digital.
Tinct. Scillae aa 7,5.

M. D. S. 3 × täglich 20–30
Tropfen.

(Hydrops.)

†Tinct. Digital. aeth. (Bedeutend stärker als die vorige Tinctur.)

†Digitalinum crystallisatum (Nativelle). Bis zu 0,001 pro die in
Pillenform. (0,1 = 10 Pf.)

212) Rp. Digitalini cryst. (Nati-
velle) 0,01.

Pulv. et Succ. Liquirit.

q. s.

ut f. pilul. Nr. 20.

D. S. 2 × tägl. 1 Pille (à 0,0005
= 1/2 mgm.)

213) Rp. Digitalini cryst. (Nati-
velle) 0,01.

Pulv. et Succ. Liquirit.

q. s.

ut f. pilul. Nr. 40.

D. S. 3 × tägl. 1 Pille (à 0,00025
= 1/4 mgm.)

Dowersches Pulver. Siehe Ipecacuanha und Opium.

†Duboisinum und Duboisinum sulfuricum. Von Duboisia myoporoides
(Solaneae). Wirkung und Dosis wie Hyoscyamin. (Mydriaticum.)
0,1 = 85 Pf.

†Eichelcacao (Dr. Michaelis'). Tonisirendes Nahrungsmittel. Besonders ge-
eignet bei chronischer Diarrhoe (von Kindern und Erwachsenen).
Als Antidiarrhoicum nur mit Wasser, als tägliches Nutriens mit
Milch zu kochen.

Elæosacchara. Oelzucker. Enthalten auf 2,0 Zucker 1 Tropfen äth.
Oel. Dienen als Pulverconstituens und Geschmackscorrigens.

Elixir e succo Liquiritiae. Siehe Ammoniakpräparate.

Emplastra. Pflaster:

1) Emplastrum adhaesivum. Heftpflaster. 100 □cm = 10 Pf.

2) †Emplastrum adhaesivum Anglicum. Englisches Heftpflaster,
(10 □cm = 5 Pf.)

3) †Emplastrum Belladonnae. (Cera flav., tereb., Ol. olivar. u. fol.
Bellad.) 10,0 = 20 Pf.

4) Emplastrum Cantharidum ordinarium und emplastr. Cantharid.
perpet. (s. Cantharides.) 10,0 = 35 und 20 Pf.

5) Emplastrum Cerussae. Bleiweisspflaster. Siehe Plumb. carbon.
(10,0 = 10 Pf.)

Emplastra — Evonymin.

- 6) **Emplastrum Hydrargyri.** Siehe Hydrargyrum. (10,0 = 25 Pf.)
 7) **Emplastrum Lithargyri.** (*sive diachylon*) Bleipflaster. (Litharg., Ol. olivar., adeps. sull. ää.) (10,0 = 10 Pf.)
 8) **Emplastrum Lithargyri compositum.** Gummipflaster. (Empl. Litharg., Cera flav., Ammoniacum, Galbanum, Tereb.) (10,0 = 20 Pf.)

214) Rp. Emplast. Lithargyri comp.
 Olei Lini ää 15,0.

Liquefact. S. Auf Leder zu streichen.

(Gegen Fusschweisse.)

Hebra.

- 9) †**Emplastrum oxycroceum.** (Res. Pini, Cera flava, Colophon. Ammoniacum, Galbanum, Mastix, Myrrhe, Terpentiu u. Safran.) (10,0 = 40 Pf.)

- 10) †**Emplastrum Picis irritans.** Scharfes Pechpflaster. Euphorb. 3 Theile in Cera flav. u. Tereb. ää. 12 Theile u. Res. Pini 32 Theile. (10,0 = 15 Pf.)

- 11) **Emplastrum saponatum.** Seifenpflaster. (Empl. Litharg. simpl. 70, Cera flav. 10, Sapo med. 5, Camph. 1.) 10,0 = 20 Pf.

Emulsiones. Milchartige Flüssigkeiten, erzeugt durch Vermengung eines in Wasser unlöslichen, öligen oder harzigen Körpers mit einer schleimigen Substanz.

215) Rp. Olei Olivar. 16,0.
 Gumm. arab. pulv. 8,0.
 Syrup. simpl. 16,0.
 Aq. destill. 160,0.
 F. l. a. Emulsio.

(Emulsio oleosa. Form. M. B. erol.)

217) Rp. Camphor. trit. 1,0
 solv. in ol. olivar. 8,0.
 Pulv. Gummi arab. 4,0.
 Aq. dest. 100,0.

M. f. leg. art. Emulsio.

adde

Syrup. simpl. 20,0.

D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.

216) Rp. Semin. Papaveris 20,0.
 Aq. destill. q. s.
 F. l. a. Emulsio 185,0
 adde

Syrup. simpl. 15,0.

(Emulsio seminis Papaveris seu communis. Form. M. B. erol.)

218) Rp. Semin. Papaver. 20,0
 F. c.
 Decoct. cort. Chinae

10,0 : 180,0.

Emulsio.

Syrup. cort. Aurant. 20,0.

M. D. S. 2stld. 1 Esslöffel

Emulsio chinata.

Ergotin. S. Secale cornutum.

†**Erythrophloefn.** Neu empfohlenes locales Anæstheticum. Wegen bedenklicher Nebenerscheinungen ohne praktische Bedeutung.

†**Eucalyptus globulus.** (Fol.) In Pulverform (5,0—10,0 *pro die*) und Infus (2,0—5,0 : 100,0). 10,0 = 5 Pf.

†**Tinctura Eucalypti.** Innerlich zu 3—4 Theelöffeln in der Apyrexie (Intermittens). Ferner 3stündl. 5—8 Tropfen in Zuckerrwasser bei Keuchhusten (Witthauer). 10,0 = 15 Pf.

†**Eucalyptolum.** Innerlich zu 0,2—1,0 in Tropfen. Aeusserlich zu Inhalationen und desinficirenden Verbänden. 10,0 = 25 Pf.

†**Evonymin.** In Wasser unlösliches Pulver, von drastischer, dem Podophyllin ähnlicher Wirkung. Innerlich zu 0,1—0,3 (mit Zusatz von Extr. Belladon.) in Pillenform.

Extracta werden unterschieden:

- 1) in dünne von der Consistenz frischen Honigs. (Extr. Chinae aq., Extr. Cubebar., Extr. Filicis.)
- 2) in dicke Extracte, welche erkaltet sich nicht ausgiessen lassen. (Extr. Belladon., Extr. Digital., Extr. Gentian., Extr. Hyoscyam., Extr. Secalis. — Succus Līquirit. dep. u. A.)
- 3) in trockne Extracte, welche sich pulverförmig zerreiben lassen. (Extr. Aloës, Chinae spirit., Colocynth., Opii, Quassia, Rhei, Strychni.)

Extracta fluida. Siehe Seite 9.

†Extractum carnis Liebig. (Fleischextract.) $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel auf 1 Tasse warmen Wassers.

†Extractum Faba Calabarica. Siehe Calabarbohne.

†Extractum Malti. (Malzextract.) Theelöffelweise, rein oder in Milch, Bouillon, Bier, Wein, etc. (Malzextract von Schering kostet 75 Pf., c. ferro 1,00 die Flasche.) Auch in Verbindung mit Leberthran.

†Faba calabarica. Siehe Calabarbohne.

Ferrum-Präparate:

Antidotum Arsenici. (Liq. ferri sulf. oxyd. 100,0 Aq. 250,0 und Magnesia usta 15,0 mit Aq. 250,0). Anfänglich alle 10 Minuten, dann viertel- und halbstündlich 2—4 Esslöffel (in warmem Wasser) und darüber zu nehmen. (Bei Arsenikvergiftung.)

Chininum ferro-citricum. Innerlich zu 0,05—0,2—0,5 mehrmals täglich in Pulver, Pillen oder Lösung. 1,0 = 10 Pf.

219) Rp. Chinini ferro-citrici 1,0	220) Rp. Chinini ferro-citrici 0,1.
solve in	Sacch. alb. 0,5.
Vin. hispan. 250,0.	M. f. pulv. D. t. dos. Nr. 10.
D. S. Mehrmals tägl. 1 Essl.	S. 2—3 stündlich 1 Pulver.
	(Anämie, Chlorose, Reconvalescenz etc.)

Ferrum carbonicum saccharatum. Zu 0,1—0,5 mehrmals täglich in Pulvern oder Pillen. (10,0 = 10 Pf.)

†Ferrum citricum oxydatum. Wie das vorhergehende Präparat. Nach Glaevecke auch zur subcut. Injection (1,0:10,0) geeignet. Dosis 0,1, d. h. eine volle Pravaz'sche Spritze (für Kinder entsprechend weniger). 1,0 = 5 Pf.

†Ferrum dialysatum oxychloratum (nach Bravais). Innerlich zu 5—15 Tropfen mehrmals täglich. (10,0 = 20 Pf.)

Ferrum lacticum. Zu 0,1—0,5 mehrmals täglich in Pulvern und Pillen. (10,0 = 20 Pf.)

221) Rp. Ferri lactici 0,25.	222) Rp. Ferri lactici 3,0.
Sacch. alb. 0,5.	Succi Līquirit. q. s.
M. f. pulv. D. t. dos. X.	ut f. pilul. Nr. 50. Consp.
S. 2×tägl. 1 Pulv.	D. S. 3×tägl. 2—4 Pillen.
	(Anämie, Chlorose.)

†Ferrum peptonatum. Innerlich zu 0,1—0,5 in Pillenform. (1,0 = 5 Pf.)

†Ferrum pyrophosphoricum oxydatum. Zu 0,1—0,5 mehrmals täglich in Pulvern oder Pillen. (10,0 = 15 Pf.)

Ferrum reductum. Zu 0,05—0,2 mehrmals täglich in Pulvern.
(Leichtest verdauliches Eisenpräparat. 10,0 = 20 Pf.)

Ferrum sulfuricum. In Wasser (mit grünlicher Farbe) sich leicht lösendes Pulver. Innerlich von 0,05—0,5 mehrmals in Pillen, Pulver, Lösung. Aeusserlich zu Bädern (30,0—50,0) s. d. 10,0 = 5 Pf.

- | | |
|--|---|
| <p>223) Rp. Ferri sulfurici.
Kalii carbonici aa 15,0.
Tragacanth. pulv. 2,0.
Fiat massa, aquae pauxillo
form. pilul. Nr. 100.
Blaud'sche Eisenpillen.
(Form. Magist. Berol.)</p> | <p>224) Rp. Ferri sulfurici
Sacch. alb. aa 10,0.
Kal. carbon. 5,0.
Magnes. usta 0,5.
Pulv. Rad. Althae. 0,5.
Glycerini q. s. ut f.
Massa, e qua forma
Pil. Nr. 150.
D. S. 3×tägl. 1—2 Pillen.</p> |
|--|---|

†**Liquor Ferri albuminati (Drees).** Sehr empfehlenswerthes Eisenpräparat. 3×tägl. 1 Theel. (Für Kinder die Hälfte.)

Liquor Ferri sesquichlorati. Gelbbraune (10% Eisen enthaltende) Flüssigkeit. Innerlich zu 2—4 Tropfen verdünnt mehrmals täglich; äusserlich (1,0—3,0 : 100,0) als Inhalations- und Verbandmittel. (Hæmostaticum.) (10,0 = 5 Pf.)

- | | |
|--|---|
| <p>225) Rp. Liq. Ferri sesquichlor.
10,0.
D. S. 1—2 Tropfen in 1 Essl.
Haferschleim. Anfangs
1/2stdl., dann 1/3—2stdl.
(Stypticum, Darmblutungen
bei Typhus, etc.)</p> | <p>226) Rp. Liq. Ferri sesquichl. 3,0.
Aq. Cinnamomi 12,0.
M. D. S. 5—20 Tropfen auf
1 Glas Wasser.
(Hæmatemesis, Hæmoptoe, Darm-
blutung, Diphtherie.)</p> |
|--|---|

Syrupus Ferri jodati. Jodeisensyrup. (100 Th. enthalten 5 Th. Jodeisen.) Zu 1,0—5,0 mehrmals täglich in Mixturen. (10,0 = 20 Pf.)

- 227) Rp. Syrup. Ferri jodati 20,0.
Syrup. simpl. 80,0.
M. D. S. 3×tägl. 1 Thee- bis 1 Esslöffel.
(Scrofulose.)

Tinctura Ferri acetici ætherea. (10,0 = 15 Pf.)	} Zu 20—30 Tropfen. 3—4×täglich.
Tinctura Ferri chlorati ætherea, 10,0 = 10 Pf.)	
Tinctura Ferri pomata. (10,0 = 15 Pf.)	

- 228) Rp. Tinct. Ferri acet. æth.
oder
Tinct. Ferri pomat.
Tinct. amar. aa 15,0.
M. D. S. 3×tägl. 1/3—1 Theelöffel.
(Anæmie, Chlorose, etc.)

†**Tinctura Ferri comp. Athenstaedt.** Aromatische Eisentinctur. Angenehm aromatisch schmeckendes, 0,2% metallisches Eisen enthaltendes Präparat. Dosis für Erwachsene: 3×täglich (bei oder nach dem Essen) 1 Esslöffel, für Kinder entsprechend weniger. 1 Flasche (= 500,0) kostet 2 Mk.; 100,0 = 50 Pf.

†**Pyrophosphorsaures Eisenwasser.** Täglich 1 Flasche.
Eisen- und Stahlwasser. Siehe Bäder und Brunnen.

Filicis rhizoma. Farnwurzel. Zu 4,0—12,0 in Pulver, Decoct, Latwerge, auch als Zusatz zu Cort. rad. Granati. (10,0 = 10 Pf.)

Extractum Filicis. Dünnes Extract. Zu 2,0—8,0 auf 2—3 mal in Pillen, Latwerge oder Capseln à 1,0—2,0 und 5,0 zu nehmen. Bei Verwendung desselben ist zu beachten, dass es, je nach Alter und Abstammung, verschieden wirkt. Vom französischen Extractum Filicis dürften 10,0, vom deutschen 6,0—8,0 und vom frischen russischen (Wolmarensen) 1,0—2,0 die erforderliche Gabe sein. (1,0 = 35 Pf.)

229) Rp. Rad. Filicis 4,0.
D. t. dos. Nr. V.
S. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ stdl. 1 Pulv.

230) Rp. Extr. Filicis 10,0.
Olei Ricini 20,0.
D. S. In 2 Portionen innerhalb 1 Stunde z. nehm

(Anthelminthicum.)

†**Fleischklystier:** 150,0 Rindfleisch und 50,0 Kalbspancreas werden fein geschabt, mit 50,0 Wasser verrieben, auf 40° C erwärmt und in den (zuvor gereinigten) Darm injicirt.

Frangula cortex. Faulbaumrinde. Von Rhamnus Frangula. In Decoct 15,0—30,0 : 200,0 und als Species. (1 Esslöffel zu 3 Tassen Wasser, auf 2 einkochen.) 10,0 = 5 Pf.

231) Rp. Cort. Frangul. 25,0.
Coq. cum aq. ad Col. 150,0.
Inspiss. ad 25,0.
Refrigerat. adde
Spir. vini dil. 20,0.
D. S. 1 Kaffeel. voll auf 1 Glas
Zuckerwasser (Abends).

232) Rp. Decoct. cort. Frangul. (25,0) 150,0.
Natrii sulf. 20,0.

M. D. S. Früh und Abends
1 Weinglas voll zu
nehmen.
(Chronische Verstopfung.)

Gelsemintinctur. Siehe Tinctura Gelsemii sempervirentis.

Gentiana radix. Infus od. Decoct 5,0—20,0 : 200,0 (Amarum). 10,0 = 5 Pf.

Extract. Gentianae. Dickes Extract. Pillenconstituens und als Zusatz (0,5—1,5) zu Solutionen von Natr. bicarb. (1,0 = 5 Pf.)

Tinctura Gentianae. Zu 20—30 Tropfen mehrmals tägl. (10,0 = 15 Pf.)

Glandula Lupuli. Siehe Lupulin.

Glycerinum. Innerlich thee- bis esslöffelweise (bis 100,0 und darüber); ferner zu Pinselungen und Inhalationen. Auch zu stuhlberfördernden analen Einspritzungen (1,5—3,0) und in Form von Glycerin-Suppositorien (1,0—2,5) an Stelle von Oidtmanns Purgatif. 100,0 = 55 Pf.

Unguentum Glycerini. (1 Th. Tragacanth, 5 Th. Weingeist, 50 Th. Glycerin) 10,0 = 20 Pf.

233) Rp. Glycerini puri 20,0—50,0.
Aq. font. 1000,0.
Acid. citrici oder tartarici 5,0.
M. D. S. Im Laufe des Tages zu trinken.
(Diabetes mell.)
Schultzen.

234) Rp. Glycerini puri
Aq. Menth. pip. aa 100,0.
Kreosoti 1,5.
M. D. S. 3—4 x tägl. 1 Theelöffel.
(Tuberculosis pulm., Lungengangrän.)

Granati cortex. Granatrinde. Von *Punica Granatum*. Im Decoct (nach vorhergegangener 12stündiger Maceration) 80,0—50,0 : 300,0. Das wirksame Princip der Granatrinde ist das *Pelletierin*. S. d. (10,0 = 15 Pf.)

235) Rp. Cort. Granat. 30,0
Macera cum aq. frigid. 200,0.
per horas XII; dein coque ad
remanent. colat. 150,0.
adde Extr. Filicis 2,0.
Syrup. Zingib. 20,0.

M. D. S. Morgens (in halbstündl. Pause) zu 3 Malen zu nehmen.
(Anthelminthicum.)

†**Grindelia robusta.** Die krautigen Stauden der in Californien einheimischen Pflanze (Composite) werden zur Darstellung von Asthmacigaretten und des

†**Extractum Grindellae fluidum** verwandt. Innerlich zu 1,0—3,0. (Asthma.)

†**Guajakol.** Farblose, stark lichtbrechende, in Wasser wenig, in Alkohol leicht lösliche Flüssigkeit. Wirksamer Bestandtheil des Kreosots, an dessen Stelle neuerdings in gleicher Dosis empfohlen (Penzoldt, Sahli, Fräntzel). 1,0 = 15 Pf.

236) Rp. Guajakol. 1,0—2,0. 237) Rp. Guajakol. 13,5.
Aq. destill. 180,0. Tinct. Gentian. 30,0.
Spirit. vini 20,0. Spirit. vini rectif. 250,0.

M. D. S. in vitro nigro.
S. 2—3 × tägl. 1 Thee-
bis 1 Esslöffel in 1 Glas
Wasser nach der Mahl-
zeit zu nehmen.

Vini Xerensis q. s. ad
1000,0.
M. D. S. 2—3 × tägl. 1 Essl. in
1 Weinglas Wasser.
Fräntzel.

Gummi arabicum. Zu 2,0—5,0 mehrmals in Pulver, Lösung, Emulsion, Clysmen. (10,0 = 35 Pf.)

Mucilago Gummi arabici. (1 Th. Aq., 2 Th. Gummi arab.) Zur Pillenbereitung und als Zusatz zu scharfen Stoffen. 10,0 = 15 Pf.

Pulvis gummosus (bestehend aus Gummi arab. 3 Th., rad. Liquirit. 2 Th. und Sacchar. 1 Th.). 1,0 = 5 Pf.

238) Rp. Gummi arab.
Sacchar. aa 15,0.
Aq. destill. 170,0.
M. D. S. 2stdl. 1 Essl.

(Mixture gummosa. — Typhus, Diarrhoe, etc.)

Gutti. Gummi-resina Gutti. Das Gummiharz der *Garcinia Morella*. In Pulvern, Pillen, Emulsionen (1,0 = 5 Pf.). (Drasticum.)
ad 0,3 pro dosi! — ad 1,0 pro die!

Hallersches Sauer. Siehe Acid. sulf.

†**Hamamelis Virginiana.** Cortex *Hamamelis Virginiana*. Witsch hazel. Anwendung findet das

†**Extractum Hamamelis fluidum.** Innerlich und äusserlich zu 1—2 Theelöffeln gegen Hämorrhoidalblutungen und hämorrhoidale Affectionen. Auch bei Haemoptoë mehrmals 30—40 Tropfen. (10,0 = 20 Pf.)

Im Handel kommt auch ein aus der Rinde gewonnenes Destillat «Hazeline» vor.

†Herba Adonis vernalis. Siehe Adonis vernalis.

Hoffmann's Tropfen. Siehe Aether resp. Spiritus athereus.

†Homatropin. Siehe Atropin.

Hydrargyrum-Präparate:

Hydrargyrum. (Mercurius vivus). Innerlich (bei Neus) 1—2 Esslöffel (!). 10,0 = 20 Pf.

Emplastrum Hydrargyri. (Empl. Plumb., Cer. flav., Hydrargyr. Terebinth.) 10,0 = 25 Pf.

Unguentum Hydrargyri cinereum. (*Unguentum Neapolitanum.* Graue Salbe.) (13 Th. Schweineschmalz, 7 Theile Hammeltalg, 10 Th. Queks.) 2,0—4,0 täglich (an verschiedenen Stellen) einzureiben. (Inunctions- oder Schmierkur gegen Lues.) (10,0 = 25 Pf.)

Hydrargyrum chloratum. Calomel. Quecksilberchlorür Hg_2Cl_2 . In Wasser und Weingeist unlösliches, weisses, schweres Pulver. Innerlich zu 0,01—0,2 mehrmals täglich in Pulvern und Pillen. Aeusserlich als Streupulver und in subcut. Injection 0,5—1,0 : 10,0. (Cave: Application von Calomel aufs Auge bei gleichzeitiger innerer Darreichung von Jodkalium.) 1,0 = 5 Pf.

239) Rp. Calomelan. 0,0075—0,015.
Sacch. lact. 0,3.
M. f. pulv. D. t. dos. X.
S. 2—3ständl. 1 Pulv.
(Durchfall und Brechdurchfall der Kinder.)

241) Rp. Calomelan. 0,06.
Rad. Jalapæ 0,3.
Sacch. alb. 0,5.
M. f. pulv. D. tal. dos. VI.
S. 2ständl. 1 Pulv.
(Laxans.)

243) Rp. Calomelan. 0,002—0,01.
Sacch. lact. 0,3.
M. f. pulv. D. tal. dos. X.
S. 2—3 × tägl. 1 Pulver.
(Syphilis der Kinder.)

240) Rp. Calomel. 0,2.
Sacch. lact. 0,5.
M. f. pulv. D. t. dos. X.
S. 4 × tägl. 1 Pulver.
(Bei Herzaffection als Diureticum.)

242) Rp. Calomel.
Stibii sulf. aurant. aa 0,01.
Sacch. alb. 0,3.
M. f. pulv.
D. tal. dos. Nr. VI.
S. 2ständl. 1 Pulver.

244) Rp. Calomel 0,015.
Pulv. Magn. cum Rheo oder
Natrii bicarb. 0,15.
Sacch. alb. 0,3.
M. f. pulv. D. t. dos. VI.
S. 2ständl. 1 Pulver.

Hydrargyrum bichloratum. Sublimat. Quecksilberchlorid. $HgCl_2$. Weisse Krystalle, in 16 Th. Wasser löslich. In Pillen (Dzondi), in Solution zu Waschungen, auch zur Wunddesinfection (1,0 : 1000,0). Wässrige Lösung reagirt sauer, wird durch Kochsalz neutral. Daher sind den Sublimatlösungen zweckmässig gleiche Mengen Kochsalz zuzusetzen. Zur raschen Bereitung von Sublimatlösungen bestimmter Stärke werden von Angerer comprimirt Pastillen aus gleichen Theilen Sublimat und Chlornatrium empfohlen. In subcut. Injection 0,1 : 10,0; zu Inhalationen (0,1 : 100,0) und zu Einspritzungen in die Urethra (0,01 : 200,0) bei Gonorrhoe. 10,0 = 20 Pf.

ad 0,03 pro dosi! — ad 0,1 pro die!

