

- 356) Rp. Natrii bicarb. 20,0. 357) Rp. Sol. Natrii bicarbon.
 Elaeos. Menth. 5,0. 5,0—10,0 : 180,0.
 M. f. pulv. D. in scat. Extract. Gentianæ
 S. 3 × tägl. 1 Messerspitze 0,5—1,5.
 — 1 Theelöffel. D. S. 2stdl. 1 Esslöffel.
 (Catarrh. gastr., acuter Gelenkrheumatismus, Diabetes, etc.)
 358) Rp. Sol. Natrii bicarb. 2,0—5,0 : 200,0.
 D. S. Aeusserlich zu Waschungen des Kopfes (bei
 Haarschwund). Pincus.

Natrium bromatum. Wie Kalium bromat. (10,0 = 15 Pf.)

Natrium chloratum. Kochsalz. Innerlich 1—2 Theelöffel (bei Hæ-
 moptoë, Migräne und Vergiftungen mit Argent. nitr., Epilepsie
 während der Aura). Aeusserlich zu Inhalationen in $\frac{1}{2}$ —2procentiger
 Lösung. Ferner zu Klystieren 1 Thee- bis 2 Esslöffel, und zu Bädern
 1—3 Kilogr. (100,0 = 5 Pf.)

Natrium iodatum. Wie Kalium iodatum. (1,0 = 10 Pf.)

†**Natrium lactium.** Dem Ricinusöl ähnlich aussehende Flüssigkeit.
 Früher in grossen Dosen (20,0—30,0) als Schlafmittel empfohlen
 (Preyer). Ist theuer (1,0 = 5 Pf.) und unzuverlässig.

Natrium nitricum. Natronsalpeter. Chilisalpeter. Leicht lösliche
 Krystalle. Zu 0,5—1,0 mehrmals in Pulvern und Solution. (10,0
 = 5 Pf.)

- 359) Rp. Sol. Natrii nitrici 5,0—10,0 : 200,0.
 D. S. 2stdl. 1 Esslöffel.
 (Antifebr., acuter Gelenkrheumatismus, etc.)

†**Natrium nitrosum.** Natriumnitrit. Weisses, in Wasser lösliches
 Pulver. Bei Angina pectoris und Asthma gerühmt. Die Anwendung
 des Mittels gebietet wegen bedenklicher Nebenwirkungen grosse
 Vorsicht. (10,0 = 20 Pf.)

- 360) Rp. Natrii nitrosi 2,0.
 Aq. destill. 120,0.
 D. S. 4 × täglich 1 Theelöffel.
 (Angina pectoris, Asthma, etc.)
 Lublinski.

Natrium salicylicum. Salicylsaures Natron. Weisses, in
 0,9 Th. Wasser lösliches Pulver. Innerlich zu 0,5—1,0
 mehrmals täglich (bis zu 10,0 pro die) in Pulver und
 Lösung. 10,0 = 50 Pf.

- 361) Rp. Natrii salicyl. 5,0. 362) Rp. Natrii salicyl. 6,0.
 Aq. dest. 180,0. Spirit. Sacchari 20,0.
 Syrup. Liquirit. 20,0. Syrup. succi Citri 40,0.
 M. D. S. 1—2-tündlich 1 Ess- M. D. S. Auf 3 Mal in 24
 löffel. Stunden zu nehmen.
 363) Rp. Sol. Natrii salicyl. 364) Rp. Natrii salicyl.
 (5,0—10,0) 180,0. Sacch. alb. aa 0,5.
 Tinct. Opii simpl. 1,0. M. f. pulv.
 Succ. Liquir. dep. 5,0. D. tal. dos. X.
 M. D. S. 2ständl. 1 Esslöffel. S. 1—2ständl. 1 Pulver.
 Acuter Gelenkrheumatismus, Dysenterie, Cystitis, Diabetes,
 Gallensteinkolik, Diphtherie, etc.)

(salbenartige) Masse über der Spiritusflamme erwärmt. Zur Behandlung der Syphilis genügen anfänglich 0,2—0,4, später 0,1 Cubikcentim., am Rücken oder an den Nates subcutan zu injiciren.

Oleum Crotonis. Siehe Crotonis oleum.

Oleum Jecoris Aselli. Leberthran. Mit 2 Theelöffeln täglich anzufangen und allmählich bis 3 Esslöffel zu steigen. (100,0 = 40 Pf.) (Scrofulose, Phthise, Rachitis. — Contraindicirt bei Fieber und gastrischen Störungen.)

Oleum Ricini. Siehe Ricini oleum.

†**Oleum Rusci.** Siehe Pix liquida.

†**Oleum Santali Ostindici.** Sandelholzöl. Gelbes, die Zunge stark reizendes Oel. Dosis: 3 × täglich 20 Tropfen, in Emulsion oder am besten in Gelatinecapseln mit 0,3 Sandelöl; 3 × täglich 2 — 3 Capseln zwischen den Mahlzeiten oder bald nach denselben zu nehmen. Antibiennorrhagicum. (1,0 = 15 Pf.)

Ononidis radix. Hauhechelwurzel. Innerlich im Decoct (20,0 bis 30,0 : 200,0) und zu Species. Siehe Species diuretica. (100,0 = 30 Pf.)

Opium. (Laudanum, Meconium.) Der in Kleinasien durch Einschnitte in die Kapsel von Papaver somniferum gewonnene, eingetrocknete Milchsaft. Braune, zähe Masse, in Wasser und Weingeist nur theilweise löslich. Aus dem Opium werden mehrere Alkaloide (Morphin, Codein, Narcein, Narcotin, Thebain) isolirt. Innerlich zu 0,01—0,15 mehrmals täglich in Pulver und Pillen. (1,0 = 10 Pf.)

ad 0,15 pro dosi! — ad 0,5 pro die!

Extractum Opii. Trockenextract. In derselben Form und Dosis wie das Vorige, aber theurer. (1,0 = 35 Pf.)
ad 0,15 pro dosi! — ad 0,5 pro die!

- | | |
|---|--|
| 368) Rp. Opii 0,01—0,03.
Sacch. alb. 0,5.
M. f. pulv. D. t. dos. X.
S. 2—3stdl. 1 Pulv. | 369) Rp. Opii puri 0,01—0,02.
Plumb. acet. 0,03.
Sacch. alb. 0,3.
M. f. pulv. D. t. dos. X.
S. 2stdl. 1 Pulv. |
| 370) Rp. Opii pulv. 0,3.
Succi Liquirit. dep.
q. s.
ut f. pilul. Nr. 30.
Consp. Lycopod.
D. S. 3 × tägl. 2 Pillen.
(Jede Pille = 0,01 Opium.) | 371) Rp. Opii pulv.
Rad. Ipecac. aa 0,03.
Sacch. alb. 0,3.
M. f. pulv. D. t. dos. X.
S. 2—3stdl. 1 Pulv.
(Statt Pulvis Doveri.) |
| 372) Rp. Stibii sulf. aurant. 0,06.
Opii puri 0,01.
Sacch. alb. 0,3.
M. f. pulv. D. t. dos. X.
S. 2—3stdl. 1 Pulv.
(Catarrh. bronch., Emphysem, Asthma etc.) | 373) Rp. Extr. Opii 0,1—0,2.
Aq. Foeniculi 30,0.
Elix. e Succ. Liquirit.
50,0.
M. D. S. 3—4 × tägl. 1 Theelöffel.
(Bronchialkatarrh.) |

Pulvis Ipecacuanhae opiatas. Siehe Ipecacuanha.

Tinctura Opii simplex s. thebaica. Zu 5—20 Tropfen mehrmals (1 Tropfen dieser Tinctur entspricht 0,005 Opium, mithin 20 Tropfen d. h. 1,0 = 0,1 Opium). (10,0 = 20 Pf.)
ad 1,5 pro dosi! — ad 5,0 pro die!

Tinctura Opii crocata. (Laudanum Sydenhami.) Dieselbe Form und Dosis wie in vorstehender Tinctur, aber theurer. (10,0 = 30 Pf.)

Tinctura Opii benzoica. Zu 20—50 Tropfen mehrmals, allein oder als Zusatz zu expectorirenden Mixturen. (100,0 enthalten 0,5 Opium.) 10,0 = 15 Pf.

374) Rp. Tinct. Opii simpl. 5,0.
Tinct. Nuc. vomic. 1,0.
Tinct. Valerian. 10,0.
æth. 10,0.
Ol. Menth. pip. gtt. III.
D. S. Bei Choleravorboten
15—30 Tropfen zu nehmen.
(Russische Cholera tropfen.)

375) Rp. Tinct. Opii crocat.
Tinct. Valer. æth.
Tinct. aromat. aa 5,0.
M. D. S. Mehrmals 15—20
Tropfen.

376) Rp. Tinct. Opii benz. 30,0.
D. S. Mehrmals 20—40 Tropf.

377) Rp. Tinct. Opii benzoic.
5,0—10,0.
Syrup. Althææ 60,0.
M. D. S. 2stl. 1 Theelöffel.

Opodeldoc. Siehe Camphora.

†**Panna.** (Die Wurzel eines afrikan. Farrenkrauts.) 8,0 morgens nüchtern zu nehmen. (Anthelminthicum.) 10,0 = 30 Pf.

†**Papayotinum.** Geruch- und geschmackloses, weissliches Pulver, welches in 5% Lösung Croupmembranen zum Schwinden bringt. (Rossbach.) (0,1 = 20 Pf.)

378) Rp. Papayotin. 1,0.
Aq. destill. 20,0.

D. S. Aeusserl. alle 10—15 Minuten vorsichtig zu pinsein.
(Diphtherie.)

†**Paracotoin.** Siehe Cotoin.

Paraffinum liquidum. 100,0 = 50 Pf.

Paraffinum solidum. 100,0 = 60 Pf.

Unguentum Paraffini. — Vaselin (Paraff. liq. 4. Paraff. sol. 1). Weisse, geruchlose und unzersetzbare Salbe. Zu Salben und Lini-
menten, besonders für chemisch differente Mittel (10,0 = 10 Pf.)

†**Paraldehyd.** Farblose, scharf schmeckende, dem Chloroform ähnlich riechende Flüssigkeit. (Erstarrt beim Abkühlen unter 10° zu Kry-
stallen.) Innerlich zu 2,0—6,0 pro dosi. (1,0 = 5 Pf.) Schlafmittel.

379) Rp. Paraldehyd. 4,0—6,0.
Aq. dest. 100,0.
Syrup. simpl. 10,0.

M. D. S. Die Hälfte auf 1 Mal zu nehmen.
(Schlaflosigkeit, Strychninvergiftung.)

†**Pasta Guarana.** (Aus dem Samen der *Paullinia sorbilis*; chocoladen-
ähnliche Masse zu 0,5—2,0 in Pulvern mehrmals täglich. Enthält
etwa 5% Coffein und Gerbsäure.) 1,0 = 5 Pf.

- Aqua Plumbi**, Bleiwasser. (Liq. Plumb. subacet. 1, Aq. 49.)
Zu kühlenden Umschlägen. (100,0 = 5 Pf.)
- Unguentum Plumbi**. (Liq. Plumb. subacet. 8. Adip. 92.) 10,0 = 10 Pf.
- Plumbum carbonicum**. Cerussa. Bleiweiss. Bestandtheil des Emplastrum Cerussae und des Unguentum Cerussae. (10,0 = 5 Pf.)
- Plumbum oxydatum**. Lithargyrum. Bleiglätte. Bestandtheil des Emplastrum Lithargyri und des Unguentum Diachylon (Empl. Lithargyr. u. Ol. Oliv. ää). 100,0 = 20 Pf.
- †**Plummersches Pulver**. Siehe Stib. sulf. aurant.
- Podophyllinum**. Von Podophyllum peltatum (Berberidee). Gelbliches Pulver. In Pulvern und Pillen zu 0,01—0,05 Morgens und Abends zu nehmen. (1,0 = 10 Pf.)
- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 394) Rp. Podophyllini 0,01—0,05. | 395) Rp. Podophyllini 0,5. |
| (Extr. Belladon. 0,01.) | Extr. Belladon. 0,2. |
| Sacch. alb. 0,5. | Pulv. rad. Liquirit. |
| M. f. pulv. | Succi Liquirit. q. s. |
| D. tal. dos. VI. | ut f. pilul. Nr. 20. |
| S. Täglich 1—2 Pulver. | S. 1—2 Pillen zu nehmen. |
| (Abführmittel — Gallensteinkolik.) | |
- †**Potio Choparti**. Siehe Balsamum Copaiva.
- Potio Riveri**. Saturation aus Acid. citric. 4. Aq. 90. Natri carb. 9. (Stündlich bis 2stündl. 1 Esslöffel bei fieberhaften Zuständen.)
- †**Propylaminum**. (Richtiger Trimethylamin.) Helle, nach Häringslake riechende Flüssigkeit. Innerlich zu 0,1—0,3 mehrmals in Tropfen oder Lösung. (1,0 = 5 Pf.)
- | | |
|-------------------------------|--|
| 396) Rp. Propylamini 1,0—2,0. | 397) Rp. Propylamin. 4,0. |
| Aq. dest. 150,0. | Aq. Menth. 45,0. |
| Elæosacch. Menth. 5,0. | Syrup. simpl. 15,0. |
| M. D. S. 2stdl. 1 Essl. | M. D. S. 3 × täglich 1 Theelöffel. (Chorea.) |
| (Gelenkrheumatismus.) | |
- Pulvis aërophorus**. (Natr. bicarb. 10, Acid. tartar. 9 und Saccharum 19.) Zu 1—2 Theelöffel auf 1 Glas Wasser. (10,0 = 15 Pf.)
- Pulvis aërophorus Anglicus**:
Natrii bicarb. 2,0.
und
Acid. tartar. 1,5. (1 Dosis = 10 Pf. Handverkauf.)
- Pulvis aërophorus laxans**. (Seydlitz Powder.)
Tartar. natron. pulv. 7,5.
Natrii bicarbon. 2,5.
und
Acid. tartar. 2,0. (1 Dosis = 25 Pf. Handverkauf.)
- Pulvis Curellæ**. S. Senna.
- Pulvis Doweri**. S. Opium.
- Pulvis gummosus**. S. Gummi arab.
- Pulvis Magnesiae o. Rheo**. S. Magnesia.
- †**Pulvis Plummeri**. S. Antimon.
- Pulvis salicylicus cum Talco**. S. Acid. salicyl.
- †**Pulvis temperans**. S. Kalium nitricum.
- †**Purgatif** (von Dr. Oidtman in Maastricht). Geheimmittel, dessen purgirende Wirkung hauptsächlich auf seinen Gehalt an Glycerin zurückzuführen ist.

†**Pyridin**. C_5H_5N . Bestandtheil des Steinkohlentheers. Farblose, an der Luft unter Verbreitung eines penetranten Geruchs verdunstende Flüssigkeit, die von Germain Sée gegen Asthma empfohlen worden ist. Man gießt 4–5 Gramm Pyridin auf einen Teller und lässt die Flüssigkeit in einem geschlossenen, etwa 25 Cubikmeter Luft enthaltenden Raum verdampfen. Die Einathmungen sollen 20–30 Minuten dauern und 3 Mal am Tage wiederholt werden. Auch 10–15 Tropfen auf ein Taschentuch geträufelt durch Mund und Nase zu inhaliren. Neuerdings auch innerlich zu 6–10 Tropfen (in Wasser) bei Herzkrankheiten (de Renzi) gerührt. — In 10% wässriger Lösung zu Pinselungen bei Rachendiphtherie versucht. (1,0 = 5 Pf.)

†**Pyrocin**. (Phenacetylhydrazin). Neuestes, noch nicht genügend erprobtes Antipyreticum. Weisses, schwer lösliches Pulver. Dosis 0,1–0,2 für Erwachsene; 0,03–0,05 für Kinder.

†**Quebracho** (Cortex und Lignum von Quebracho Aspidosperma [sprich: •Kebratscho•]). Bereitungsweise nach Penzoldt: 10 Gramm des fein pulverisirten Holzes (der Rinde) werden mit 100,0 starkem Weingeist (am besten absolutem) längere Zeit (am besten 8 Tage) wohlverkorkt stehen gelassen. Alsdann wird filtrirt, das Filtrat (auf dem Wasserbade) zur Trockne verdampft, in 20 Ccm. heissem Wasser gelöst und filtrirt. (1,0 = 5 Pf.)

Falls der Apotheker den Darstellungsmodus kennt, kann das kurze Recept einfach sein:

398) Rp. Extr. spirit. ex 10,0 ligni (cort.) Quebracho
solve in Aq. dest. 20,0.

D. S. 1–3 X tägl. 1–2 Theelöffel.

(Gegen Dyspnoe und Asthma bronchiale.)

Penzoldt.

†**Quillajae cortex**. Von Kobert als Ersatzmittel der rad. Senega empfohlen. Darreichung im Decoct. (5,0 : 200,0) oder Pulver.

399) Rp. Pulv. cort. Quillajae 0,1.
Pulv. Ipec. opiat. 0,5.

D. S. pulv. D. t. dos. VI.

3 X täglich 1 Pulver.

400) Rp. Decoct. cort. Quillajae (5,0) 180,0.
Syrup. Foeniculi 20,0.

D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.

(Bronchitis.)

Ratanhia radix. Enthält reichlich Gerbsäure (über 20%). In Pulvern zu 0,5–1,5 mehrmals täglich und im Decoct. (10,0 = 10 Pf.)

Tinctura Ratanhia. Zu 20–30 Tropfen mehrmals täglich.

†**Extractum Ratanhia**. Innerlich zu 0,5–1,5 mehrmals in Pillen und Mixturen. 1,0 = 15 Pf.

401) Rp. Decoct. rad. Ratanhia 10,0–15,0 : 180,0.
Syrup. Cort. Aurant. 20,0.

M. D. S. 2stündl. 1 Essl.

(Diarrhoe.)

402) Rp. Decoct. Salep 80,0.
Tinet. Ratanh. 1,0–2,0.

Syrup. Foenicul. 10,0.

D. S. Stündl. 1 Kinderlöffel.

(Kinderdiarrhoe u. Dysenterie.)

†**Resorcinum**. Meta-Dioxybenzol. $C_6H_4(OH)_2$. Weisses Krystalle, leicht löslich. Innerlich in Lösung und Pulver bis zu 0,5–3,0 täglich. Aeusserlich in $\frac{1}{2}$ –5% Lösung und Salbenform. (1,0 = 10 Pf.)

403) Rp. Resorcin. 30,0.

Aq. dest. 1000,0.

D. S. Zur Blasen- u. Magen-
spülung.

404) Rp. Resorcin. 5,0.
Vaselin. 20,0.

M. f. ungt. D. S. Zur Ein-
reibung. (Erysipel.)

Rhei radix. (Rhabarber.) Zu 0,1—0,5 mehrmals täglich in Pulver, Pillen und Infus (2,0—5,0 : 200,0). In Stücken (besonders poliklinisch). (10,0 = 35 Pf.)

Extractum Rhei. Trockenes Pulver. Innerlich zu 0,1—1,0 mehrmals täglich. (In Pillenform.) 1,0 = 20 Pf.

Extractum Rhei comp. (Rheum, Aloë, Sap. jalap.) Wie das Vorige. (1,0 = 15 Pf.)

Syrupus Rhei. Theelöffelweise (besonders für Kinder). *Cave:* Säuren.

Syrupus Rhei cum Manna. Wie das Vorige.

Pulvis Magnesic cum Rho. Siehe Magnesium.

Tinctura Rhei aquosa. (10,0 = 10 Pf.) } 2—3×täglich.

Tinctura Rhei vinosa. (10,0 = 25 Pf.) } 1 Theelöffel.

405) Rp. Inf. rad. Rhei 5,0—8,0 : 180,0.
Natr. bicarb. 5,0—10,0.
Elaeosach. Ment. pip. 2,0—5,0.
D. S. 2stdl. 1 Essl.

407) Rp. Extr. Rhei

Extr. Aloës

Sapon. jalap. ää 2,0.

Pulv. et Succ. Liq. q. s.

ut f. pilul. Nr. 40.

D. S. Morgens und Abends 2 Pillen.

(Abführpillen.)

406) Rp. Pulv. rad. Rhei

Natrii bicarb. ää 0,25.

Sacch. alb. 0,5.

M. f. pulvis. D. t. dos. VI.

S. 3×tägl. 1 Pulv.

(Catarrh. gastr., Icterus, etc.)

Ricini oleum. Ricinusöl. Aus dem Samen des *Ricinus communis* (Euphorbiaceae) erhaltenes Oel. Mehrmals täglich 1 Esslöffel mit Rothwein, Bouillon oder Kaffee. Zusatz von grobem Zuckerpulver (etwa die 3fache Menge) bis zur Bildung eines knetbaren Teiges verdeckt am besten den unangenehmen Geschmack des Ricinusöls (Stärke). Zweckmässig ist auch die Verabreichung in Gelatine-kapseln oder in Emulsion. Aeusserlich als Zusatz zu Klystieren (1—2 Esslöffel) (Diarrhoe, Obstipation, Dysenterie). 100,0 = 50 Pf.

408) Rp. Olei Ricini 50,0.

Gummi arab. 15,0.

F. c. Aq. dest. q. s.

Emuls. 200,0.

S. 1—2ständl. 1 Esslöffel.

†**Saccharin.** Benzoesäure-Sulfinid. Weisses, sehr süss schmeckendes Pulver. Kein Kohlehydrat, sondern Derivat der Benzoesäure. (Hergestellt von Fahlberg.) Schwer löslich in kaltem Wasser, leichter löslich in Alkohol und in Aether. Anwendung zum Süssen der Arzneien, besonders als Ersatz des Zuckers für die Nahrung der Diabetiker. 0,05 (in Tablettform) genügen zum Süssen einer Tasse Kaffee. (1,0 = 30 Pf.)

409) Saccharin-Syrup :

Saccharin. 10,0,

Natrii bicarb. 12,0,

Aq. destill. 1000,0.

410) Saccharin-Tabletten :

Saccharin. 3,0,

Natrii carbon. sicci 2,0.

Manniti 50,0.

Fiant pastilli Nr. 100.

Fischer.

Saccharum album. Rohrzucker. 10,0 = 5 Pf.

Saccharum lactis. Milchzucker. Weniger süß und schwerer in Wasser löslich als Rohrzucker. Gutes Constituens für schwer lösliche Pulver (wie Calomel etc.). Abführmittel für kleine Kinder. (10,0 = 15 Pf.)

Sal Carolinum factitium. Künstliches Carlsbader Salz. Siehe Natrium sulf.

Salep tubera. Als

Mucilago Salep. (Tub. Salep 1, Aq. 100.) Thee- bis esslöffelweise (als einhüllender Zusatz zu anderen Mixturen).

†**Salol.** (Salicylsäure-Phenyläther.) Weisses, krystallinisches, in Wasser unlösliches, in Alkohol und Aether leicht lösliches Pulver. Dasselbe ist von Nencki dargestellt und durch Sahli in die Praxis eingeführt worden. Es wird im Organismus in seine Componenten Salicylsäure und Phenol gespalten. Die Zerlegung erfolgt im Darm. — Anwendung als Antirheumaticum und Antisepticum. Auch bei Cystitis, ferner als Mund- und Gurgelwasser (6,0 : 100,0 Spirit., davon 1 Theelöffel auf 1 Glas Wasser) und als Streupulver empfohlen; desgl. zu 5% Salol enthaltenden Bongies. (Der Urin färbt sich bei Salolgebrauch bald dunkel.) Dosis: 1,0—2,0 in Pulver oder comprim. Tabletten (mit Amylumzusatz). — Tagesdose 6,0—8,0. 1,0 = 10 Pf.

<p>411) Rp. Salol. Sacch. lact. aa 1,0. M. f. pulv. D. tal. dos. X. S. 2stündlich 1 Pulver.</p>	<p>412) Rp. Salol. 1,0. Olei Menth. pip. q. s. ad odorem. M. D. t. dos. (ad chart. cerat) X. S. 2stündlich 1 Pulver.</p>
---	--

(Gelenkrheumatismus, Cystitis etc.)

<p>413) Rp. Salol. 2,0. Aq. Calcis Ol. Olivar. aa 9,0. M. D. S. Aeusserlich bei Verbrennungen.</p>	<p>414) Rp. Salol. 0,5—5,0. Amyli 50,0. S. Streupulver.</p>
--	---

Salviæ folia. Salbeiblätter. Von *Salvia officinalis* (Labiata). Im Infus 10,0—20,0 : 200,0 und zu Species. (10,0 = 10 Pf.)

415) Rp. Inf. fol. Salviæ 10,0—20,0 : 200,0.
D. S. 2stdl. 1 Essl.

(Gegen Nachtschweisse der Phthisiker.
Aeusserlich zum Gurgeln. Angina etc.)

Sambuci flores. Holunderblüthen. Von *Sambucus nigra* (Caprifoliacee). Zu Species und im Infus (1 Esslöff. auf 2 Fassen). (100,0 = 70 Pf.)
(Diaphoreticum.)

Santonin. Siehe *Cinæ flores*.

†**Sapo centrifugatus.** An Stelle von *Sapo medicatus*, weil allein sicher neutral und reizlos. Gut als Grundlage für medicinische Seifen.

Sarsaparillæ radix. Im Decoct 10,0—50,0 : 250,0. Hauptbestandtheil des Decoct. Zittmanni. (10,0 = 20 Pf.)

Decoctum Sarsaparillæ compositum fortius. Zittmann'sches Decoct.
(Sarsap., Senna, Liquirit., Anis, Fenchel, Alaun und Zucker.)
Morgens warm, Abends kalt $\frac{1}{2}$ Liter zu trinken. 500,0 = 135 Pf.

Decoctum Sarsaparillæ compositum mitius (enthält halb so viel
Sarsaparilla wie das vorige Präparat). 500,0 = 105 Pf. $\frac{1}{2}$ Liter
pro die. — Beide Decocte werden zusammengenommen. Morgens
 $\frac{1}{2}$ Liter des starken und Nachmittags $\frac{1}{2}$ Liter des schwachen
Decocts. Dabei knappe, reizlose Diät. (Syphilis.)

Scillæ bulbos (s. radix). Meerzwiebel. Innerlich zu 0,03—0,3 mehrmals
in Pulver und im Infus (5,0—10,0 : 200,0). 10,0 = 5 Pf.

Acetum Scillæ. Zu 20—30 Tropfen mehrmals. Als Zusatz zu diure-
tischen Mixturen und Saturationen. (10,0 = 5 Pf.)

Extractum Scillæ. Dickes Extract. Zu 0,03—0,2 mehrmals in Pillen.
1,0 = 15 Pf.

ad 0,2 pro dosi! — ad 1,0 pro die!

Oxymel Scillæ. (Acet. Scill. 5, Mel. dep. 10.) Zu 10,0 bis 20,0
diuretischen und brechenerregenden Mitteln hinzuzusetzen.
(10,0 = 15 Pf.)

Tinctura Scillæ. Zu 10—20 Tropfen mehrmals. (10,0 = 15 Pf.)

416) Rp. Inf. bulb. Scillæ **417) Rp.** Acet. Scillæ 25,0.
3,0—6,0 : 180,0. Kali carb. q. s.
Syrup. simpl. 20,0. ad saturat., cui adde
M. D. S. 2stdl. 1 Essl. Aq. Petroselini 150,0.

418) Rp. Saturat. acet. scill. Elæosacch. Junip. 20,0.
20,0—40,0 : 180,0. Spirit. Aether. nitr. 5,0.
Roob Juniperi 20,0. M. D. S. 2—3ständl. 1 Essl.
M. D. S. 2stdl. 1 Essl. (Phœbus.)

Secale cornutum. Mutterkorn. Der vom Roggen gesammelte
Pilz Claviceps purpurea. Zu 0,3—0,6 mehrmals täglich
in Pulvern, im Infus (3,0—7,5 : 200,0). 10,0 = 20 Pf.

ad 1,0 pro dosi! — ad 5,0 pro die!

Extractum Secalis cornuti. — **Ergotinum.** Dickes, in Wasser lös-
liches Extract, zu 0,1—0,5 mehrmals täglich in Pillen, Lösung
und in subcut. Injection; zu letzterer besonders das

†**Ergotinum dialysatum** als das haltbarste und reinste Präparat
zu empfehlen. (1,0 = 40 Pf.)

419) Rp. Secal. cornut. 0,2—0,6. **420) Rp.** Inf. Secal. cornut.
Sacch. alb. 0,3. 5,0—7,5 : 180,0.

M. f. pulv. D. t. dos. VIII. Syrup. simpl. 20,0.
(in charta cerata). D. S. 2stdl. 1 Essl.

S. Mehrmals 1 Pulver.
(Wehenschwäche, Blasenblutung; nächtliche Schweißse; gegen
letzte Abends 2—3 Esslöffel.)

421) Rp. Inf. Secal. cornut. **422) Rp.** Ergotin. 3,0.
10,0—15,0 : 150,0. Pulv. fol. Digital. 2,0.
(Aether. sulf. 3,0.) Pulv. et extr. Gent. q. s.

M. D. S. 2ständl. 1 Esslöffel. ut f. pilul. Nr. 50.
D. S. 2ständl. 2—3 Pillen.

(Aorten-Insuff. — Arteriosclerose.) Rosenbach.

- 423) Rp. Ergotin.
Chinin. sulf. ää 2,0.
Pulv. fol. Digital.
Extr. Hyoscyam. ää 0,2.
F. pilul. Nr. 20.
D. S. 5—8—10 Pillen tägl.
(Bei Blutungen.)
Huchard.
- 424) Rp. Extr. Secal. corn. Denzel 2,0
Aq. Cinnamon. 180,0
D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.
(Migräne mit Gefässerweiterung.) Hirt.
- 425) Rp. Ergotini dial. 2,0.
Aq. destill. 8,0.
D. S. Zur subcut. Injection.
($\frac{1}{2}$ —1 Spritze.)
- 426) Rp. Ergotini dialys. 2,0.
(Acid. carbol. liq. 0,1.)
Aq. dest. 10,0.
D. S. Zur subcut. Injection.
($\frac{1}{2}$ —1 Spritze.)
von Langenbeck.
- (Blutungen, Aneurysmen, senile Blasenschwäche mit Hypertrophie der Prostata.)
- Senegæ radix. Von Polygala Senega. Im Inf. oder Decoct. 5,0—10,0 : 200,0. (10,0 = 25 Pf.)
- Syrupus Senegæ. Als Zusatz zu anderen expectorirenden Mitteln. (10,0 = 10 Pf.)
- 427) Rp. Inf. rad. Senegæ 5,0—10,0 : 180,0.
(Liq. Ammon. anisat. oder
Tinct. Opii benz. 2,0—5,0.)
Syrup. Althææ oder
— Liquirit. oder
— Senegæ 20,0.
M. D. S. 2stdl. 1 Essl. (Expectorans.)
- Sennæ folia. Sennesblätter. (Enthalten Cathartinsäure). Im Infus 5,0—15,0 : 200,0.
(Als Hausmittel $\frac{1}{2}$ —1 Esslöffel Fol. Sennæ unter Zusatz von 1 Theelöffel Fenchel- oder Kümmelthee für 1 Tasse Thee.) 10,0 = 15 Pf.
- Infusum Sennæ compositum. Wiener Trank. Mehrmals täglich 1—2 Esslöffel. (10,0 = 15 Pf.)
- Pulvis Liquiritiæ compos. Kurella'sches Pulver. Brustpulver. (Fol. Sennæ 2 Th., Rad. Liquirit 2 Th., Fenchel 1 Th., Sulph. dep. 1, Zucker 6 Th.) Morgens und Abends 1 Theelöffel, bei kleinen Kindern messerspitzweise. Zu empfehlen sind die Granules aus Kurella'schem Brustpulver. (Für die Kinderpraxis geeignetes Laxans.) 10,0 = 10 Pf.
- Species laxantes (St. Germain). Im Infus 1—2 Theelöffel auf 1 Tasse. (10,0 = 15 Pf.) (Abführmittel.)
- Syrupus Sennæ. Theelöffelweise. 10,0 = 10 Pf.
- Seydlitz Pulver. Siehe Pulvis aërophorus laxans.
- †Simarubæ cortex. Innerlich im Infus oder Decoct. 10,0—20,0 : 200,0.
- 428) Rp. Decoct. cort. Simarub. (15,0) 200,0.
D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.
(Chronische Dysenterie.)
- †Simulo. Frucht aus Capparis coriacæ, aus deren Samen die Tinctura Simulo hergestellt wird. Von dieser 4,0—8,0 täglich gegen Epilepsie und Hysterie empfohlen.

Stibium sulfuratum aurantiacum. Siehe Antimon.

Stramonii folia. Stechapfelblätter. Von *Datura Stramonium* (Solanee). Außerlich in Form von Cigaretten; in Dampfform zu inhalieren und zu narkotischen Kataplasmen. (10,0 = 5 Pf.)
ad 0,2 pro dosi! — ad 1,0 pro die!

431) Rp. Fol. Stramonii
Kalii nitric. $\hat{a}\hat{a}$ 30,0.
M. f. Pulv. subtiliss.

S. 1 Theelöffel voll auf 1 Porzellanschale zu verbrennen und der Rauch einzuathmen.

(Asthma.) v. Ziemssen.

†**Stramonium nitratum** (americanum). 1—3 Theelöffel anzuzünden und zu inhalieren.
(Bronchialasthma.)

†**Strophanthus hispidus.** Von Fraser sind die Samen von *Strophanthus hispidus*, einer in Afrika einheimischen Pflanze (Apocynce), als vorzüglichstes Ersatzmittel der *Digitalis* empfohlen. Dieselben enthalten als wirksames Princip das Strophanthin. Diesem Mittel fehlen die störenden Nebenwirkungen der *Digitalis*. Es wird hauptsächlich in Form einer alkoholischen Tinctur der Samen als:

†**Tinctura Strophanthi** (1,0 : 10,0 und 1,0 : 20,0) zu 4—8—10 Tropfen 2—4× täglich gegeben. (10,0 = 30 Pf.)

Strychni semen (sive *Nux vomica*). Von *Strychnos nux vomica* (Apocynce). Krähenaugen, Brechnuss.
ad 0,1 pro dosi! — ad 0,2 pro die!

Strychninum nitricum. Farblose, in 30 Th. Wasser lösliche Krystalle. In Pillen, Pulver und subcut. Injection von 0,003—0,01. (0,1 = 5 Pf.)

ad 0,01 pro dosi! — ad 0,02 pro die!

432) Rp. Strychnini nitr. 0,06.
Aq. fervid. q. s. ad solut.
Extr. Liquirit.
Pulv. rad. Liq. $\hat{a}\hat{a}$ 2,0.
Pilul. Nr. 30. Consp.
F. S. Mit 2 Pillen tägl. zu beginnen und dann allmählich bis auf 6, 8 und 10 (!) zu steigen.

(Hysterische Paralyse, Kehlkopfparalyse, Peripherische und Rückenmarksparalyse, Delirium tremens.)

Extractum Strychni. Innerlich zu 0,01—0,05 2—3 × täglich in Pillen, Pulver, Lösung (0,1 = 5 Pf.)
ad 0,05 pro dosi! — ad 0,15 pro die!

434) Rp. Extr. Strychni 0,01.
Bismut. subnitr.
Magnes. carb. $\hat{a}\hat{a}$ 0,2.
Sacch. alb. 0,5.
M. f. pulv. D. tal. dos. (in chart. cer.) Nr. X.
S. 2stündlich 1 Pulver.
(Cardialgie.)

433) Rp. Strychnini nitr. 0,05.
Aq. dest. 10,0.
D. S. Zur subcut. Injection.
Mit $\frac{1}{10}$ Spritze ($\frac{1}{2}$ Mgm.) zu beginnen und allmählich vorsichtig höher zu gehen.

435) Rp. Extr. Canab. ind. 0,5.
Ergotin. 2,5.
Extr. nuc. vomic. 0,5.
F. pilul. Nr. 20.
S. Früh und Abends 1 Pille.
(Impotenz.)

Strychnin. — Sulfur præcipitatum.

Tinctura Strychni (s. *Nucis vomicae*). Mehrmals tägl. zu 3—5—10 Tropfen. (10,0 = 10 Pf.)
ad 1,0 pro dosi! — ad 2,0 pro die!

- 436** Rp. Tinct. Strychni
Tinct. Opii crocat.
Tinct. Chin. comp.
 ää 5,0.
M. D. S. Mehrmals tägl. 10
bis 15 Tropfen.
(Diarrhoe.)
- 437** Rp. Tinctur. China comp.
30,0. oder
(Tinct. Rhei vinos. oder
Tinct. Valerian. 30,0.)
Tinct. Strychni 3,0.
M. D. S. 3 × tägl. 20—30 Tr.
(Stomachicum, Alcoholismus.)
- 438** Rp. Tinct. Valer. æth. 10,0.
Tinct. Nuc. vomic. 3,0.
Spirit. æther. acet. 2,0.
M. D. S. 2stdl. 20—30 Tropfen
(Choleratropfen).
- 439** Rp. Tinct. Strychni 0,5.
Aq. Amygd. am. 5,0.
M. D. S. 2—3 × tägl. 15 Tropfen.
(Chronischer Magenkatarrh.)
Bamberger.

Styrax liquidus. Graue, klebrige Masse. Als billiger Ersatz für Perubalsam gegen Scabies zu empfehlen. (10,0 = 15 Pf.)

- 440** Rp. Styracis liquid. 20,0.
Olei olivar. 10,0.
M. D. S. Zu zweimaliger Einreibung.
(Scabies und Morpionen.)
- 441** Rp. Styrac. liquid.
Ol. Rapar. ää 30,0.
Spirit. rectific. 3,0.
M. D. S. Zur Einreibung bei Scabies.

†**Succinimid-Quecksilber**. Siehe Hydrargyrum-Präparate.

†**Sulfonal**. Weisse, in Wasser schwer lösliche, geruch- und geschmacklose Krystalle. — Mercaptan-Derivat. Neuestes, von Baumann und Kast eingeführtes, zuverlässiges Schlafmittel, das auch bei Herzaffectionen gut vertragen wird. Durchschnittliche Dosis beträgt 1,5—2,0. Am besten in Pulverform (Oblaten) oder in Form von Tabletten beim Abendessen zu nehmen. Auch als Beruhigungsmittel bei lange andauernden Erregungszuständen Geisteskranker in kleineren (0,5 pro dosi, 2,5—3,0 pro die) sich mehrstündlich wiederholenden Dosen zweckmässig. (1,0 = 25 Pf. — 10,0 = 190 Pf.)

- 442** Rp. Sulfonal. 1,0—2,0.
D. t. dos. Nr. III.
S. Abends 1 Pulver (in Oblaten).

Sulfur auratum. S. Antimon.

Sulfur depuratum. Gereinigter Schwefel. Gelbes, trockenes, geruchloses Pulver. Bestandtheil des Pulv. Liquirit. comp. Innerlich als mildes Abführmittel (zu 3,0—5,0). Aeusserlich in Salben (1,0—2,0; 6,0) (10,0 = 5 Pf.)

- 443** Rp. Sulf. dep. 10,0.
Sacch. lactis 20,0.
M. f. pulv. D. S. 3 × täglich 1 Messerspitze.
(Chlorose.) Schulz und Strübing.

Sulfur præcipitatum (Lac sulfuris). Innerlich zu 0,1—1,0 mehrmals in Pulv. und Pillen. Aeusserlich zu Waschungen (3,0—5,0; 100,0). Hauptbestandtheil des «Kummerfeldt'schen Wassers». (10,0 = 5 Pf.)

444) Rp. Lact. sulf.
Pulv. rad. Rhei
Pulv. Liquir. comp.
Elæosacch. Fœniculi
 ââ 7,5.
M. f. pulv. D. in scat.
S. Morg. u. Abds. 1 Theel.
(Abführmittel für Hämorrhoidarier.)

445) Rp. Sulf. præcip.
Glycerini
Spirit. sapon. ââ 10,0.
M. D. S. Aeusserlich.
(Acne.)
Hebra.

Sulfur sublimatum. (Flores sulfuris.) Aeusserlich in Salben (1,0 bis 2,0 : 10,0) 100,0 = 15 Pf.

446) Rp. Acid. carbol. 1,0.
Sulf. sublim. 5,0.
Adip. colli equini ad 50,0.
Olei Bergam. gtt. X.
D. in oil. vitrea aperta.
S. Flüssige Pomade.
(Gegen Haarschwund.)

Lassar.

Syrupi:

Syrupus simplex. (10,0 = 5 Pf.)

Syrupus Aurantii Corticis. (10,0 = 15 Pf.)

Syrupus Rubi Idæi. (10,0 = 10 Pf.)

Syrupus Althææ. 10,0 = 5 Pf.

†Syrupus Fœniculi. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Ipecaouanhæ. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Liquiritiæ. 10,0 = 15 Pf.

Syrupus Senegæ. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Mannæ. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Rhei. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Rhamni catharticæ. 10,0 = 10 Pf.

†Syrupus Sennæ cum Manna. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Cerasorum. (10,0 = 10 Pf.) Färbt säuerliche Mixturen kirschroth.

†Syrupus Mororum. Tief dunkelrothe Farbe.

†Syrupus Rhæados. (10,0 = 10 Pf.) Hellrothe Farbe.

Syrupus Rubi Idæi. Dunkelroth (wird durch Alkalien entfärbt).

†Syrupus Violarum. Schön blau (durch Alkalien grün).

Talcum. Weisses, krystallinisches Pulver (gepulvertes Magnesiumsilicat). Aeusserlich als Cosmeticum zu Schminken und Puder. Bestandtheil des Pulvis salicylicus cum Talco. Siehe daselbst. (100,0 = 10 Pf.)

Tannin. S. Acid. tannicum.

Tartarus depuratus (sive Kali bitartaricum s. Cremor Tartari). Weinstein. Weisses, in 192 Th. Wasser lösliches Pulver. Innerlich zu 0,5—2,0 mehrmals täglich in Pulvern und als Zusatz zu abführenden und diuretischen Mixturen, Thee etc. (10,0 sub. pulv. = 15 Pf.)

Gew.
Geschmacks-
corrigens.Zusatz
zu anticatar-
rhalischen und
expectorirenden
Mixturen.Zusatz zu
purgirenden
Mixturen.