

444) Rp. Lact. sulf.
Pulv. rad. Rhei
Pulv. Liquir. comp.
Elæosacch. Fœniculi
 ää 7,5.
M. f. pulv. D. in scat.
S. Morg. u. Abds. 1 Theel.
(Abführmittel für Hämorrhoidarier.)

445) Rp. Sulf. praecip.
Glycerini
Spirit. sapon. ää 10,0.
M. D. S. Aeusserlich.
(Acne.)
Hebra.

Sulfur sublimatum. (Flores sulfuris.) Aeusserlich in Salben (1,0 bis 2,0 : 10,0) 100,0 = 15 Pf.

446) Rp. Acid. carbol. 1,0.
Sulf. sublim. 5,0.
Adip. colli equini ad 50,0.
Olei Bergam. gtt. X.
D. in oil. vitrea aperta.
S. Flüssige Pomade.
(Gegen Haarschwund.)

Lassar.

Syrupi:

Syrupus simplex. (10,0 = 5 Pf.)

Syrupus Aurantii Corticis. (10,0 = 15 Pf.)

Syrupus Rubi Idæi. (10,0 = 10 Pf.)

Syrupus Althææ. 10,0 = 5 Pf.

†Syrupus Fœniculi. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Ipecaouanhæ. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Liquiritiæ. 10,0 = 15 Pf.

Syrupus Senegæ. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Mannæ. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Rhei. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Rhamni catharticæ. 10,0 = 10 Pf.

†Syrupus Sennæ cum Manna. 10,0 = 10 Pf.

Syrupus Cerasorum. (10,0 = 10 Pf.) Färbt säuerliche Mixturen kirschroth.

†Syrupus Mororum. Tief dunkelrothe Farbe.

†Syrupus Rhæados. (10,0 = 10 Pf.) Hellrothe Farbe.

Syrupus Rubi Idæi. Dunkelroth (wird durch Alkalien entfärbt).

†Syrupus Violarum. Schön blau (durch Alkalien grün).

Talcum. Weisses, krystallinisches Pulver (gepulvertes Magnesiumsilicat). Aeusserlich als Cosmeticum zu Schminken und Puder. Bestandtheil des Pulvis salicylicus cum Talco. Siehe daselbst. (100,0 = 10 Pf.)

Tannin. S. Acid. tannicum.

Tartarus depuratus (sive Kali bitartaricum s. Cremor Tartari). Weinstein. Weisses, in 192 Th. Wasser lösliches Pulver. Innerlich zu 0,5—2,0 mehrmals täglich in Pulvern und als Zusatz zu abführenden und diuretischen Mixturen, Thee etc. (10,0 sub. pulv. = 15 Pf.)

Gew.
Geschmacks-
corrigens.Zusatz
zu anticatar-
rhalischen und
expectorirenden
Mixturen.Zusatz zu
purgirenden
Mixturen.

- 447) Rp. Tartar. dep. 25,0.
 Elæos. Menth. pip. 5,0.
 M. f. pulv. D. in scat.
 S. 3—4 × tägl. 1 Theelöffel.
 (Leichtes Diureticum und Diaphoreticum.)

Tartarus stibiatus. S. Antimon-Präparate.

Terebinthinae oleum rectificatum. Gereinigtes Terpentinöl. Innerlich in Tropfen V—XX in Milch, Capsules zu 0,6, in Mixturen (mit Aether) mehrmals täglich. Auch esslöffelweise (!) innerlich gegen Diphtherie empfohlen (Bosse). Aeusserlich zu Einreibungen und Inhalationen. (10,0 = 5 Pf.)

- 448) Rp. Olei Terebinth. rectific. 449) Rp. Olei Tereb. rectific. 1,0
 Aether. aa 7,5. Mucil. Gum. Mimos. 1,0
 M. D. S. 3 × tägl. 5—15 Tr. Aq. dest. aa 30,0.
 Isehias, Gallensteine. Elæosacch. Citri 10,0.
 (Durand'sches Mittel.) M. D. S. 2stündl. 1 Theelöffel.
 (Hæmoptö.) (Hæmoptö.)
- 450) Rp. Olei Terebinth. 451) Rp. Olei Terebinth.
 1,0—2,0. Spirit. vini rectific. 452) Rp. Olei Terebinth. 30,0.
 Aq. Menth. pip. 150,0. Aetheris aa 6,0. (Acid. carbol. 1,0.)
 Mucil. Salep 30,0. M. D. S. Still. 20—50 Tropfen
 M. D. S. 2stündl. 1 Esslöffel. in Hafer- oder Salep-
 (Hæmoptö.) schleim.
 (Phosphorvergiftung.)
- 453) Rp. Olei Terebinth. 30,0.
 in Capseln zu 0,6. (Acid. carbol. 1,0.)
 Mehrmals tägl. D. S. Aeusserlich (zum Pin-
 (Lungenabscess, Gangræna seln).
 pulm., Bronchorrhoe, etc.) (Erysipelas.)
- 454) Rp. Olei Terebinth. rectific. 455) Rp. Olei Terebinth. 10,0.
 1,0—3,0 : 200,0. Syrup. Althæ 80,0.
 D. S. Zur Inhalation. M. D. S. 3stündl. 1 Theelöffel.
 (Empysem., Bronchitis pu- (Keuchhusten.)
 trida, Gangræna pulm.) Ringk.
 (Skoda.)

†**Terpinhydrat.** Farblose Krystalle, löslich in kochendem Wasser und Alkohol. Innerlich zu 0,2—0,5 mehrmals in Pillen, Oblaten oder wässrig-alkoholischer Lösung, als Expectorans bei Bronchitis. (10,0 = 55 Pf.)

- 456) Rp. Terpin. hydrat. 3,0. 457) Rp. Terpin. hydrat. 2,0.
 Sacch. alb. Spiritus
 Gummi arab. aa 1,0. Aq. dest.
 f. c. Aqua pilul. Nr. 30. Syr. Menth. pip. aa 50,0.
 D. S. 3 × tägl. 1—3 Pillen. M. D. S. 3—6 × tägl. 1 Esslöffel.

†**Terpinol.** Farblose, nach Hyacinthen riechende Flüssigkeit. In Wasser unlöslich, leicht löslich in Alkohol und Aether. Expectorans. Dosis 0,1 in Pillen oder Capsules 5—10 × täglich. 1,0 = 10 Pf.

458) Rp. Terpinol.
Natrii benzoic. aa 1,0.
Sacch. alb. q. s.
ut f. pilul. (oder) Capsul. Nr. X.
D. S. 1—2stdl. 1 Pille oder
1 Kapsel.

459) Rp. Capsulae gelatinosae :
Terpinol. 0,1
et
Ol. Olivar. 0,3
replet. Nr. X.
D. S. 2stdl. 1 Stück z. nehm.

†Thallinum sulfuricum. Wurde 1885 von Skraup dargestellt und von v. Jaksch zu innerem Gebrauch empfohlen. In Wasser lösliches weisses Pulver. Antipyreticum. Es zeichnet sich vor andern Antipyreticis durch rasche Resorption und Elimination aus. Innerlich in Pillen, in Dosen von 0,25—0,5 in wässriger Lösung oder in Wein. Bei mehrere Tage fortgesetztem Gebrauch (Typhus) 0,04—0,1 ein- bis zweistündlich. Aeusserlich zu Injectionen (1,0—2,0 : 100,0) in die Harnröhre bei Gonorrhoe, auch in Form von Bougies. (0,1 = 5 Pf.)

†Thallinum tartaricum. Wie das Vorige. (0,1 = 5 Pf.)

460) Rp. Thallin. tartaric. 2,0—4,0.
Sacch. alb. 0,5.
Gummi arab. pulv. 1,5.
f. c. Aqua q. s. pilul. Nr. 30.

Thymolum. Acid. thymicum. Grosse, farblose, eigenthümlich riechende Krystalle. Schwer löslich in Wasser (in 1100 Th.), leicht löslich in Weingeist, Aether, Chloroform. Innerlich in grossen Dosen (2,0—4,0 in 4—6 Gaben getheilt) gegen Anchylostomum duoden. Aeusserlich für Mundwässer, Pinselungen und Inhalationen, sowie zu Bädern. (10,0 = 85 Pf.)

461) Rp. Thymoli 0,2.
Acid. salicyl. 1,0.
Solve in spirit. q. s.
Balsam. Peruvian. 0,25.
Vaselin. 30,0.
M. f. ungt. D. S. Aeusserl.
(Decubitus, Geschwüre, etc.)

462) Rp. Thymoli 0,2.
Solve in spirit. q. s.
Aq. fervid. 200,0.
D. S. Zur Inhalation.

(Putride Bronchitis.)

Leyden.

Tiliae flores. Lindenblüthen. Zum Thee 1 Esslöffel auf 3 Tassen Wasser. (10,0 = 10 Pf.)
(Diaphoreticum.)

Tinctura. Ein nach bestimmter Vorschrift mit Weingeist, Wasser oder Aether bereiteter Auszug von klarem Aussehen. Die Tincturen werden gewöhnlich in Tropfenform verordnet und 1 Gramm derselben = 20 Tropfen berechnet.

Tinctura Aconiti. Siehe Aconitin.

Tinctura amara. (Rad. Gent. Herb. Cent. aa 3,0, Cort. Aurant. 2, Fruct. Aurant. immat., Rhiz. Zedoar. aa 1 und Spirit. dil. 50.)
10,0 = 15 Pf.

Tinctura aromatica. (Cort. Cinnam. 5, Rhiz. Zingib. 2, Rhiz. Galang., Caryophyll Fruct. Cardam. aa 1. Spirit. dil. 50.) 10,0 = 15 Pf.

Tinctura Fowleri = Liquor Kalii arsenicosi.

Tinctura Meconii

Tinctura Thebaica } = Tinctura Opii simplex.

Tinctura tonico-nervina Bestucheffil = Tinctura Ferri chlorat. aetherea. (10,0 = 10 Pf.)

- †**Tinctura Gelsemii sempervirentis.** Zu 20–30 Tropfen mehrmals täglich (bei Trigemini-Neuralgien). 10,0 = 10 Pf.
- †**Tinctura Simulo.** Siehe Simulo.
- †**Tinctura Quebracho** = Extract. spirit. ex ligno Quebracho. Theelöffelweise. (10,0 = 15 Pf.)
- †**Traumaticin.** (1 Th. Guttapercha in 6 Th. Chloroform gelöst.) Zum Bepinseln an Stelle des Collodium. 10,0 = 20 Pf.
- †**Trichlorphenol.** Dargestellt aus einem Gemisch von Carbonsäure und Chlorkalk. Soll nach Dianin die Carbonsäure 25 Mal an antiseptischer Kraft übertreffen und als bestes Desinficiens bei gangränösen, fauligen Wunden und Geschwüren zu empfehlen sein. Anwendung in Substanz (wie Jodoform) und in 1 bis 5% Lösung besonders in der Zahnheilkunde. Billiger als Carbonsäure. (Der üble Geruch wird durch Lavendelöl [5 Tropfen auf 30,0] aufgehoben.)
- Trifolii fibrini folia.** Bitterklee. Von *Menyanthis trifoliata* (Gentianeae). Innerlich im Infus (5,0–10,0 : 200,0), Species und in Pulver (0,5–1,0). 10,0 = 5 Pf.
- Extractum Trifolii fibrini.** Dickes, schwarzbraunes, in Wasser lösliches Extract. Innerlich zu 0,5–1,0 mehrmals in Pillen und Mixturen. 1,0 = 5 Pf.
- †**Trimethylamin** vide Propylamin.
- Unguenta.** Siehe Lanolin und auch Seite 3.
- Unguentum basilicum.** Königssalbe. (Ol. oliv., Cer. flav., Coloph., Seb. ovil., Tereb.) 10,0 = 10 Pf.
- Unguentum diachylon** (Hebræ). Empi. Litharg. und Ol. Oliv. aa. 10,0 = 15 Pf.
(Hebräische Salbe gegen Ekzem, Lichen, Schweissfüsse.)
- †**Unguentum Elemi.** Reizende Verbandsalbe. (10,0 = 15 Pf.)
- Unguentum leniens.** (Cold-Cream.) (Cer. alb., Cetac., Mandelöl. Aqua.) 10,0 = 20 Pf. (Cosmeticum.)
- Unguentum Paraffini** = Vaseline. (10,0 = 10 Pf.)
- †**Unguentum Wilkinsonii.** (Flor. Sulf. Pic. liq. aa 15,0. Sapon. virid. Adip. suill. aa 30,0. Pumic. pulv. 10,0.) Form. Mag. Berol.
- †**Unguentum Wilsonii** sive unguent. zinci benzoati. Milde, unzerstliche Salbe. Ersatz für Zinksalbe. (Zinc. oxyd. 5,0 Benzoës pulv. 1,0. Axung. Porci 30,0.)
- †**Urethan.** Aethyl-Urethan. Carbaminsäure-Aethyläther. Weisse, geruch- und geschmacklose, in Wasser leicht lösliche Krystalle. Dosis: 1,0–4,0 in Pulverform (chart. cerat.) oder in wässriger Lösung. Auch in subcut. Injection (3,0 : 10,0 Aqua) 1–3 Spritzen mit Erfolg versucht. (Rottenbiller.) Neueres von Schmiedeberg, Kobert, v. Jaksch u. A. empfohlenes Schlafmittel. Von Demme in der Kinderpraxis gerühmt. 1,0 = 10 Pf.

463) Rp. Urethan. 6,0.
Aq. dest. 60,0.
D. S. Abends 1–2 Esslöffel.

- †**Ustilago Maidis** und **Extract. fluid. ex Ustilag. Maidis.** (Ein auf dem Mais schmarotzender Pilz). Das Fluid-Extract neuerdings als Ersatzmittel des *Secale corn.* bei Unthätigkeit und Haemorrhagie des Uterus gerühmt. Dosis: 3–4 × 25–30 Tropfen.

Uvæ ursi folia. Bärentraubenblätter. (Dieselben enthalten ein Glykosid: Arbutin. s. d.) Im Decoct (10,0—20,0 : 200,0) oder 1—2 Esslöffel auf 2—3 Tassen Thee. (10,0 = 5 Pf.)

464 Rp. Decoct. fol. Uvæ ursi

10,0—20,0 : 200,0.

D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.

(Cystitis, Blasenblutung, Pyelitis.)

Valerianæ radix. Baldrianwurzel. Im Infus (10,0—20,0 : 200,0) und zu Species (mit Fol. Menth. pip., Fol. Meliss., Fol. Aurant., etc.) 10,0 = 10 Pf.

465 Rp. Inf. rad. Valerian.

10,0—15,0 : 180,0.

Spirit. æther. nitros.

2,0.

Syrup. simpl. 20,0.

M. D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.

(Excitans, Nervinum.)

466 Rp. Rad. Valerian.

Fol. Aurant.

· Menth. pip.

· Trifolii *ää 20,0.

M. f. Species. S. 1 Esslöffel

auf 3 Tassen Wasser.

(Heim's Thee gegen Hysterie u. nervöse Beschwerden.)

Tinctura Valerianæ. Zu 20—30 Tropfen mehrmals. (10,0 = 15 Pf.)

Tinctura Valerianæ ætherea. Mehrmals 10—15 Tropfen. (10,0 = 20 Pf.)

Analepticum

und

Antihystericum.

†**Aqua Valerianæ.** Als Zusatz für beruhigende Mixturen. (100,0 = 20 Pf.)

Vaselin. Siehe Paraffinum.

Veratrinum. Weisses, in 4 Th. Weingeist lösliches Pulver. Innerlich (selten) zu 0,001—0,005 mehrmals täglich in Pillen. Aeusserlich zu Einreibungen. (0,1 = 5 Pf.)
ad 0,005 pro dosi! — ad 0,02 pro die!

467 Rp. Veratrin 0,02.

Rad. Liquirit. pulv.

Succi Liquirit. ää q. s.

ut f. pilul. Nr. 40. Consp.

D. S. Täglich 4 Pillen.

(Tremor.)

Feris.

468 Rp. Veratrin. 0,3—0,5.

Chloroform. 5,0.

Olei Olivar. 25,0.

M. D. S. Aeusserlich, Mehr-

malstägl. 1—2 Theel.

voll einzureiben.

(Rheumatismus, Neuralgie.)

Vinum camphoratum. Siehe Camphora. (10,0 = 10 Pf.)

Vinum Chinæ. Siehe Chinæ cortex. (10,0 = 10 Pf.)

†**Vinum Coca.** Siehe Coca.

Vinum Colchici. Siehe Colchicum. (10,0 = 20 Pf.)

†**Vinum Condurango.** Siehe Condurango.

†**Vinum Hungaricum Tokayense.** (10,0 = 15 Pf.)

†**Vinum Hispanicum Malacense.** Malagawein.

Vinum Ipecacuanhæ. Siehe Ipecacuanha. (10,0 = 25 Pf.)

Vinum Pepsini. Siehe Pepsin. (10,0 = 15 Pf.)

Vinum stibiatum. Siehe Antimon. (10,0 = 10 Pf.)

Viola tricoloris herba. Stiefmütterchentheee. Von *viola tricolor* (Violaceae). Als blutreinigendes Mittel bei scrofulösen Kindern beliebt. Innerlich 10,0—15,0 in Abkochung und als Species. (10,0 = 5 Pf.)

Wiener Trank. Siehe Senna.

Zincum chloratum. Chlorzink. Weisses, an der Luft zerfliessendes, in Weingeist und Wasser leicht lösliches Pulver. Aeusserlich als Desinficiens und Aetzmittel in Anwendung. Von Köbner sind modificirte Chlorzinkstifte (durch Zusammenschmelzen von Chlorzink und Kal. nitric.) empfohlen. — Zu Verbandwässern 1,0 : 100,0 bis 500,0; Augewasser 0,02 : 100,0; Urethralinjection 0,05 : 100,0.

Bei gonorrhöischer Vaginitis und Endometritis verschreibt Prof. Fritsch Chlorzink und Wasser zu gleichen Theilen und setzt von dieser Lösung 20,0 zu 1 Liter Wasser. Mit dieser Chlorzinklösung, auf 30° erwärmt, werden in liegender Stellung 2mal täglich Ausspritzungen gemacht. Zur Beseitigung des Ausflusses genügen 10 Ausspritzungen. — 10,0 = 10 Pf.

Zincum oxydatum. Innerlich in Pulvern zu 0,1—0,5 mehrmals täglich. Aeusserlich bei Intertrigo (1,0 : 8,0 Lycopod) zu Streupulvern. (10,0 = 15 Pf.)

469) Rp.	Zinci oxydat. 1,0—2,0.	470) Rp.	Zinc. oxyd. 0,1.
	Natrii bicarb. 0,5.		Rad. Valerian. 1,0.
	M. f. pulv.		Fol. Belladonn. 0,01.
	Divid. in part. aq. 3—4.		M. f. pulv.
S.	3stündl. 1 Pulver.		D. tal. dos. X.
	(Chronische Diarrhoe.)	S.	2—3× tägl. 1 Pulver.
			(Epilepsia.)

Zincum sulfocarbolicum. Farblose, in Wasser leicht lösliche Krystalle. Aeusserlich zu desinficirenden Verbänden in 1—5% Lösung und zur Injection bei Gonorrhoe (0,1—0,5 : 100,0) 1,0 = 5 Pf.

Zincum sulfuricum. Zinkvitriol. Farblose, in Wasser leicht lösliche Krystalle. Aeusserlich in Solution zu Einspritzungen (0,5—1,0 : 150,0); zu Augentropfen (0,05—0,2 : 30,0). 10,0 = 5 Pf.

ad 1,0 pro dosi!

471) Rp.	Sol. Zinci sulf.	472) Rp.	Sol. Zinci sulf.
	0,5—1,0 : 180,0.		0,03 : 15,0.
	D. S. Aeusserlich.		D. S. Aeusserlich.
	Zu Einspritzungen.		(Einige Tropfen in den
	(Gonorrhoe, Otorrhoe.)		Conjunctivalsack.)
			(Conjunctivitis.)

473) Rp. Sol. Zinci sulf. 0,25.
Aq. destill. 250,0.
M. D. S. Augewasser zu Umschlägen.
(Morgens und Abends 1/4 Stunde lang.)

Unguentum Zinci. Aeusserlich. (10,0 = 10 Pf.)

†**Zincum valerianicum**. In Pulvern und Pillen, zu 0,02—0,05 mehrmals täglich. (1,0 = 5 Pf.)

- | | |
|---|---|
| <p>474) Rp. Zinci valerian. 0,03.
Sacch. alb. 0,5.
M. f. pulv. D. t. dos. X.
S. 3 × tägl. 1 Pulv.</p> | <p>475) Rp. Zinci valerian. 1,0.
Rad. valerian. 2,0.
Gummi Tragacanth.
q. s.
ut f. pilul. Nr. 30.
D. S. 3 × tägl. 1—2 Pill.
(Antihystericum.)</p> |
|---|---|

Zittmann'sches Decoct. Siehe Sarsaparillæ radix.

5. A n h a n g.

Diätetische Kuren.

a) Die Entfettungskuren und Weir-Mitchell's Mastkur.

I. Die Entfettungskuren.

Für die Entfettung der Fettleibigen kommen gegenwärtig hauptsächlich folgende 3 Heilmethoden in Betracht:

- 1) die diätetischen Heilmethoden,
- 2) die Brunnenkuren,
- 3) die hydrotherapeutische Kur.

I) Diätetische Heilmethoden.

- a) Bantings-Kur. — b) Ebsteins Kurmethode. —
c) Oertel'sche Kur.

a) Bantings-Kur.

Dieselbe ist nach dem Engländer William Banting benannt, der von Dr. Harvey durch bestimmte diätetische Vorschriften (Vermeidung von Fett und Kohlehydraten) von seiner lästigen Corpulenz befreit wurde. Der Urheber dieser Methode ging von der Ansicht aus, dass, wenn die Nahrung nur möglichst wenig der bis dahin allein als Fettbildner geltenden Nährstoffe — Fett und Kohlehydrate — enthält, der Körper zur Erzeugung von Wärme das bereits vorhandene angelagerte Fett verbrennen müsse. Diese Kurmethode kann bei gewissenhafter Befolgung und längerem Gebrauche die bedenklichsten Folgezustände nach sich ziehen. Sie ist daher durchaus je nach Individualität, Klima u. s. w. zu modificiren.

b) Ebstein'sche Kur.

Professor Ebstein (Göttingen) gestattet die Aufnahme von Fett mit der Nahrung, verbietet aber den Genuss der Kohlehydrate in Form von Zucker, Süßigkeiten und Kartoffeln; die Menge des Brodes ist auf 80 bis