

La limonade tartrique se fait avec ce sirop :

Sirop tartrique. . . . .	100 grammes.
Eau. . . . .	900 —

L'acide tartrique, pour l'usage externe, s'ajoute aux solutions de sublimé (1 gramme par litre). Il est utilisé aussi en pommade contre le prurit (glycérolé tartrique) :

Acide tartrique. . . . .	1 gramme.
Glycérolé d'amidon. . . . .	40 grammes.

**Aconit.** — L'aconit napel, char de Vénus (renonculacées), est un médicament paralyssant, anesthésiant, déprimant, antispasmodique. Il est indiqué dans l'asthme et les accès asthmatiformes, la coqueluche, le stridulisme laryngé, les palpitations, les convulsions, etc. Peut s'associer avec la belladone, la digitale, le colchique. On emploie surtout la racine avec laquelle on fait une alcoolature et dont on retire l'aconitine. Cet alcaloïde est difficile à prescrire chez l'enfant. On le donnera par fraction de milligramme (1/10). Quant à l'alcoolature, on peut en prescrire II gouttes et même III par année d'âge :

Alcoolature de racines d'aconit. . . . .	} ãã 2 grammes.
Teinture de belladone. . . . .	
Élixir parégorique. . . . .	1 gramme.

En prendre X gouttes trois fois par jour en cas de toux spasmodique (enfant de 5 ans).

Alcoolature de racines d'aconit. . . . .	} ãã X gouttes.
Teinture de digitale. . . . .	
Sirop de codéine. . . . .	10 grammes.
Hydrolat de tilleul. . . . .	60 —

A prendre, par cuillerées à dessert de 2 en 2 heures (enfant de 5 ans), en cas de palpitations.

Dans la coqueluche, je prescris souvent le mélange suivant :

Alcoolature de racines d'aconit. . . . .	} ãã 1 gramme.
Teinture de belladone. . . . .	
Teinture de drosera. . . . .	
Teinture de grindelia. . . . .	
Teinture de lobelia. . . . .	

En prendre X gouttes, 3, 4 et 5 fois par jour.

**Adonis vernalis.** — L'adonis vernalis (renonculacées) est toni-cardiaque; on emploie feuilles et tige en infusion (2 pour 100) :

Adonis vernalis. . . . .	2 grammes.
Eau bouillante. . . . .	100 —
Passez et ajoutez sirop de café. . . . .	20 —

L'adonidine se prescrit par granules de 2 milligrammes (1 centigramme par jour).

**Adrénaline.** — Cette substance tirée des capsules surrénales forme un sel soluble avec l'acide chlorhydrique (*chlorhydrate d'adrénaline*) qui permet de l'employer en injections hypodermiques. On prend la solution à 1/1000 et on l'étend de son poids d'eau pour injecter seulement 1/2 milligramme par centimètre cube. Pour l'œil les collyres sont à 1/5000. Hémostatique très puissant employé dans les hémorragies et congestions. Contre les hémorroïdes, on peut employer un tampon imbibé de :

Adrénaline à 1/1000. . . . .	1 gramme.
Chlorhydrate de cocaïne. . . . .	0 <sup>rs</sup> ,02
Eau distillée. . . . .	50 grammes.

On peut faire des onctions avec la pommade :

Chlorhydrate d'adrénaline à 1/1000. . . . .	1 gramme.
Vaseline. . . . .	20 grammes.

**Agaric blanc.** — Se prescrit contre les sueurs (5, 10, 20, 25 centigrammes de poudre; 5 à 10 centigrammes d'extrait alcoolique).

L'agaricine ou acide agaricique se prescrit en granules de 1 centigramme (1 par année d'âge).

**Aigremoine.** — On emploie en infusion (50 grammes par litre) les feuilles et sommités fleuries de l'aigremoine eupatoire contre les hydropisies.

**Airol.** (Voyez *Bismuth.*)

**Alcool.** — Excitant du système nerveux, du cœur, l'alcool, quoique toxique, peut être utilisé momentanément à la dose maxima d'une cuillerée à café par jour et par année d'âge (5 grammes environ). On le donnera dans le catarrhe suffocant, dans la faiblesse cardiaque, en un mot, dans les *pneumo* ou *cardioplégies*, sous forme d'eau-de-vie diluée (cognac, rhum, brandy, whisky), ou de vin (Malaga, Porto, Xérès, Grenache, Bordeaux, etc.) :

Cognac ou rhum. . . . .	20 grammes.
Teinture de cannelle. . . . .	2 —
Sirop de fleur d'oranger. . . . .	20 —
Eau distillée. . . . .	60 —

Par cuillerées de 2 en 2 heures dans la journée.

Autre potion cordiale :

Vin de Bordeaux. . . . .	60 grammes.
Sirop de quinquina. . . . .	20 —
Teinture de kola. . . . .	2 —

**Aleuronat.** — L'aleuronat, préconisé par Ebstein dans le diabète, contiendrait 80 à 90 pour 100 d'albumine végétale; on en fait un pain à 50 pour 100 et des soupes, bouillies, sauces, etc.

**Alkékenge.** — Cette solanée est diurétique; les baies entrent dans le sirop de chicorée. On prescrit le suc de baies (2 à 5 grammes par année d'âge), l'infusion (4 à 8 grammes par litre), etc.

**Aloès.** — L'aloès s'obtient en recueillant le suc des feuilles de plusieurs liliacées; on recherche surtout l'aloès *socotrin*, l'aloès des Barbades et celui du Cap. Il entre dans la composition de beaucoup de pilules purgatives: *ante cibum* Anderson, grains de santé, etc. Je l'ai prescrit en suppositoire :

Beurre de cacao. . . . .	2 grammes.
Aloès. . . . .	0 <sup>rs</sup> ,20
Extrait de belladone. . . . .	0 <sup>rs</sup> ,01.

La dose, par la bouche, chez l'enfant, est de 1 centigramme par année d'âge.

**Aloïne.** — Principe actif de l'aloès, se prescrit en granules de 4 centigrammes (un avant le repas, comme apéritif; deux à trois granules en se couchant, comme purgatif).

**Alumine.** — Dans la diarrhée infantile, on a prescrit l'alumine (40 à 50 centigrammes mêlés au sucre). Le *sulfate d'alumine* en solution saturée s'emploie en badigeonnages dans les angines, les ulcères scrofuleux, les polypes des fosses nasales, etc.

**Alummol.** — Poudre blanche employée en solution à 10, 20, 50 pour 100, en pommade (2, 10, 20 pour 100) contre l'eczéma, le prurigo, l'acné, le psoriasis.

**Alun.** — Sulfate double d'alumine et de potasse, se prescrit en collutoire :

Alun. . . . .	4 grammes.
Miel blanc. . . . .	50 —

En gargarisme, on formule :

Alun. . . . .	2 grammes.
Infusion de roses rouges à 5 pour 100. . . . .	250 —
Miel rosat. . . . .	50 —

L'alun calciné en insufflation a été prescrit dans les taies de la cornée avec sucre en poudre. On a fait un crayon avec l'alun cristallisé pour toucher les lésions oculaires.

**Amandes.** — Ces fruits servent à préparer le *lait d'amandes* ou *émulsion simple* :

Amandes douces mondées . . . . .	} aa	52 grammes.
Sucre blanc . . . . .		
Eau froide . . . . .		1000 —

Quand on ajoute des amandes amères aux amandes douces, on peut préparer le looch blanc et le sirop d'orgeat.

L'huile d'amandes douces peut se donner comme laxatif aux nouveau-nés, par cuillerées à café.

**Ambre.** — On fait avec l'ambre gris une teinture qu'on donne en potion (1 à 5 grammes) comme antispasmodique.

**Amers.** — Apéritifs et stomachiques : *quassia amara* (macération de bois à 1 pour 100, quassine amorphe à la dose de 2 à 5 centigrammes, quassine cristallisée à la dose de 2 à 5 milligrammes); *simarouba* (écorce en infusion à 1 pour 100, poudre à la dose de 1 à 2 grammes); *gentiane* (racine en poudre à la dose de 1 à 2 grammes, vin 40 à 50 grammes, teinture 1 à 2 grammes, extrait 50 centigrammes à 1 gramme, infusion à 5 pour 100); *centaurée* (poudre 2 à 4 grammes, extrait 1 à 2 grammes, infusion à 1 pour 100); *ményanthe* ou trèfle d'eau (poudre 20 à 50 centigrammes, extrait 20 à 50 centigrammes, infusion 1 à 2 pour 100); *chicorée* (extrait 2 à 6 grammes, sirop 50 à 50 grammes, suc 20 à 50 grammes); *taraxacum* ou pissenlit (extrait 5 à 6 grammes, infusion 4 pour 100); *colombo* (poudre 1/2 à 1 gramme, teinture 1 à 2 grammes, vin 40 à 50 grammes); *lichen d'Islande* (décoction à 1 pour 100); *condurango* (extrait fluide 1 à 2 grammes, décoction à 4 pour 100, vin 20 à 50 grammes, teinture 1 à 2 grammes); voir plus loin *quinquina* et *noix vomique*.

**Amidon.** — Lavements d'amidon (10 grammes pour 200); bains d'amidon (250 à 500 grammes); glycérolé d'amidon (1 partie d'amidon pour 15 de glycérine).

**Ammoniaque.** — Collodion ammoniacal contre les piqûres d'insectes :

Collodion . . . . .	5 grammes.
Acide salicylique . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50
Ammoniaque . . . . .	XI gouttes.

Esprit de Sylvius et liqueur ammoniacale anisée (V gouttes par année d'âge dans une tisane ou une potion).

Le carbonate d'ammoniaque et le chlorhydrate d'ammoniaque sont des stimulants diffusibles qu'on peut donner en potion (5 à 10 centigrammes par année d'âge) :

Carbonate d'ammoniaque . . . . .	0 <sup>er</sup> ,40
Julep gommeux . . . . .	60 grammes.

Par cuillerées à café d'heure en heure :

Chlorhydrate d'ammoniaque . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50
Sirop de framboises . . . . .	20 grammes.
Eau de menthe . . . . .	40 —

L'acétate d'ammoniaque (*esprit de Mindererus*) se prescrit à la dose de 25 à 50 centigrammes par année d'âge :

Acétate d'ammoniaque . . . . .	4 grammes.
Cognac . . . . .	40 —
Sirop de fleurs d'oranger . . . . .	20 —
Eau distillée de mélisse . . . . .	60 —

Comme lithontriptique, on a donné le phosphate et le benzoate d'ammoniaque (40 à 50 centigrammes par année d'âge).

Comme antispasmodique, le *bromure d'ammonium* a été prescrit (10 centigrammes par année d'âge) :

Bromure d'ammonium . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50
Sirop d'oranges . . . . .	20 grammes.
Eau distillée . . . . .	60 —

Par cuillerées de 2 en 2 heures.

Le *valérianate d'ammoniaque* est un bon antispasmodique à la dose de 5, 10, 20, 50 centigrammes suivant l'âge :

Valérianate d'ammoniaque . . . . .	0 <sup>er</sup> ,20
Glycérine . . . . .	10 grammes.
Sirop de fleurs d'oranger . . . . .	20 —
Eau de fenouil . . . . .	60 —

Par cuillerées de 5 en 5 heures.

On pourrait le donner en lavement :

Valérianate d'ammoniaque . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50
Jaune d'œuf . . . . .	n° 1
Décoction de racines de guimauve . . . . .	200 grammes.

Contre les œdèmes, le purpura, on emploie les compresses imbibées de chlorhydrate d'ammoniaque à 5 pour 100.

**Analgène.** — Antithermique, peu soluble, peu toxique; 10 centigrammes par année d'âge.

**Andropogon.** — Cette graminée a été employée par Labesse contre les piqûres de rouget :

Benzine . . . . .	60 grammes.
Huile de vaseline . . . . .	50 —
Naphtaline . . . . .	} aa 2 —
Essence d'andropogon citratus . . . . .	

**Anémone.** — Cette renonculacée s'emploie en infusion (2 pour 100). Dans la coqueluche, le D<sup>r</sup> Ramur a donné l'extrait d'anémone pulsatile (2 à 4 centigrammes 5 fois par jour, 5 à 8 centigrammes, 8 à 10 centigrammes suivant l'âge).

L'alcoolature de racines se prescrit ainsi :

Alcoolature de racines d'anémone pulsatile . . . . .	1 gramme.
Sirop de fleurs d'oranger . . . . .	20 grammes.
Eau distillée de menthe . . . . .	60 —

Par cuillerées à dessert de 2 en 2 heures.

**Aniline.** — Le D<sup>r</sup> Turnbull a donné, dans la chorée, le sulfate d'aniline (5 à 10 centigrammes 5 fois par jour); on a observé pendant le traitement la cyanose des lèvres. Cela rappelle les accidents imputés par Landouzy et G. Brouardel à la teinture des chaussures jaunes par une couleur noire à base d'aniline (*Acad. de méd.*, 17 juillet 1900). Les enfants, après avoir porté ces chaussures une heure ou deux, tombent dans un état asphyxique avec cyanose périphérique, petitesse du pouls, etc. On est obligé de les réchauffer, de les sinapiser, de leur donner des cordiaux, des inhalations d'oxygène, etc. Donc l'aniline est un poison dangereux qui doit être rayé de la liste des médicaments.

**Aniodol.** — On instille quelques gouttes d'une solution à 1/1000 pour prévenir l'ophtalmie des nouveau-nés (Pinard).

**Anis.** — Fruits de la pimpinella anisum employés seuls ou associés aux semences de carvi, coriandre, fenouil (espèces carminatives). Pour faire la tisane carminative, on fait infuser 5 ou 10 grammes de ces semences dans 500 grammes d'eau. L'eau distillée d'anis se donne en potion (40 à 50 grammes). L'essence d'anis sert à aromatiser les potions (II à X gouttes).

**Anthrarobine.** — Pommade à 1/10 dans le psoriasis.

**Antifébrine.** (Voyez *Acétanilide*.)

**Antimoine.** — *Émétique*, tartre stibié, tartrate double d'antimoine et de potasse, se prescrit à la dose de 1/2 centigramme par année d'âge soit seul, soit associé à l'ipéca. On l'associe également avec le sulfate de soude (éméto-cathartique) :

Tartre stibié . . . . .	0 <sup>er</sup> ,05.
Sulfate de soude . . . . .	20 grammes.
Sirop simple . . . . .	40 —
Eau . . . . .	200 —

A prendre, par gorgées, le matin à jeun dans l'espace d'une heure (enfant de 10 ans).

Pour avoir des selles sans vomissement, on prescrit l'*émétique en lavage* :

Tartre stibié . . . . .	2 à 5 centigrammes.
Eau . . . . .	500 grammes.

A prendre dans la journée par demi-verres.

On a fait des frictions dans la coqueluche avec la pommade d'Autenrieth :

Émétique . . . . .	40 grammes.
Axonge . . . . .	50 —

*Kermès* ou oxysulfure d'antimoine hydraté, poudre rouge, insoluble, se donne à la dose de 1 centigramme par année d'âge comme expectorant et nauséux :

Kermès . . . . .	0 <sup>er</sup> ,05.
Sirop simple . . . . .	20 grammes.
Infusion de polygala . . . . .	60 —

Agiter avant de s'en servir, par cuillerées de 2 en 2 heures.

*Oxyde blanc d'antimoine*, biantimoniade de potasse, antimoine diaphorétique lavé, se donne à la dose de 20 centigrammes par année d'âge :

Oxyde blanc d'antimoine . . . . .	2 grammes.
Looch blanc . . . . .	100 —

Par cuillerées de 2 en 2 heures; agiter avant de s'en servir.

La poudre de tribus ou cornachine peut se prescrire à la dose de 50 centigrammes pour un enfant de 5 ans :

Oxyde blanc d'antimoine . . . . .	} $\bar{a}\bar{a}$
Crème de tartre . . . . .	
Scammonée . . . . .	

**Antipyrine.** — Médicament antithermique et analgésiant, antispasmodique, bien toléré par les enfants, exposant cependant aux érythèmes, à l'anurie. Pour abattre la fièvre et les spasmes, on peut aller jusqu'à 50 centigrammes par année d'âge, avec un maximum de 6 grammes par jour, à condition que l'enfant boive beaucoup.

En lavement on peut prescrire :

Antipyrine . . . . .	1 gramme.
Eau bouillie tiède . . . . .	50 grammes.
Laudanum . . . . .	1 goutte.

On peut injecter sous la peau ou dans les masses musculaires un centimètre cube de :

Antipyrine . . . . .	4 grammes.
Eau de laurier-cerise . . . . .	4 —
Eau distillée . . . . .	6 —

Dans la diarrhée, St-Philippe a prescrit chez les nourrissons :

Antipyrine . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50.
Sirop simple . . . . .	} $\bar{a}\bar{a}$ 50 grammes.
Eau de tilleul . . . . .	

Une cuillerée à café toutes les deux heures avant la tétée ou le repas.

Pour abattre la fièvre ou les mouvements choréiques, il faut donner des doses fortes et massives (1 gramme à la fois), en ne dépassant pas 50 centigrammes par jour et par année d'âge. On peut l'associer au bicarbonate de soude ou à l'eau de Vichy.

**Antispasmine.** — Mélange de narcéine sodique et de salicylate de soude, employé par Demme dans les toux spasmodiques (1 centigramme par année d'âge) :

Antispasmine . . . . .	0 <sup>er</sup> ,05.
Sirop de tolu . . . . .	15 grammes.
Eau distillée . . . . .	45 —

Par cuillerées à café d'heure en heure.

**Apiol.** — Extrait des semences de persil, prescrit dans la dysménorrhée, en capsules de 10 centigrammes (2 par jour). *Apioline cristallisée* (granules de 2 centigrammes, 5 à 6 par jour).

**Apocynum cannabinum.** — La racine du chanvre canadien a des propriétés

émétiques et purgatives. Poudre (1 à 5 centigrammes par année d'âge), teinture à 1/5. (I à IV gouttes par année d'âge).

**Apomorphine.** — On donne en potion comme expectorant 1 à 2 milligrammes de chlorhydrate d'apomorphine dans une potion. On injecte une seringue de Pravaz comme vomitif de :

Chlorhydrate d'apomorphine . . . . .	0 <sup>er</sup> ,05.
Eau distillée bouillie . . . . .	10 cc.

**Arbutine.** — Principe actif de l'uva ursi, en granules de 4 centigrammes (5 à 4 dans la journée) contre les cystites et pyélonéphrites.

**Arec.** — La noix d'arec (*areca catechu*) pulvérisée se donne dans le lait contre le ténia à la dose de 1/2 à 1 gramme par année d'âge.

**Arenaria rubra.** — Plante diurétique employée en décoction (2 pour 100); extrait aqueux : 10 centigrammes 5 fois par jour.

**Argent.** — *Nitrate d'argent* pur en crayon pour cautériser les plaies, mitigé (avec parties égales de nitrate de potasse), en solution (1/50, 1/100, 1/150) pour prévenir ou guérir l'ophtalmie des nouveau-nés. Quand on emploie une solution forte, il faut neutraliser avec l'eau salée. En lavement, on prescrit le nitrate d'argent (10 centigrammes pour 100 grammes). La fissure à l'anus, le prolapsus urétral peuvent être cautérisés avec la solution à 1/50, ou enduits avec la pommade :

Nitrate d'argent . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50.
Axonge . . . . .	1 gramme.

On a donné le nitrate d'argent en pilules (un centigramme avec mie de pain ou kaolin). *Argentamine* utilisée en collyre ou dans la gonococcie.

**Argent colloïdal.** — L'argent colloïdal ou *collargol*, préconisé par Crédé dans les maladies infectieuses les plus diverses, puis par Netter avec enthousiasme, s'emploie en pommade à 15 pour 100 (frictions pendant 15 à 30 minutes avec 2 à 3 grammes, après lavage de la peau). Les injections intra-veineuses se font avec une solution à 1 pour 100 (on injecte 2 à 5 cc.). On peut aussi donner le médicament par la bouche; pilules de 1 à 2 centigrammes avec 10 centigrammes de lactose et glycérine comme excipient, prendre une pilule 1/2 heure avant le repas, et boire un peu de thé ou de lait. En potion, on prescrit 5 centigrammes par cuillerée à dessert. En lavement (10 à 50 centigrammes), en suppositoire (*id.*).

**Argentol.** — Sulfate double d'argent et d'oxyquinoline, peu soluble, succédané de l'iodoforme; en pommade à 1 ou 2 pour 100, en émulsion à 1 ou 2 pour 100. L'*Argonine*, plus soluble, a été employée dans les gonococcies. — *Protargol*. Ce corps est soluble; dans l'ophtalmie purulente, on badigeonne avec une solution à 5 pour 100; pour les irrigations on abaisse le titre à 1 pour 1000. Ces irrigations ont été employées dans les vulvo-vaginites des petites filles (D<sup>r</sup> Bouvy).

**Aristochine.** (Voyez *Quinine*.)

**Aristol.** — Poudre renfermant 45 pour 100 d'iode; peut remplacer l'iodoforme. Pommade à 1/10 :

Aristol . . . . .	5 grammes.
Vaseline . . . . .	50 —

**Armoise.** — Se prescrit dans l'aménorrhée. *Infusion* de sommités (2 à 5 pour 100); *eau distillée* (20 à 50 grammes en potion); *essence* (1 gramme en potion); *extrait* (1 à 2 grammes).

**Arnica.** — *Infusion* de fleurs sèches (2 pour 500); *teinture* ou *alcoolature* (X à XX gouttes en potion).

**Arrhénal.** — Succédané du cacodylate de soude, peut se prescrire par la bouche :

Arrhénal . . . . .	2 grammes.
Alcool phéniqué à 1/10 . . . . .	11 gouttes.
Eau distillée . . . . .	40 —

De cette solution au centième, on peut donner II à V gouttes par année d'âge. Par exemple, à 5 ans, V gouttes matin et soir; à 10 ans, X gouttes. Continuer pendant 10 jours, cesser 10 jours, reprendre, etc.

**Arsenic.** — L'arsenic est un poison violent qui s'accumule; il doit donc être prescrit à doses fractionnées, diluées et interrompues: fractionnées pour qu'on puisse cesser la médication en cas d'intolérance, diluées pour que l'estomac ne soit pas offensé, interrompues après 10, 15 jours d'usage pour éviter l'accumulation.

*Liquor de Fowler* (préparation la plus usitée), se donne à la dose de I à II gouttes par année d'âge; c'est une solution à 1/100 d'acide arsénieux combiné à la potasse (arsénite de potasse):

Acide arsénieux . . . . .	} aa	1 gramme.	
Carbonate de potasse . . . . .			
Alcoolat de mélisse . . . . .			5 grammes.
Eau distillée . . . . .			100 —

Chaque gramme (XX gouttes) contient 1 centigramme d'acide arsénieux, chaque goutte 1/2 milligramme.

On peut faire des injections interstitielles ou sous-cutanées en remplaçant, dans cette solution, l'alcoolat de mélisse par l'eau de laurier-cerise:

Acide arsénieux . . . . .	} aa	0 <sup>er</sup> ,10.	
Carbonate de potasse . . . . .			
Eau de laurier-cerise . . . . .			0 <sup>er</sup> ,50.
Eau distillée . . . . .			q. s. pour 10 cc.

Par quart ou demi-seringue de Pravaz 2 à 4 fois par jour dans le lymphadénome, la leucémie, etc.

*Liquor de Pearson* ou solution d'arséniate de soude à 1 pour 600; l'eau de la Bourboule peut en être considérée comme une dilution. On peut prescrire:

Arséniate de soude . . . . .	0 <sup>er</sup> ,02.
Eau distillée . . . . .	100 grammes.

Une cuillerée à café matin et soir.

Pour injection sous-cutanée:

Arséniate de soude . . . . .	0 <sup>er</sup> ,05.
Eau distillée . . . . .	10 cc.

Injecter 1/4 ou 1/2 seringue de Pravaz.

*Liquor de Boudin* ou solution d'acide arsénieux à 1 pour 1000. Je la prescris dans la chorée de la façon suivante: Chez les enfants au-dessous de 7 ans, je commence par 2<sup>er</sup>,50 le premier jour, augmentant les jours suivants de 2<sup>er</sup>,50 jusqu'à 12<sup>er</sup>,50 et redescendant à la dose initiale par la même gradation, le traitement durant 9 jours. Au-dessus de 7 ans, je conseille de commencer par 5 grammes en augmentant chaque jour de 5 jusqu'à 25 grammes, puis redescendant à 5 grammes. Chaque dose sera diluée dans un julep gommeux de 120 grammes. On fera prendre une cuillerée toutes les deux heures, suivie d'une tasse de lait. Repos au lit et régime lacté. Sans le régime lacté, le traitement n'est pas toléré. La tolérance est également difficile à obtenir quand il fait très chaud, le rein ne fonctionnant pas bien et les urines étant moins abondantes. Weill (de Lyon) a fait préparer un beurre arsenical (mêmes doses) qui favoriserait la tolérance.

*Granules de dioscoride.* Ce sont des granules contenant chacun un milligramme d'acide arsénieux (un par année d'âge).

L'arséniate de fer (mêmes doses) peut se mettre aussi en granules.

Iodure d'arsenic recommandé par St-Philippe dans la scrofule et le lymphatisme:

Iodure d'arsenic . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50.
Eau distillée . . . . .	50 grammes.

Faire dissoudre à froid, donner V gouttes à chaque repas et augmenter d'une goutte matin et soir jusqu'à XV et XX; rester à cette dose pendant un mois, redescendre à V, puis se reposer 10 jours.

**Asa foetida.** — Antispasmodique, peut se prescrire en pilules de 10 centigrammes, en teinture (2 grammes en potion); en lavement avec jaune d'œuf ou:

Asa foetida . . . . .	2 grammes.
Huile d'olive . . . . .	} aa 40 grammes.
Décoction de guimauve . . . . .	

**Asaprol.** — Antiseptique, peut se prescrire à la dose de 10 à 20 centigrammes par année d'âge:

Asaprol . . . . .	1 gramme.
Anisette . . . . .	20 grammes.
Eau de menthe . . . . .	40 —

Par cuillerées de 5 en 5 heures (enfant de 5 ans).

**Asaret.** — Propriétés dépuratives. Poudre de feuilles ou de racines (0<sup>er</sup>,50 à 1 gramme). La poudre est aussi sternutatoire. On fait aussi une macération (10 grammes de feuilles fraîches dans 150 grammes d'eau).

**Aseptol.** — On peut badigeonner la gorge avec:

Aseptol . . . . .	1 <sup>er</sup> ,50.
Glycérine . . . . .	50 grammes.

En même temps on fait bouillir de l'eau additionnée d'une cuillerée à soupe par litre de:

Aseptol . . . . .	} aa 100 grammes.
Glycérine . . . . .	

L'aseptol est un mélange de phénol et d'acide sulfurique.

**Asperge.** — Infusion de racines (2 à 5 pour 100); extrait (1 à 2 grammes) de pointes ou de racines; sirop de pointes ou de racines (15 à 20 grammes); le sirop diurétique dit *sirop des cinq racines* est composé avec les racines d'asperge, d'ache, de fenouil, de persil, de petit houx.

*Asparagine* (2 à 5 centigrammes par année d'âge).

**Aspidospermine.** (Voyez *Quebracho*.)

**Aspirine.** — Succédané du salicylate de soude (25 centigrammes par année d'âge).

**Atropine.** (Voyez *Belladone*.)

**Aunée.** — Décoction de racines (5 pour 100); sirop (20 à 50 grammes); teinture (20 à 4 grammes); extrait (1 à 2 grammes).

*Hélénine* (huile volatile tirée de l'aunée), se donne à la dose de un centigramme par jour et par année d'âge en pilule ou en suspension dans un julep gommeux.

## B

**Babeurre.** — Employé par de Jäger (1895), Teixeira de Mattos, etc., pour l'alimentation des nourrissons dyspeptiques, le babeurre ou *buttermilch* est le petit-lait de la crème. Jacobson (*Arch. de méd. des enfants*, fév., 1905) indique le mode de préparation suivant: laisser aigrir le lait 24 heures, puis le baratter; diluer dans un litre de babeurre ainsi obtenu une cuillerée à soupe de farine (froment, riz, maïs, etc.), porter à l'ébullition sur feu doux en agitant, laisser monter trois fois, puis ajouter 70 à 90 grammes de sucre. Donner toutes les 5 heures une quantité équivalente à ce que prendrait l'enfant au biberon.

**Badiane.** — Les fruits de badiane, ou *anis étoilé*, se prescrivent comme carminatifs, en poudre (1/2 à 1 gramme), en infusion à 1 pour 100, en eau distillée (10 à 20 grammes), en alcoolat (5 grammes).

**Bardane.** — La racine se prend en infusion ou décoction (5 pour 100), en sirop (20 à 50 grammes), en vin, en teinture (5 grammes), en extrait (1 à 2 grammes). Action sudorifique, diurétique et dépurative.