

De cette solution au centième, on peut donner II à V gouttes par année d'âge. Par exemple, à 5 ans, V gouttes matin et soir; à 10 ans, X gouttes. Continuer pendant 10 jours, cesser 10 jours, reprendre, etc.

Arsenic. — L'arsenic est un poison violent qui s'accumule; il doit donc être prescrit à doses fractionnées, diluées et interrompues: fractionnées pour qu'on puisse cesser la médication en cas d'intolérance, diluées pour que l'estomac ne soit pas offensé, interrompues après 10, 15 jours d'usage pour éviter l'accumulation.

Liquor de Fowler (préparation la plus usitée), se donne à la dose de I à II gouttes par année d'âge; c'est une solution à 1/100 d'acide arsénieux combiné à la potasse (arsénite de potasse):

Acide arsénieux	} aa	1 gramme.	
Carbonate de potasse			
Alcoolat de mélisse			5 grammes.
Eau distillée			100 —

Chaque gramme (XX gouttes) contient 1 centigramme d'acide arsénieux, chaque goutte 1/2 milligramme.

On peut faire des injections interstitielles ou sous-cutanées en remplaçant, dans cette solution, l'alcoolat de mélisse par l'eau de laurier-cerise:

Acide arsénieux	} aa	0 ^{er} ,10.	
Carbonate de potasse			
Eau de laurier-cerise			0 ^{er} ,50.
Eau distillée			q. s. pour 10 cc.

Par quart ou demi-seringue de Pravaz 2 à 4 fois par jour dans le lymphadénome, la leucémie, etc.

Liquor de Pearson ou solution d'arséniate de soude à 1 pour 600; l'eau de la Bourboule peut en être considérée comme une dilution. On peut prescrire:

Arséniate de soude	0 ^{er} ,02.
Eau distillée	100 grammes.

Une cuillerée à café matin et soir.

Pour injection sous-cutanée:

Arséniate de soude	0 ^{er} ,05.
Eau distillée	10 cc.

Injecter 1/4 ou 1/2 seringue de Pravaz.

Liquor de Boudin ou solution d'acide arsénieux à 1 pour 1000. Je la prescris dans la chorée de la façon suivante: Chez les enfants au-dessous de 7 ans, je commence par 2^{er},50 le premier jour, augmentant les jours suivants de 2^{er},50 jusqu'à 12^{er},50 et redescendant à la dose initiale par la même gradation, le traitement durant 9 jours. Au-dessus de 7 ans, je conseille de commencer par 5 grammes en augmentant chaque jour de 5 jusqu'à 25 grammes, puis redescendant à 5 grammes. Chaque dose sera diluée dans un julep gommeux de 120 grammes. On fera prendre une cuillerée toutes les deux heures, suivie d'une tasse de lait. Repos au lit et régime lacté. Sans le régime lacté, le traitement n'est pas toléré. La tolérance est également difficile à obtenir quand il fait très chaud, le rein ne fonctionnant pas bien et les urines étant moins abondantes. Weill (de Lyon) a fait préparer un beurre arsenical (mêmes doses) qui favoriserait la tolérance.

Granules de dioscoride. Ce sont des granules contenant chacun un milligramme d'acide arsénieux (un par année d'âge).

L'arséniate de fer (mêmes doses) peut se mettre aussi en granules.

Iodure d'arsenic recommandé par St-Philippe dans la scrofule et le lymphatisme:

Iodure d'arsenic	0 ^{er} ,50.
Eau distillée	50 grammes.

Faire dissoudre à froid, donner V gouttes à chaque repas et augmenter d'une goutte matin et soir jusqu'à XV et XX; rester à cette dose pendant un mois, redescendre à V, puis se reposer 10 jours.

Asa foetida. — Antispasmodique, peut se prescrire en pilules de 10 centigrammes, en teinture (2 grammes en potion); en lavement avec jaune d'œuf ou:

Asa foetida	2 grammes.
Huile d'olive	} aa 40 grammes.
Décoction de guimauve	

Asaprol. — Antiseptique, peut se prescrire à la dose de 10 à 20 centigrammes par année d'âge:

Asaprol	1 gramme.
Anisette	20 grammes.
Eau de menthe	40 —

Par cuillerées de 5 en 5 heures (enfant de 5 ans).

Asaret. — Propriétés dépuratives. *Poudre* de feuilles ou de racines (0^{er},50 à 1 gramme). La poudre est aussi sternutatoire. On fait aussi une macération (10 grammes de feuilles fraîches dans 150 grammes d'eau).

Aseptol. — On peut badigeonner la gorge avec:

Aseptol	1 ^{er} ,50.
Glycérine	50 grammes.

En même temps on fait bouillir de l'eau additionnée d'une cuillerée à soupe par litre de:

Aseptol	} aa 100 grammes.
Glycérine	

L'aseptol est un mélange de phénol et d'acide sulfurique.

Asperge. — *Infusion* de racines (2 à 5 pour 100); *extrait* (1 à 2 grammes) de pointes ou de racines; *sirop* de pointes ou de racines (15 à 20 grammes); le sirop diurétique dit *sirop des cinq racines* est composé avec les racines d'asperge, d'ache, de fenouil, de persil, de petit houx.

Asparagine (2 à 5 centigrammes par année d'âge).

Aspidospermine. (Voyez *Quebracho*.)

Aspirine. — Succédané du salicylate de soude (25 centigrammes par année d'âge).

Atropine. (Voyez *Belladone*.)

Aunée. — *Décoction* de racines (5 pour 100); *sirop* (20 à 50 grammes); *teinture* (20 à 4 grammes); *extrait* (1 à 2 grammes).

Hélénine (huile volatile tirée de l'aunée), se donne à la dose de un centigramme par jour et par année d'âge en pilule ou en suspension dans un julep gommeux.

B

Babeurre. — Employé par de Jäger (1895), Teixeira de Mattos, etc., pour l'alimentation des nourrissons dyspeptiques, le babeurre ou *buttermilch* est le petit-lait de la crème. Jacobson (*Arch. de méd. des enfants*, fév., 1905) indique le mode de préparation suivant: laisser aigrir le lait 24 heures, puis le baratter; diluer dans un litre de babeurre ainsi obtenu une cuillerée à soupe de farine (froment, riz, maïs, etc.), porter à l'ébullition sur feu doux en agitant, laisser monter trois fois, puis ajouter 70 à 90 grammes de sucre. Donner toutes les 5 heures une quantité équivalente à ce que prendrait l'enfant au biberon.

Badiane. — Les fruits de badiane, ou *anis étoilé*, se prescrivent comme carminatifs, en *poudre* (1/2 à 1 gramme), en *infusion* à 1 pour 100, en *eau distillée* (10 à 20 grammes), en *alcoolat* (5 grammes).

Bardane. — La racine se prend en *infusion* ou *décoction* (5 pour 100), en *sirop* (20 à 50 grammes), en *vin*, en *teinture* (5 grammes), en *extrait* (1 à 2 grammes). Action sudorifique, diurétique et dépurative.

Baryum. — Médicament antiscrofuleux.

Chlorure de baryum	0 ^{er} ,10.
Sirop simple	20 grammes.
Eau	100 —

Trois à quatre cuillerées par jour.

Iodure de baryum	0 ^{er} ,20.
Axonge	50 grammes.

Frictions dans les engorgements scrofuleux.

Baume du Pérou. — Cette résine balsamique est stimulante, diurétique, parasiticide.

Baume du Pérou	0 ^{er} ,50
Gomme arabique	2 grammes.
Sirop d'orgeat	20 —
Eau	80 —

Prendre par cuillerées dans la journée.

Baume du Pérou	5 grammes.
Baume nerval	10 —
Eau de Cologne	20 —

Frictions sur les crevasses, engelures, etc.

Baume du Pérou	10 grammes.
Glycérolé d'amidon	50 —

En onctions contre la gale.

Baumes. — Les baumes sont des résines liquides comme le précédent ou des produits complexes, dont les principaux sont : 1° le *Baume du Commandeur* à base d'alcool à 80° dans lequel ont macéré des sommités d'*Hypericum*, de la racine d'angélique, etc.; 2° le *Baume de Fioravanti*, à base d'alcool, térébenthine, laurier, cannelle, styrax, etc.; 3° le *Baume Nerval*, à base de moelle de bœuf, huile, camphre, alcool, etc.; 4° le *Baume Opodeldoch*, à base d'alcool, d'ammoniaque, d'huiles volatiles; 5° le *Baume tranquille*, ou huile de jusquiame composée, qui est calmant. On en renforce l'action avec le chloroforme, le laudanum (2 à 5 grammes pour 50).

Belladone. — Cette plante, antispasmodique et calmante, agit par l'atropine qu'elle contient. On la prescrit dans la coqueluche, les catarrhes bronchiques, les coliques intestinales, la constipation, l'incontinence d'urine.

La *teinture de belladone*, très employée (à 1/5), se donne par gouttes (II par année d'âge) en augmentant progressivement jusqu'à la dilatation des pupilles. On peut l'associer à l'aconit, à la digitale, etc. Le *sirop de belladone*, très actif, contient 75 centigrammes de teinture pour 10 grammes. On le mitigera avec le sirop de tolu (1 à 2 grammes par année d'âge).

L'*extrait* hydroalcoolique de belladone se prescrit à la dose de un centigramme par année d'âge. Pour l'usage externe, l'extrait se prescrit avec l'onguent napolitain (4 grammes pour 50).

Formules antispasmodiques et calmantes :

1° Teinture de belladone	} $\bar{a}\bar{a}$ 2 grammes.
Alcoolature de racines d'aconit	

En donner II à IV gouttes par année d'âge dans une cuillerée à café d'eau sucrée en 3, 4, 5, prises dans la journée.

2° Teinture de belladone	} $\bar{a}\bar{a}$ 1 gramme.
— drosera	
— grindelia	
— lobelia	
Alcoolature de racine d'aconit	

En donner V à X gouttes par année d'âge.

3° Teinture de belladone	} $\bar{a}\bar{a}$ 2 grammes.
Elixir parégorique	

En donner II à IV gouttes par année d'âge.

4° Teinture de belladone	} $\bar{a}\bar{a}$ 2 grammes.
— digitale	
— valériane	

En donner V gouttes par année d'âge.

5° Sirop de belladone	10 grammes.
Sirop de codéine	20 —
Sirop de tolu	70 —

Une cuillerée à café 2, 3, 5 fois par jour suivant l'âge.

6° Teinture de belladone	} $\bar{a}\bar{a}$ X gouttes.	
Alcoolature de racines d'aconit		
Eau de laurier-cerise		5 grammes.
Sirop de coquelicots		20 —
Eau distillée de tilleul	80 —	

Une cuillerée à café toutes les 2 ou 3 heures.

7° Sulfate d'atropine	0 ^{er} ,02.
Eau distillée	5 grammes.

Une goutte dans l'œil matin et soir (kératite, etc.).

8° Sulfate d'atropine	0 ^{er} ,01
Eau distillée	10 grammes.

Dix gouttes le soir, en se couchant, contre l'incontinence nocturne d'urine, augmenter de I goutte chaque soir jusqu'à XX et même XXX suivant l'âge.

9° Extrait de belladone	0 ^{er} ,10.
Bromure de potassium	5 grammes.
Hydrate de chlorate	1 gramme.
Sirop d'écorces d'oranges	100 grammes.

Une cuillerée à café, 2, 3, 5 fois par jour suivant l'âge.

10° Sirop de belladone	10 grammes.
Chlor. de cocaïne	0 ^{er} ,25.

Employé en frictions sur les gencives comme sirop de dentition.

Benjoin. — Baume tiré du *Styrax benzoin*; se prescrit en *poudre* à priser dans la coqueluche, le coryza, etc.

Poudre de benjoin	} $\bar{a}\bar{a}$ 5 grammes.
Bismuthose	
Menthol	

Axonge benzoïnée (1 partie de benjoin concassé pour 25 d'axonge). *Teinture* en potion (1 à 2 grammes).

Benzanilide. — Ce corps résulte de l'action de l'acide benzoïque sur l'aniline; il est antithermique (5 centigrammes par année d'âge).

Benzine. — Agit comme parasiticide; dans la gale, la phthiriasse, on peut se servir de la pommade :

Benzine	10 grammes.
Axonge	50 —

Benzoate de mercure. (Voyez *Mercur*.)**Benzoate de naphthol.** (Voyez *Naphthol*.)**Benzoate de soude.** — Balsamique anticatarrhal et antiacide :

Benzoate de soude	5 grammes.
Sirop de tolu	120 —

En prendre une cuillerée à soupe 2 à 5 fois par jour dans une tasse de tisane de violette.

Bétoine. — Poudre à priser dans le coryza avec :

Bétoine	} ãã
Sauge	
Marjolaine	

Bétol. — Combinaison de naphtol B et d'acide salicylique; employé comme antiseptique intestinal, le bétol se donne à la dose de 10 centigrammes par année d'âge, en paquets dans une cuillerée à café de lait ou d'eau sucrée ou en suspension dans un julep.

Bismuth. — Contre la diarrhée, on emploie surtout le *sous-nitrate de bismuth* (20 centigrammes par année d'âge); peut s'associer au bétol, au benzonaphtol. On peut le prescrire en potion :

Sous-nitrate de bismuth	2 grammes.
Elixir parégorique	XX gouttes.
Sirop de coings	20 grammes.
Eau distillée bouillie	100 —

Agiter avant de s'en servir; par cuillerées dans la journée.

En poudre dans les érythèmes et eczemas :

Sous-nitrate de bismuth	} ãã 20 grammes.
Lycopode	
Talc	

En pommade dans les eczemas infantiles :

Axonge benzoïnée	40 grammes.
Sous-nitrate de bismuth	} ãã 5 grammes.
Oxyde de zinc	

Le *sous-carbonate de bismuth*, le *salicylate de bismuth*, le *benzoate de bismuth*, le *sous-gallate de bismuth* ou *dermatol* peuvent être employés à la place du sous-nitrate. On peut injecter dans l'intestin (entérite muco-membraneuse) à l'exemple de Revilliod :

Sous-nitrate de bismuth	} ãã 5 grammes.
Salicylate de bismuth	
Mucilage de pépins de coings	

L'*airol* ou *dermatol iodé*, l'*orphol* ou naphtolate de bismuth, le *bismuthol* (phosphosalicylate de soude et de bismuth) sont peu usités. La *bismuthose* ou albuminate de bismuth est une poudre blanche qui peut remplacer, dans la diarrhée infantile, les autres sels de bismuth (20 centigrammes par année d'âge).

Bleu de méthylène. — Employé dans la malaria par Moncorvo (20 à 40 centigrammes par jour), dans l'eczéma (solution à 5 pour 100) par Ch. Warren Allen, il a été utilisé en solution par Achard pour étudier la perméabilité rénale :

Bleu de méthylène	1 gramme.
Eau	20 —

On injecte, dans la seconde enfance, 1/2 centimètre cube, profondément, dans les muscles de la fesse.

Le Dr A. Siredey a employé avec succès le bleu de méthylène en poudre contre la stomatite et l'angine ulcéreuses à bacilles fusiformes et spirilles (Vincent).

Boldo. — S'emploie contre les affections hépatiques, en *infusion* de feuilles (1 pour 100), en *teinture* à 1/5 (II à V gouttes par année d'âge). Le principe actif (*boldine*) se donne par granules de 1 milligramme (1 par 2 années d'âge). Exciterait la digestion et la sécrétion biliaire.

Bouillon blanc. (Voyez *Molène*.)

Bourdaine. — S'emploie comme laxatif, en infusion de l'écorce pulvérisée (5 grammes par tasse d'eau bouillante) prise le soir en se couchant, en *extrait fluide* (XX gouttes par année d'âge). Le principe actif de l'écorce, *émodin*, se donnera à la dose de 10 centigrammes par année d'âge.

Bourrache. — Infusion béchique et sudorifique (1 pour 100).

Bromaline. — C'est un bromure de potassium antiseptisé (50 centigrammes par année d'âge dans l'épilepsie) :

Bromaline	10 grammes.
Sirop de fleurs d'oranger	20 —
Eau distillée	40 —

Une cuillerée à café 5 fois par jour.

Bromidia. — Calmant et soporifique, ce médicament d'origine américaine serait ainsi composé :

Bromure de potassium	} ãã 6 grammes.
Chloral	
Extrait de chanvre indien	} ãã 0 ^{er} ,05.
— jusquiame	
Eau	q. s. pour 52 grammes.

On peut diluer, pour les enfants, chaque cuillerée à café dans une cuillerée à soupe de sirop et donner alors d'heure en heure une cuillerée à café de ce mélange.

Bromipine. — Combinaison de brome et d'huile de sésame, peut remplacer les bromures. Solution à 10 et à 55 pour 100 : par cuillerées à café (1 à 3 par jour).

Bromipine à 10 pour 100	100 grammes.
Jaune d'œuf	N ^o 2.
Cognac	15 grammes.
Menthol	0 ^{er} ,15.

En prendre 5 cuillerées à café par jour dans la seconde enfance.

Bromoforme. — Médicament antispasmodique d'un emploi dangereux (coqueluche). Renouveler la potion tous les jours.

Bromoforme	XX gouttes.
Looch huileux du Codex	60 grammes.

A prendre en 5 ou 4 doses dans la journée (enfant de 5 ans). On donne IV gouttes par année d'âge, et on augmente ensuite de II gouttes jusqu'à effet (Marfan).

Bromures. — Médicaments antispasmodiques prescrits dans la chorée, les convulsions, l'épilepsie, etc. Le *bromure de potassium* se donne à la dose de 20 centigrammes par année d'âge et dans les cas graves 1 gramme par année d'âge. Longtemps continué, ce médicament expose à l'*acné bromique* et à des éruptions parfois déconcertantes. On peut associer ensemble les bromures de *potassium*, de *sodium*, de *strontium*, d'*ammonium* :

Bromure de potassium	} ãã 1 gramme.
— sodium	
— ammonium	
Eau distillée	100 grammes.

Par cuillerées à café toutes les 2 ou 3 heures suivant l'âge, dans un peu de lait. On peut remplacer l'eau par le sirop d'écorces d'oranges amères.

Le *bromure d'or*, peu usité, se prescrit en granules d'un milligramme (5 à 6 par jour).

Les bromures d'*éthylène*, de *nickel*, de *camphre*, se prescrivent par décigrammes (10, 20, 30, 40 centigrammes par jour).

Le *bromure d'éthyle* sert à l'anesthésie (inhalation de 5, 10, 15 grammes).

Bryone. — Racine purgative et diurétique employée contre les affections des voies respiratoires. *Poudre* (20 centigrammes, 4 ou 5 fois par jour); *décoction* (8 grammes par litre), *teinture* à 1/5 (2 grammes).

Teinture de bryone	} ãã 1 gramme.
— drosera	
— grindelia	
Sirop de terpine	20 grammes.
Eau distillée	60 —

Par cuillerées à dessert de 2 en 2 heures.

La *bryonine* se prescrit à la dose de un milligramme par année d'âge, contre la paresse du cæcum et du gros intestin.

Buglosse. — Plante pectorale et sudorifique, *infusion* ou *décoction* (20 grammes par litre quand les feuilles et fleurs sont sèches, 60 grammes dans le cas contraire).

Bugrane. — *Décoction* de racines (1 à 2 pour 100) contre l'ictère et les hydro-pisies (diurétique).

Buis. — *Décoction* de racines (15 grammes d'écorce pour 500, 50 grammes de racine entière). S'il s'agit des feuilles, 5 à 4 grammes pour 500 suffisent.

Busserole ou **uva ursi.** — Poudre de feuilles (1 à 2 grammes); *infusion* ou *décoction* de feuilles à 1 pour 100.

Toutes ces préparations sont diurétiques, on peut les édulcorer avec l'oxymel scillitique.

C

Cachou. — Astringent qui peut se prescrire en *teinture* à 1/5, en *sirop* dans la diarrhée :

Teinture de cachou	5 grammes.
Sirop de ratanhia	20 —
Eau de menthe	60 —

Par cuillerées à café, d'heure en heure.

Cadmium. — Le sulfate de cadmium peut remplacer le sulfate de zinc, dans les conjonctivites :

Sulfate de cadmium	0 ^{er} ,01.
Laudanum de Sydenham	1 goutte.
Eau distillée	10 grammes.

Instiller dans l'œil une goutte, matin et soir.

Café et caféine. — Le café est un stimulant du système nerveux, un toni-cardiaque, un diurétique. L'*infusion* de café a été recommandée contre les vomissements de la coqueluche. Elle peut servir à administrer les sels de quinine, l'huile de ricin. Le *sirop de café*, préparé avec 125 grammes de café torréfié et moulu pour 1 kilogramme de sirop simple, sert à édulcorer les potions toniques du cœur :

Teinture de digitale	X gouttes.
Benzoate de soude	1 gramme.
Sirop de café	20 grammes.
Eau distillée	60 —

A prendre dans la journée (enfant de 4 à 5 ans).

La *caféine* ou méthylthéobromine se trouve dans le café, le thé, le guarana, la kola, le maté, le cacao. On la prescrit en potion ou en injection sous-cutanée (10 centigrammes par année d'âge), dans les états adynamiques :

Caféine	0 ^{er} ,50
Salicylate de soude	1 gramme.
Sirop de cerises	50 grammes.
Eau distillée	80 —

Par cuillerées de 2 en 2 heures pour un enfant de 5 à 6 ans.

Caféine	2 ^{er} ,50
Benzoate de soude	5 grammes.
Eau distillée	10 c. c.

Une à deux injections sous-cutanées par jour. Ce mode d'administration expose à l'agitation et au délire.

Valérianate de caféine, a été employé dans la coqueluche; on fait un sirop ainsi composé :

Valérianate de caféine	1 ^{er} ,50
Sirop de café	250 grammes.

Donner une cuillerée à café par jour et par année d'âge.

Caïnca. — La racine de cette plante est hydragogue; la *décoction* après macération de 8 grammes dans 250 grammes d'eau est surtout efficace.

Calcium. — La *chaux*, ou protoxyde de calcium, sert à préparer l'*eau de chaux* employée dans la diarrhée infantile. Un litre d'*eau de chaux médicinale* contient environ 1^{er},25 de chaux vive dissoute; on en donne 60 grammes par litre de lait; on peut la donner étendue de son poids d'eau sucrée (1 cuillerée à café avant la tétée). Avec l'*eau de chaux* et l'*huile d'amandes douces* (āā) on obtient le *liniment oléo-calcaire*.

Le *sirop de saccharate de chaux* (25 centigrammes de chaux pour 10 grammes) est utile dans la diarrhée infantile.

Le *carbonate de chaux lavé* ou *craie préparée* (10 à 20 centigrammes par année d'âge) se prescrit dans les dyspepsies et entérites :

Craie préparée	} āā 0 ^{er} ,20
S.-n. de bismuth.	
Benzonaphthol.	

Pour un paquet; en prendre 5 ou 4 par jour délayés dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée.

Le *phosphate de chaux tribasique*, ou poudre d'os, a des propriétés antidiarrhéiques; il forme la base de la *décoction blanche de Sydenham*. On peut, dans les paquets précédents, remplacer la craie par le phosphate de chaux.

Pour les autres phosphates, Voyez *Phosphore*.

Le *chlorure de calcium* est un hémostatique qui se prescrit en potion à la dose de 20 centigrammes par année d'âge.

Chlorure de calcium	1 gramme.
Sirop simple	20 grammes.
Eau	60 —

A prendre par cuillerées, de 2 en 2 heures, dans les cas d'hémophilie, purpura, épistaxis, variole hémorragique, etc. (enfant de 5 ans).

Le *chlorure de chaux*, ou *hypochlorite de chaux*, forme la base de la *liqueur de Labarraque* (50 grammes pour 1000 en irrigations dans la diphtérie). La solution à 1/60 d'hypochlorite de chaux sera employée en lavages et injections sous-cutanées contre les morsures de serpents.

Le *bromure de calcium* (5 centigrammes par année d'âge) servira de calmant pour les nourrissons.

Calomel. — Voyez *Mercur*.

Camomille. — C'est un tonique, stimulant, antispasmodique; *infusion* à 1 pour 100, chaude, dans les douleurs gastro-intestinales. L'*huile de camomille*, pure ou camphrée, est employée pour l'usage externe (onctions sur le ventre). *Eau distillée de camomille* (40 à 50 grammes).

Campêche. — Bois astringent, employé dans la diarrhée en *poudre* (1 à 2 grammes), en *décoction* (1 à 5 pour 100), en *extrait* (1 à 5 grammes) :

Décoction de bois de campêche	60 grammes.
Sirop de coings	20 —
Élixir parégorique	XX gouttes.

A prendre par cuillerées, de 2 en 2 heures.

Extrait de bois de campêche	2 grammes.
Gomme	9 —
Teinture de cachou	5 —
Sirop de ratanhia	20 —
Eau de menthe	60 —

Par cuillerées à café, d'heure en heure (Rilliet et Barthez).

Camphre. — Le camphre entre dans l'*eau sédative* sous forme d'*alcool camphré* (10 pour 100 d'alcool à 90°), d'*eau-de-vie camphrée* (2 1/2 pour 100 d'alcool à 60°).