

Créosotal ou carbonate de créosote, liquide visqueux, mieux toléré que la créosote (5 à 10 grammes par jour); carbonate de gâïacol (10 centigrammes par année d'âge). On a prescrit encore le phosphate et le phosphite de gâïacol, le phosphite de créosote ou phosphotal.

Cryogénine. — Antithermique recommandé dans la tuberculose (20 à 40 centigrammes suivant l'âge au début de l'ascension thermique).

Cubèbe. — Le poivre cubèbe se prescrit à la dose de 1 gramme par année d'âge avec sirop ou sucre, etc. On a fait un saccharure avec extrait hydro-éthéro-alcoolique de cubèbe.

Cuivre. — Oxyde noir de cuivre contre le ténia (Filatoff) :

| | |
|---------------------------------|------------|
| Oxyde noir de cuivre | 5 grammes. |
| Craie | 1 gramme. |
| Poudre d'agaric blanc | 6 grammes. |
| Glycérine | 5 — |

Pour 60 pilules; en prendre 2 deux fois par jour pendant 15 jours, puis 10 à 15 grammes d'huile de ricin.

Sulfate de cuivre, vomitif, à la dose de 20 à 50 centigrammes dans un demi-verre d'eau. Solution à 5 pour 100 sert à désinfecter les selles; à 1 pour 100, elle sert au pansement des plaies, du prurigo de Hébra, etc. Le sulfate de cuivre entre dans la composition de l'eau d'Alibour.

Cumin. — Poudre (1/2 à 1 gramme); infusion à 1 pour 100; huile volatile (V à X gouttes); teinture éthérée (id.).

Cyclamen. — Le rhizome a été employé comme résolutif dans les tumeurs scro-uleuses.

Cytise. — L'extrait, à la dose de 1 à 5 centigrammes, calmerait les quintes de coqueluche, les accès d'asthme, etc.

D

Datura stramonium. — Propriétés analogues à celles de la belladone et de la jusquiame, se prescrit surtout dans l'asthme : feuilles roulées en cigarettes. Alcoolature ou teinture (II gouttes par année d'âge), extrait alcoolique (1/2 centigramme par année d'âge). Sirop de datura (75 centigrammes de teinture par 10 grammes) : 1 gramme par année d'âge.

Daturine, analogue à l'atropine : granules de 1 milligramme (2 à 4 par jour).

Delphine (Voyez *Staphisaigre*).

Dentifrices. — Il faut de bonne heure frotter les dents des enfants avec une brosse dure chargée de poudre ou de savon dentifrice :

| | |
|--|---------------------|
| 1° Charbon de peuplier | 100 grammes. |
| Poudre de quinquina gris | 50 — |
| Essence de menthe | 0 ^{er} ,50 |
| 2° Craie préparée | } ãã 20 grammes. |
| Magnésie calcinée | |
| Sucre en poudre | |
| 3° Savon de magnésie | 40 grammes. |
| Carbonate de chaux précipité | 50 — |
| Savon médicinal | 5 — |
| Essence de roses | X gouttes. |
| Carmin | 0 ^{er} ,40 |
| 4° Savon médicinal en poudre | 20 grammes. |
| Glycérine neutre | q. s. |
| Acide salicylique | 0 ^{er} ,50 |
| Essence de badiane | 1 gramme. |
| Carmin et éosine | traces. |

(Cassine).

Il faut que les dentifrices soient alcalins.

Digitale. — Poudre (1 à 2 centigrammes par année d'âge) en suspension, cachet ou pilule, en infusion ou macération :

| | |
|---|---------------------|
| 1° Poudre de feuilles de digitale | 0 ^{er} ,10 |
| Sirop de café | 20 grammes. |
| Eau distillée | 40 — |

Agiter avant de s'en servir, par cuillerées à dessert de 2 en 2 heures.

| | |
|---|---------------------------|
| 2° Poudre de feuilles de digitale | } ãã 0 ^{er} ,05. |
| — scille | |
| — scammonée | |

Pour une pilule ou un cachet (2 à 5 par jour pour enfant de 10 à 15 ans).

| | |
|---|---------------------|
| 3° Poudre de feuilles de digitale | 0 ^{er} ,20 |
| Faire infuser une heure dans eau bouillante | 100 grammes. |
| Passer et ajouter sirop de pointes d'asperges | 20 — |

Pour un enfant de 10 ans.

| | |
|--|---------------------|
| 4° Poudre de digitale | 0 ^{er} ,20 |
| Faire macérer 12 heures dans eau | 100 grammes. |
| Passer et ajouter sirop des cinq racines | 20 — |

La teinture de digitale (II gouttes par année d'âge), le sirop de digitale (25 centigrammes de teinture pour 10 grammes) sont aussi très usités.

Digitaline. — La digitaline cristallisée peut se donner en granules de 1/10 ou 1/4 de milligramme ou en solution au millième :

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Digitaline chloroformique | 0 ^{er} ,01 |
| Alcool à 90° | 45 grammes. |
| Eau distillée | 15 — |
| Glycérine à 28° | 40 — |

Un gramme ou L gouttes contient 1/10 de milligramme.

| | |
|---|-------------|
| Solution de digitaline à 1/1000 | 1 gramme. |
| Sirop de digitale | 20 grammes. |
| Eau distillée | 40 — |

Par cuillerées à café d'heure en heure.

Dionine. — La dionine ou chlorhydrate d'éthylmorphine se prescrit comme cette dernière à la dose de 1 milligramme par jour et par année d'âge :

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Dionine | 0 ^{er} ,10 |
| Eau de laurier-cerise | 10 grammes. |

Prendre V à X gouttes trois fois par jour.

Dans la diarrhée, on peut prescrire :

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Sous-nitrate de bismuth | 5 grammes. |
| Dionine | 0 ^{er} ,10 |

Faire 20 paquets; un toutes les 3 ou 4 heures.

Diurétine (Voyez *Théobromine*).

Diurétiques. — Poudres :

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1° Nitrate de potasse | } ãã 10 grammes. |
| Guimauve | |
| Réglisse | |
| Gomme arabique | } ãã 60 grammes. |
| Lactose | |

Prendre une cuillerée à café dans un verre d'eau.

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 2° Poudre de scille | } ãã 0 ^{er} ,25 |
| — digitale | |
| Sucre de lait | 5 grammes. |

Faire 5 paquets; un toutes les 2 heures.

Tisanes :

| | |
|---|------------------------------|
| 1° Feuilles et fleurs d'ulmaire | 15 grammes. |
| Infuser longtemps dans eau | 500 — |
| Ajouter lactose ou sirop des cinq racines | 50 — |
| 2° Cinq racines | 10 grammes. |
| Infusion prolongée dans eau | 500 — |
| Ajouter sirop | 50 — |
| 3° Décoction de chiendent | 500 grammes. |
| Acétate de potasse | } $\bar{a}\bar{a}$ 1 gramme. |
| Nitrate de potasse | |
| Sirop | 50 grammes. |

Potions :

| | |
|---|--------------------------------|
| 1° Infusion de baies de genièvre à 5 pour 100 | 200 grammes. |
| Acétate de potasse | } $\bar{a}\bar{a}$ 2 — |
| Nitrate de potasse | |
| Oxymel scillitique | } $\bar{a}\bar{a}$ 15 — |
| Sirop des cinq racines | |
| 2° Oxymel scillitique | } $\bar{a}\bar{a}$ 10 grammes. |
| Sirop de digitale | |
| Alcool nitrique | 1 gramme. |
| Eau distillée d'hysope | 60 grammes. |

Vins diurétiques :

- 1° Vin de la Charité (à base de scille), se donne à la dose de 20 à 50 grammes.
2° Vin de Trousseau (à base de digitale), se donne à la dose de 15 à 50 grammes.

Donovan. — La liqueur ou potion de Donovan contient :

| | |
|--|------------|
| Solution iodo-arsenico-mercurielle | 4 grammes. |
| Sirop de gingembre | 16 — |
| Eau distillée | 80 — |

La solution d'iodure d'arsenic a pour formule elle-même :

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Iodure arsénieux | } $\bar{a}\bar{a}$ 1 gramme. |
| Biiodure de mercure | |
| Eau distillée | 98 grammes. |

Le Dr Saint-Philippe a prescrit dans la scrofule et le lymphatisme cet iodure d'arsenic (X gouttes par jour).

Dormiol. — Composé de chloral et d'hydrate d'amylène, se formule ainsi :

| | |
|---------------------------|------------|
| Dormiol | 5 grammes. |
| Sirop d'oranges | 10 — |
| Julep gommeux | 60 — |

Une à deux cuillerées à café en se couchant.

Drosera. — La teinture se prescrit à la dose de 1 à 2 grammes (coqueluche).

Duboisine. — Remplace l'atropine (1 pour 500 ou 400); à l'intérieur, granules de 1 milligramme (2 à 4).

Dulcine. — Remplace la saccharine; cinq centigrammes sucent une potion de 150 grammes.

E

Eau albumineuse. — Prescrite dans les diarrhées infantiles, doit être fraîchement préparée, car elle est très altérable :

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Blanc d'œuf | n° 1 ou n° 2. |
| Eau de fleurs d'oranger | 10 grammes. |
| Eau pure q. s. pour | 1 litre. |

Eau blanche. — Astringent très employé :

| | |
|---|-------------|
| Sous-acétate de plomb liquide | 20 grammes. |
| Eau | 980 — |

Eau d'Alibour. — Vieil antiseptique très recommandé contre l'impétigo; on imbibes des compresses de tarlatane avec la solution pure ou coupée à 1/2, 1/3 :

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Camphre à saturation | q. s. |
| Sulfate de cuivre | 2 grammes. |
| — zinc | 7 — |
| Safran | 0 ^{er} ,40 |
| Eau distillée | 200 grammes. |

Eau de Goulard (Voyez Plomb).

Eau-de-vie allemande. — Macération de 8 jours avec :

| | |
|----------------------------|------------|
| Racine de jalap | 8 grammes. |
| — turbithe | 1 gramme. |
| Scammonée d'Alep | 2 grammes. |
| Alcool à 60° | 66 — |

Dose (1 gramme par année d'âge avec 1 gramme de sirop de nerprun).

Eau oxygénée (Voyez Oxygène).

Ektogan (Voyez Zinc).

Élatérine. — Tirée du concombre sauvage, se prescrit comme drastique en granules de 1 milligramme (1 à 2 le matin).

Élixirs. — Médicaments à base d'alcool.

1° Élixir parégorique (X gouttes par année d'âge) :

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Camphre | 2 grammes. |
| Extrait thébaïque | } $\bar{a}\bar{a}$ 5 — |
| Acide benzoïque | |
| Huile volatile d'anis | } 650 — |
| Alcool à 60° | |

2° Élixir antiscrofuleux :

| | |
|----------------------------------|------------|
| Carbonate d'ammoniaque | 2 grammes. |
| Racine de gentiane | 4 — |
| Alcool à 60° | 125 — |

Prescrire 5 à 10 grammes dans une potion.

Émétique. — Principe actif de l'ipéca; granules de 5 milligrammes (2 dans un peu d'eau sucrée).

Émétique (Voyez Antimoine).

Ergot de seigle. — Poudre (5 à 10 centigrammes par année d'âge). — Teinture (II gouttes par année d'âge). Extrait alcoolique ou extrait fluide américain (10 centigrammes par année d'âge). Infusion prolongée (15 grammes dans 150 d'eau) : 1/2 cuillerée 3 fois par jour; agirait bien dans le paludisme chronique (A. Jacobi).

Ergotine, n'est qu'un extrait d'ergot; l'ergotine Bonjean n'est qu'un extrait aqueux; l'ergotine Yvon est un extrait alcoolique :

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Ergotine | 1 gramme. |
| Eau distillée | } $\bar{a}\bar{a}$ 10 grammes. |
| Glycérine | |

Pour injections hypodermiques (1/2 à 1 c. c.).

En potion, on peut formuler :

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Ergotine Yvon | 1 gramme. |
| Sirop de fleurs d'oranger | 20 grammes. |
| Eau distillée | 80 — |

Par cuillerées de 2 en 2 heures.

Ergotinine, se prescrit en sirop (1/4 de milligramme par cuillerée à café) ou en injection sous-cutanée :

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Ergotinine | 0 ^{er} ,01 |
| Acide lactique | 0 ^{er} ,02 |
| Eau de laurier-cerise | 10 grammes. |

Injecter 1/4 à 1/2 seringue de Pravaz.

Érysimum. — Employé dans les catarrhes bronchiques et laryngés. *Infusion* (10 à 20 grammes de feuilles par litre); *sirop* (20 à 50 grammes).

Érythrol. — C'est un iodure double de bismuth et de cinchonidine prescrit pour panser les plaies fétides et par A. Robin dans les dyspepsies avec fermentation :

| | |
|-------------------------------|--|
| Érythrol | } $\bar{a}\bar{a}$ 0 ^{er} ,02 |
| Fluorure de calcium | |
| Magnésie calcinée | |

Pour un paquet; un à la fin de chaque repas.

Érythropléine. — Tonique cardio-vasculaire; *granules* de 1/10 de milligramme (2 à 5 par jour).

Ésérine. — Alcaloïde de la fève de Calabar, fait contracter la pupille :

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Sulfate d'ésérine | 0 ^{er} ,02 |
| Eau distillée | 5 grammes. |

Instiller une goutte matin et soir dans l'œil.

Dans le tétanos, Martin Damourette prescrivait 1 milligramme d'ésérine par heure jusqu'à sédation. Bouchut a donné jusqu'à 15 et 20 milligrammes dans la chorée. On peut l'employer en injections hypodermiques :

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Sulfate d'ésérine | 1 centigramme. |
| Eau distillée | 10 grammes. |

Éther. — Les pulvérisations d'éther sulfurique ont été employées sur la colonne vertébrale dans la chorée, sur le cou dans l'œsophagisme et la coqueluche, sur les bourses dans l'hydrocèle vaginale. West fait respirer aux coquelucheux :

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Éther | 60 grammes. |
| Chloroforme | 50 — |
| Essence de térébenthine | 40 — |

On peut faire inhaler l'éther dans les convulsions infantiles.

Dans l'érysipèle, Cavazzani badigeonne toutes les 5 heures avec :

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Éther | 8 grammes. |
| Tanin | } $\bar{a}\bar{a}$ 1 gramme. |
| Camphre | |

Comme stimulant, on a fait des injections hypodermiques d'éther (1/2, 1 centimètre cube).

L'éther iodoformé (5 pour 100) a été injecté dans la cavité des abcès froids.

Le *sirop d'éther* est antispasmodique, à la dose d'une cuillerée à café par jour et par année d'âge.

Eucaïne A et B. — Succédané de la cocaïne (solution de chlorhydrate d'eucaïne à 2 pour 100).

Eucalyptus. — Vaporisations, fumigations, pulvérisations avec l'infusion de feuilles. *Teinture* (1 à 2 grammes) dans les bronchites fétides :

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Teinture d'eucalyptus | 2 grammes. |
| Sirop de fleurs d'oranger | 50 — |
| Eau distillée | 70 — |

Eucalyptol et *eucalyptéol*, dérivés de l'essence d'eucalyptus (mêmes indications).

Eudoxine. — Iodure de bismuth, prescrit dans la diarrhée infantile (5 à 10 centigrammes toutes les 5 heures).

Eukinase. — Contient un ferment digestif (*entéro-kinase*) et agit dans la constipation; on en fait des granules (20 centigrammes par cuillerées à café).

Euphorbe. — Le suc laiteux agit contre les verrues. Les semences sont purgatives (5 à 6 broyées avec du miel). *Huile d'épurga* (5 à 5 gouttes) purgative.

Euphorine. — Antipyrétique et analgésique (5 centigrammes par année d'âge). Topiquement on peut toucher les aphtes avec :

| | |
|-----------------------|------------|
| Euphorine | 5 grammes. |
| Alcool à 60°. | 50 — |

Euquinine. — Éther éthylocarbonique de la quinine, presque insipide (10 centigrammes par année d'âge).

Europhène. — Analogue à l'aristol, sert au pansement des plaies. Mêler avec parties égales d'acide borique. Incompatible avec l'amidon.

Évonymine (Voy. *Fusain*).

Exalgine. — Plus toxique que l'antipyrine (5 à 10 centigrammes seulement).

Extrait surrénal. — L'extrait de capsules surrénales est hémostatique; saupoudrer le foyer hémorragique avec l'extrait sec. Peut se donner par la bouche (1/2 à 1 gramme en 4 ou 5 doses dans la journée). Peut être employé en collyre. Mais on préfère de plus en plus le *chlorhydrate d'adrénaline* qui en dérive.

F

Fenouil. — Propriétés carminatives : *poudre* de semences (10 centigrammes par année d'âge); *infusion* (2 à 5 pour 100); *eau distillée* comme véhicule des potions carminatives.

Fer. — Médicament de l'anémie. En injections sous-cutanées, on peut employer :

| | |
|--------------------------|-------------|
| Citrate de fer | 1 gramme. |
| Eau distillée | 15 grammes. |

Une demi-seringue de Pravaz 5 fois par semaine.

En poudre, on a prescrit la *limaille de fer*, le *sous-carbonate de fer*, le *protoxalate de fer* :

| | |
|------------------------------|---|
| 1° Limaille de fer | 0 ^{er} ,15 |
| Poudre de rhubarbe | } $\bar{a}\bar{a}$ 0 ^{er} ,20. |
| Poudre de cannelle | |

Pour un paquet, à prendre avant le repas dans une cuillerée d'eau sucrée.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 2° Sous-carbonate de fer | 0 ^{er} ,05 |
| Poudre de rhubarbe | 0 ^{er} ,20 |
| Poudre de noix vomique | 1 centigramme. |

Pour un paquet, à prendre avant le repas.

| | |
|---------------------------------|---|
| 3° Protoxalate de fer | 0 ^{er} ,05 |
| Magnésie calcinée | } $\bar{a}\bar{a}$ 0 ^{er} ,20. |
| Bicarbonate de soude | |

Pour un paquet, à prendre avant le repas.

En solution, on prescrit le perchlorure de fer (V à X gouttes par jour) dans l'eau sucrée, la teinture de mars (*idem*).

Granules d'arséniate de fer (1 milligramme) au nombre de 5 à 4 par jour.

On a encore prescrit le fer sous forme de *vin ferrugineux*, sirop de quinquina ferrugineux, *sirop d'iodure de fer*, etc. Enfin, viennent les eaux minérales ferrugineuses (Spa, Orezza, Renlaigue, etc.).

Ferratine. — C'est un albuminate de fer, prescrit à la dose de 20 à 25 centigrammes trois fois par jour.

Ferripyrine. — Combinaison de perchlorure de fer et d'antipyrine (20 à 50 centigrammes par jour) :

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Ferripyrine | 0 ^{er} ,40 |
| Sirop d'écorces d'oranges | 20 grammes. |
| Eau distillée | 100 — |

En prendre 3 cuillerées à soupe par jour.

Fève de calabar (Voy. *Ésérine*).

Fève de Saint-Ignace. — Forme la base des gouttes amères de Baumé (1 goutte par jour et par année d'âge); suspendre après 10 ou 15 jours.

Formol. — Lotions contre les piqûres de moustiques (Manquat) :

| | |
|--|------------|
| Formol à 40 pour 100 du commerce | 5 grammes. |
| Alcool à 90° | } ãã 10 — |
| Eau | |

Fougère mâle. — Ténifuge efficace. *Extrait éthéré* (1/2 gramme par année d'âge), en capsules ou potion :

| | |
|--|------------|
| Extrait éthéré de fougères mâles | 2 grammes. |
| Jus ou extrait de réglisse | 5 — |
| Mucilage de gomme | 10 — |
| Sirop de fleurs d'oranger | 50 — |
| Eau | 50 — |

A prendre à jeun (enfant de 4 ans). Faire suivre d'un purgatif.

Frêne. — *Décoction* de feuilles (5 pour 100), dans le rhumatisme.

Fuchsine. — Prescrite contre la néphrite et l'albuminurie (5 à 25 centigrammes par jour).

Fumeterre. — *Infusion* ou *décoction* (2 à 5 pour 100); *sirop* (20 grammes); *extrait* (2 à 4 grammes).

Fusain. — Charbon léger pour l'antisepsie in estinale :

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Poudre de charbon de fusain | } ãã 0 ^{sr} .20. |
| Benzonaphtol | |
| Magnésie calcinée | |

Pour un paquet, à prendre 2 ou 3 par jour.
Évonymine, tirée des fruits et feuilles (pilules de 5 centigrammes contre la constipation).

G

Gaiacol (Voy. *Créosote*).

Galactagogues. — *Ortie* en *décoction* (20 à 25 grammes par litre); *galéga* en *infusion*, *extrait*, etc. :

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1° Feuilles de galéga | 50 grammes. |
| Infusion dans eau | 1000 — |
| Ajoutez sirop | 100 — |
| 2° Extrait aqueux de galéga | 50 — |
| Sirop simple | 1000 — |

En prendre 4 à 5 cuillerées par jour.

| | |
|--------------------------------|--------|
| 3° Extrait de galéga | 65 — |
| Alcool à 60° | 1000 — |

Prendre 4 à 6 gouttes de cette teinture par jour.

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 4° Extrait de galéga | 0 ^{sr} .25 |
| Excipient | q. s. |

Pour une pilule (4 à 5 par jour).

On a recommandé le chlorate de potasse (5 à 4 gr. par jour), l'infusion de racines de tasi (del Arca) : 50 grammes pour 200, et la *décoction* de fruits de tasi (40 grammes pour 200).

Gallanol. — Poudre blanche employée dans l'eczéma et le psoriasis, pommade à 1/10.

Gargarismes. — On peut employer des gargarismes : 1° *astringents*; 2° *calmants emollients*; 3° *antiseptiques*, etc.

| | |
|----------------------------|------------|
| 1° Alun | 2 grammes. |
| Mellite de roses | 20 — |
| Décoction d'orge | 200 — |

| | |
|---|--------------|
| 2° Décoction de racines de guimauve | 200 grammes. |
| Sirop de miel | } ãã 15 — |
| Sirop diacode | |
| 3° Liqueur de Labarraque | 10 — |
| Eau | 200 — |

Gastérine. — Suc gastrique animal, se prescrit par 50, 100, 200 grammes dans eau, vin, bière, thé, bouillon. S'abstenir d'alcalins.

Gélatine. — Bon hémostatique local et général, en solution à 5 pour 100 :

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Gélatine | 50 grammes. |
| Chlorure de calcium | 10 — |
| Eau | 1000 — |

Pour les injections hypodermiques, on emploie une solution stérilisée à 2 pour 100. Contre la diarrhée infantile, Weill a employé la *gélatine* en solution dans le sérum artificiel :

| | |
|------------------------------|--------------|
| Gélatine | 100 grammes. |
| Chlorure de sodium | 7 — |
| Eau distillée | 1000 — |

On fait des tubes de 10 grammes de la solution et on les stérilise à 110° ou 120° (autoclave). Chaque tube contenant 1 gramme de gélatine est mis dans le biberon de lait (4 à 6 ou 8 grammes dans les 24 heures).

Genêt. — *Décoction* de sommités (5 à 4 pour 100); *infusion* de fleurs (*idem*). La *spartéine* est tirée du genêt. Cette plante est diurétique.

Genévrier. — La *décoction* de baies de genièvre (5 pour 100) est diurétique : on édulcore avec l'oxymel scillitique. Le liniment de Rosen est à base d'alcoolat de genièvre.

Gentiane. — Plante apéritive et tonique, se donne en *poudre* (1 à 2 grammes), en *macération* ou *infusion* (1 pour 100), en *teinture* à 1/5 (1 à 2 grammes), en *vin* (50 grammes de racines macérant dans 60 grammes d'alcool, pour un litre de vin rouge), en *extrait* (1/2 à 1 gramme).

Géosote. — Valérianate de gaiacol, se prescrit en gouttes ou potion :

| | |
|------------------------------|------------|
| 1° Géosote | 5 grammes. |
| Alcoolat de menthe | 50 — |

En prendre X à XX gouttes trois fois par jour dans du lait :

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 2° Géosote | 0 ^{sr} .50 |
| Oléo-saccharure de menthe | 10 grammes. |
| Mucilage de gomme | 90 — |

Par cuillerées à café de 2 en 2 heures.

Gingembre. — Carminatif et stimulant, se prescrit en *poudre* (5 centigrammes par année d'âge), en *infusion* (1 pour 100), en *teinture* (1 à 2 grammes), en *sirop* (20 grammes). Poudre carminative :

| | |
|----------------------|-----------------|
| Gingembre | } ãã 2 grammes. |
| Cannelle | |
| Anis | |
| Cascarille | |

Faire des paquets de 25 centigrammes, un avant chaque repas dans la dyspepsie.

Glycérine. — Bon véhicule du phénol (glycérine phéniquée à 5 pour 100). A l'intérieur la glycérine peut se donner à la dose de 10, 20, 50 grammes par jour. En lavement on donne, soit la glycérine pure (4 à 5 grammes), soit la glycérine diluée dans 100 ou 200 grammes de véhicule (15 à 20 grammes). On fait aussi des suppositoires laxatifs avec glycérine solidifiée (ovules, balles rectales) ou avec glycérine pure. Beaucoup de collutoires ont la glycérine pour excipient. Voici un bon sirop de dentition (Debout) :

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Glycérine neutre | 50 grammes. |
| Chloroforme | } ãã 0 ^{sr} .50 |
| Teinture de safran | |

Pommade d'Helmerich modifiée :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Glycérine. | 200 grammes. |
| Soufre. | 100 — |
| Gomme adragante. | 2 — |
| Jaune d'œuf. | n° 2 |
| Essences aromatiques. | q. s. |

Glycérolé d'amidon très employé comme topique (amidon 10 grammes, glycérine 150).

Glycogène. — Prescrit dans le diabète et les cachexies, en capsules de 20 centigrammes (2 à 5 par jour).

Glycyrrhizine (Voyez *Régliste*).

Goménol. — Capsules de 10 centigrammes (1 par année d'âge). *Huile au goménol* (1 pour 5) en injections sous-cutanées (1 à 5 centimètres cubes).

Gomme. — Gomme arabique en *tisane* (5 pour 100), en pastilles ou sirop (julep gommeux).

Gomme-gutte. — Purgatif (5, 10, 15 centigrammes par jour).

Goudron. — Balsamique (eau, sirop, etc.); pommade au goudron (1/10) dans le psoriasis, l'herpès circiné, les séborrhéides.

Gouttes amères de Baumé (Voyez *Fève de Saint-Ignace*).

Grenadier. — L'écorce est ténifuge.

| | |
|---|-------------|
| Écorce fraîche de racines de grenadier. | 50 grammes. |
| Eau. | 500 — |

Réduire à 500 grammes par décoction, ajouter 50 grammes de sirop et faire prendre à jeun, en trois fois, à une heure d'intervalle. Après la dernière prise, donner 15 à 20 grammes d'huile de ricin.

Pelletiérine, retirée par Tanret de l'écorce de grenadier; on prescrit 5, 10, 15 centigrammes, suivant l'âge, de *tannate de pelletiérine* suivie d'huile de ricin.

Grindelia robusta. — *Extrait fluide* (25 à 50 centigrammes de 2 en 2 heures). *Teinture (idem)*.

Guarana. — Semences pulvérisées, formant des masses rougeâtres qui contiennent 5 pour 100 de caféine. Saint-Philippe s'en est servi dans l'entérocolite. *Macération* pendant 24 heures de 1/2, 1 gramme, 2 grammes (suivant l'âge) dans 60 ou 100 grammes d'eau bouillie : prendre par cuillerées à café ou à soupe de 2 en 2 heures.

Guimauve. — *Infusion* de fleurs (1 pour 100); *infusion* de racines (2 pour 100); *décoction* de racines (5 pour 100), etc.

H

Hamamelis. — *Extrait fluide* (X gouttes toutes les 2 heures). *Teinture (idem)*. Médicament hémostatique.

Hamaméline (granules de 2 centigrammes, 5 à 4 par jour).

Hédonal. — Hypnotique (10 à 15 centigrammes par année d'âge). A été prescrit dans la chorée par Martinez Vargas.

Hélénine (Voyez *Aunée*).

Hélianthus annuus. — *Teinture* à 1/5 : X, XV, XX gouttes 5 ou 4 fois par jour dans le paludisme (Moncorvo).

Hémoglobine. — On fait un *sirop* d'hémoglobine (20 à 50 grammes). On prescrit aussi en *poudre*.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Hémoglobine. | 0 ^{gr} ,05 |
| Phosphate de chaux. | 0 ^{gr} ,10 |

Pour un paquet ; à prendre avant le repas dans une cuillerée de lait.

Hermophényl. — Contient 40 pour 100 de mercure ; injections intra-musculaires avec 1 cc. 2 ou 3 fois par semaine de :

| | |
|------------------------|---------------------|
| Hermophényl. | 0 ^{gr} ,10 |
| Eau distillée. | 10 grammes. |

Héroïne. — Le chlorhydrate d'héroïne est soluble (remplace la morphine) : 1 milligramme par jour et par année d'âge.

| | |
|--|---------------------|
| 1 ^o Chlorhydrate d'héroïne. | 0 ^{gr} ,10 |
| Eau distillée d'amandes amères. | 20 grammes. |

V à X gouttes 5 fois par jour dans l'eau sucrée.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 2 ^o Héroïne. | 5 milligrammes. |
| Sucre en poudre. | 50 centigrammes. |

Pour un paquet (2 par jour).

| | |
|--|---------------------|
| 3 ^o Chlorhydrate d'héroïne. | 0 ^{gr} ,10 |
| Sirop. | 100 grammes. |

Une cuillerée à café, le soir en se couchant.

Hétol. — L'hétol (cinnamate de sodium) s'emploie en injections intra-musculaires (1 pour 100) ; on fait d'abord 1/10 de centimètre cube et on arrive graduellement à 1 cc. Ce médicament serait bon dans la tuberculose.

Hopogan. (Voyez *Magnésie*.)

Houblon. — *Infusion* (2 à 5 pour 100); *teinture* (1 à 2 grammes). Tonique amer.

Houx. — *Décoction* de feuilles (5 à 4 pour 100), *extrait aqueux* (1 à 2 grammes), sont sudorifiques et fébrifuges. *Petit-houx* (rhizomes et racines diurétiques).

Huile de cade. — Comme vermifuge (X à XX gouttes dans l'eau sucrée). Topiquement, dans le psoriasis, glycérolé cadique ou cérat cadique, à 1/2. Contre l'eczéma séborrhéique :

| | |
|-----------------------------|------------|
| Huile de cade. | 5 grammes. |
| Glycérolé d'amidon. | 50 — |

Huile de Chaulmoogra. — Contre la lèpre, on donne II à III gouttes et on monte à X, XX, XL, LX et plus.

Huile de croton. — Comme purgatif, *une goutte* dans un looch (par cuillerées à café d'heure en heure). En frictions (V à VI gouttes) pour faire révulsion.

Huile de foie de morue. — Se donne par cuillerées à jeun (1, 2, 5), pure ou aromatisée :

| | |
|---|---------------------|
| Huile de morue. | 100 grammes. |
| Saccharine. | 0 ^{gr} ,40 |
| Ether acétique. | 2 grammes. |
| Essence de menthe, cannelle, etc. | V gouttes. |

On peut ajouter la créosote :

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Huile de foie de morue. | 100 grammes. |
| Créosote de hêtre. | 1 gramme. |

Le Dr Ruyssen donne l'huile de morue après le repas (1 heure après).

On a fait des émulsions plus ou moins agréables, mais pauvres en huile.

Huile d'olives. — Donnée dans la lithiase biliaire à doses fortes (100 à 200 grammes) par le Dr Touàtre. Peut se donner en lavements portés très haut contre la constipation (200 à 500 grammes).

Lipanine, composée d'huile d'olives et d'acide oléique (5 à 6 pour 100) : 1 à 5 cuillerées à café.

Huile de ricin. — Comme purgatif, 2 grammes par année d'âge. Peut s'émulsionner avec un jaune d'œuf, auquel on ajoute 80 grammes d'eau tiède sucrée et 20 grammes d'eau de fleurs d'oranger. On peut aussi battre avec bouillon, café,