

Pommade d'Helmerich modifiée :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Glycérine. | 200 grammes. |
| Soufre. | 100 — |
| Gomme adragante. | 2 — |
| Jaune d'œuf. | n° 2 |
| Essences aromatiques. | q. s. |

Glycérolé d'amidon très employé comme topique (amidon 10 grammes, glycérine 150).

Glycogène. — Prescrit dans le diabète et les cachexies, en capsules de 20 centigrammes (2 à 5 par jour).

Glycyrrhizine (Voyez *Régliste*).

Goménol. — Capsules de 10 centigrammes (1 par année d'âge). *Huile au goménol* (1 pour 5) en injections sous-cutanées (1 à 5 centimètres cubes).

Gomme. — Gomme arabique en *tisane* (5 pour 100), en pastilles ou sirop (julep gommeux).

Gomme-gutte. — Purgatif (5, 10, 15 centigrammes par jour).

Goudron. — Balsamique (eau, sirop, etc.); pommade au goudron (1/10) dans le psoriasis, l'herpès circiné, les séborrhéides.

Gouttes amères de Baumé (Voyez *Fève de Saint-Ignace*).

Grenadier. — L'écorce est ténifuge.

| | |
|---|-------------|
| Écorce fraîche de racines de grenadier. | 50 grammes. |
| Eau. | 500 — |

Réduire à 500 grammes par décoction, ajouter 50 grammes de sirop et faire prendre à jeun, en trois fois, à une heure d'intervalle. Après la dernière prise, donner 15 à 20 grammes d'huile de ricin.

Pelletiérine, retirée par Tanret de l'écorce de grenadier; on prescrit 5, 10, 15 centigrammes, suivant l'âge, de *tannate de pelletiérine* suivie d'huile de ricin.

Grindelia robusta. — *Extrait fluide* (25 à 50 centigrammes de 2 en 2 heures). *Teinture (idem)*.

Guarana. — Semences pulvérisées, formant des masses rougeâtres qui contiennent 5 pour 100 de caféine. Saint-Philippe s'en est servi dans l'entérocolite. *Macération* pendant 24 heures de 1/2, 1 gramme, 2 grammes (suivant l'âge) dans 60 ou 100 grammes d'eau bouillie : prendre par cuillerées à café ou à soupe de 2 en 2 heures.

Guimauve. — *Infusion* de fleurs (1 pour 100); *infusion* de racines (2 pour 100); *décoction* de racines (5 pour 100), etc.

H

Hamamelis. — *Extrait fluide* (X gouttes toutes les 2 heures). *Teinture (idem)*. Médicament hémostatique.

Hamaméline (granules de 2 centigrammes, 5 à 4 par jour).

Hédonal. — Hypnotique (10 à 15 centigrammes par année d'âge). A été prescrit dans la chorée par Martinez Vargas.

Hélénine (Voyez *Aunée*).

Hélianthus annuus. — *Teinture* à 1/5 : X, XV, XX gouttes 5 ou 4 fois par jour dans le paludisme (Moncorvo).

Hémoglobine. — On fait un *sirop* d'hémoglobine (20 à 50 grammes). On prescrit aussi en *poudre*.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Hémoglobine. | 0 ^{gr} ,05 |
| Phosphate de chaux. | 0 ^{gr} ,10 |

Pour un paquet ; à prendre avant le repas dans une cuillerée de lait.

Hermophényl. — Contient 40 pour 100 de mercure ; injections intra-musculaires avec 1 cc. 2 ou 3 fois par semaine de :

| | |
|------------------------|---------------------|
| Hermophényl. | 0 ^{gr} ,10 |
| Eau distillée. | 10 grammes. |

Héroïne. — Le chlorhydrate d'héroïne est soluble (remplace la morphine) : 1 milligramme par jour et par année d'âge.

| | |
|--|---------------------|
| 1 ^o Chlorhydrate d'héroïne. | 0 ^{gr} ,10 |
| Eau distillée d'amandes amères. | 20 grammes. |

V à X gouttes 5 fois par jour dans l'eau sucrée.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 2 ^o Héroïne. | 5 milligrammes. |
| Sucre en poudre. | 50 centigrammes. |

Pour un paquet (2 par jour).

| | |
|--|---------------------|
| 3 ^o Chlorhydrate d'héroïne. | 0 ^{gr} ,10 |
| Sirop. | 100 grammes. |

Une cuillerée à café, le soir en se couchant.

Hétol. — L'hétol (cinnamate de sodium) s'emploie en injections intra-musculaires (1 pour 100) ; on fait d'abord 1/10 de centimètre cube et on arrive graduellement à 1 cc. Ce médicament serait bon dans la tuberculose.

Hopogan. (Voyez *Magnésie*.)

Houblon. — *Infusion* (2 à 5 pour 100); *teinture* (1 à 2 grammes). Tonique amer.

Houx. — *Décoction* de feuilles (5 à 4 pour 100), *extrait aqueux* (1 à 2 grammes), sont sudorifiques et fébrifuges. *Petit-houx* (rhizomes et racines diurétiques).

Huile de cade. — Comme vermifuge (X à XX gouttes dans l'eau sucrée). Topiquement, dans le psoriasis, glycérolé cadique ou cérat cadique, à 1/2. Contre l'eczéma séborrhéique :

| | |
|-----------------------------|------------|
| Huile de cade. | 5 grammes. |
| Glycérolé d'amidon. | 50 — |

Huile de Chaulmoogra. — Contre la lèpre, on donne II à III gouttes et on monte à X, XX, XL, LX et plus.

Huile de croton. — Comme purgatif, *une goutte* dans un looch (par cuillerées à café d'heure en heure). En frictions (V à VI gouttes) pour faire révulsion.

Huile de foie de morue. — Se donne par cuillerées à jeun (1, 2, 5), pure ou aromatisée :

| | |
|---|---------------------|
| Huile de morue. | 100 grammes. |
| Saccharine. | 0 ^{gr} ,40 |
| Ether acétique. | 2 grammes. |
| Essence de menthe, cannelle, etc. | V gouttes. |

On peut ajouter la créosote :

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Huile de foie de morue. | 100 grammes. |
| Créosote de hêtre. | 1 gramme. |

Le Dr Ruyssen donne l'huile de morue après le repas (1 heure après).

On a fait des émulsions plus ou moins agréables, mais pauvres en huile.

Huile d'olives. — Donnée dans la lithiase biliaire à doses fortes (100 à 200 grammes) par le Dr Touàtre. Peut se donner en lavements portés très haut contre la constipation (200 à 500 grammes).

Lipanine, composée d'huile d'olives et d'acide oléique (5 à 6 pour 100) : 1 à 5 cuillerées à café.

Huile de ricin. — Comme purgatif, 2 grammes par année d'âge. Peut s'émulsionner avec un jaune d'œuf, auquel on ajoute 80 grammes d'eau tiède sucrée et 20 grammes d'eau de fleurs d'oranger. On peut aussi battre avec bouillon, café,

lait, etc. On la donne encore entre deux couches de jus d'orange, ou dans un verre frotté de jus de citron.

En lavement on peut prescrire :

| | |
|---|-------------|
| Huile de ricin | 20 grammes. |
| Décoction de guimauve ou graines de lin | 200 — |

Hydrastis canadensis. — Se prescrit contre les métrorragies : *extrait fluide* ou *teinture* (XX gouttes 3 à 4 fois par jour). *Hydrastine* (1 centigramme par année d'âge). *Hydrastinine* (1/2 à 1 centigramme par jour); on fait des granules de 1 milligramme. En solution on a injecté :

| | |
|--|---------------------|
| Chlorhydrate d'hydrastinine | 0 ^{er} ,10 |
| Eau distillée quantité suffisante pour | 10 cc. |

Injecter 1/2 à 1 seringue de Pravaz.

Hydrate d'amylène. — Hypnotique, en *potion* (1 à 2 grammes), en *lavement* (émulsionner 1 à 2 grammes avec gomme).

Hydrocotyle. — *Poudre* de feuilles et racines (5 à 10 centigrammes par année d'âge), *extrait hydro-alcoolique* (1 centigramme par année d'âge), *infusion* de racines (1 pour 100); *sirop* fait avec l'extrait (20 grammes); *alcoolature* (V à X gouttes, trois fois par jour).

Hyoscine et Hyoscyamine. (Voyez *Jusquame*.)

Hypericum perforatum. — *Infusion* (1 à 2 pour 100). *Essence* (1 goutte par année d'âge).

Hypnal. (Voyez *Chloral-antipyrine*.)

Hypnone. — Hypnotique (10 à 20 centigrammes) à dissoudre dans l'huile d'amandes :

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Hypnone | 2 grammes. |
| Eau de laurier-cerise | 5 — |
| Alcool à 60° | 40 — |
| Sirop de fleurs d'oranger | 255 — |

1 à 3 cuillerées à café, le soir.

Hysope. — *Infusion* (5 grammes par litre); peut s'associer au lierre terrestre. Tisane contre la bronchite.

I

Ichtyol. — Liquide bitumineux provenant de poissons fossiles, contenant 10 pour 100 de soufre, neutralisé par la soude ou l'ammoniaque. Bon topique dans l'érysipèle, les séborrhéides, etc.

Pommade :

| | |
|------------------------------|-------------|
| Axonge ou vaseline | 45 grammes. |
| Ichtyol | 5 — |

Solution :

| | |
|-------------------|------------|
| Ichtyol | 5 grammes. |
| Eau | 100 — |

On peut badigeonner avec des collodions à l'ichtyol :

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1° Ichtyol | } $\bar{a}\bar{a}$ 5 grammes. |
| Éther | |
| Collodion | |
| 2° Ichtyol | } $\bar{a}\bar{a}$ 4 gramme. |
| Gutta-percha | |
| Chloroforme | |

A l'intérieur, Moncorvo a donné l'ichtyol (1/2, 1, 2 grammes par jour) dans la chylurie. On peut donner à la même dose l'*ichtalbine* (albuminate d'ichtyol).

Iode. — La *teinture* à 1/12 se prescrit en badigeonnages ou à l'intérieur par gouttes (1 à II par année d'âge). Duguet a injecté la teinture d'iode pure dans le goitre. Peut se mitiger par la glycérine (collutoire à 1/4 ou 1/5), par l'eau :

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Teinture d'iode | } $\bar{a}\bar{a}$ 50 grammes. |
| Eau | |
| Iodure de potassium | |

L'iode métalloïde peut se donner en collutoire dans les angines :

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Iode | 0 ^{er} ,50 |
| Iodure de potassium | 1 gramme. |
| Glycérine | 50 grammes. |

On le prescrit aussi en bain :

| | |
|-------------------------------|------------|
| Iode | 5 grammes. |
| Iodure de potassium | 40 — |
| Eau | 250 — |

On prépare un vin iodé, un lait iodé, une huile de morue iodée (1 pour 1000). Le *sirop de raifort iodé* contient 1 gramme d'iode pour 1000; le *sirop iodo-lannique* en contient le double. Les combinaisons de l'iode, *iodoforme*, *iodure de potassium* et de *sodium*, *iodure de fer*, *iodure de plomb*, *iodure de mercure*, sont très usitées. Doses de l'iodure de potassium (5 à 10 centigrammes par année d'âge).

Solution antiserofuleuse, antiasthmatique, etc. :

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Iodure de potassium | 1 gramme. |
| Bromure de potassium | 2 grammes. |
| Chlorure de sodium | 5 — |
| Eau distillée | 100 grammes. |

Une cuillerée à café deux fois par jour.

Pommade résolutive :

| | |
|-------------------------------|------------|
| Iodure de potassium | 4 grammes. |
| Extrait de ciguë | 2 — |
| Axonge benzoïnée | 50 — |

Onctions matin et soir sur les parties malades.

Iodipine. — Composé d'iode et d'huile de sésame (10 et 25 pour 100), remplace les iodures dans le traitement de la syphilis, de l'asthme, de l'actinomycose. Se donne par la bouche (1 à 3 cuillerées à café de la solution à 10 pour 100). En injections profondes, une seringue de Pravaz de la solution à 25 pour 100.

Iodoforme. — Pour l'usage externe, dans la méningite, onctions avec la pommade :

| | |
|---------------------|-------------|
| Iodoforme | 10 grammes. |
| Vaseline | 50 — |

Pour saupoudrer les plaies infectées :

| | |
|---------------------|--------------------|
| Iodoforme | } $\bar{a}\bar{a}$ |
| Charbon | |
| Quinquina | |

A l'intérieur, on a donné 5, 10 centigrammes d'iodoforme. En solution étherée à 5 pour 100, on l'injecte dans les abcès froids. Lannelongue injecte 50 à 55 grammes de :

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Iodoforme | } $\bar{a}\bar{a}$ 10 grammes. |
| Éther | |
| Créosote | |
| Huile d'amandes stérilisée | |

On met un intervalle de 15 jours entre les injections.

Iodoformogène (10 pour 100 d'iodoforme), peut servir à panser les plaies.

Iodol. — S'emploie en pommade à 1/10 contre les blépharites, conjonctivites et kératites.

Ipéca. — L'écorce de la racine contient 1/10 d'*émétine*. Dose (10 centigrammes

de poudre par année d'âge). *Sirop d'ipéca* (1 centigramme d'extrait par gramme) se donne seul aux tout petits enfants, associé à la poudre dans la 2^e enfance :

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Sirop d'ipéca | 50 grammes. |
| Poudre d'ipéca | 0 ^{er} ,50 |

A prendre par cuillerées à café de 5 en 5 minutes jusqu'à effet (enfant de 5 ans). On peut associer le tartre tibié (1/2 centigramme par année d'âge).

Si l'on veut associer l'action purgative, on peut ajouter le calomel, la scammonée à l'ipéca (*éméto-cathartique*) :

| | |
|-------------------------------|--|
| Poudre d'ipéca | 0 ^{er} ,20 |
| Calomel à la vapeur | } $\bar{a}\bar{a}$ 0 ^{er} ,10 |
| Scammonée | |

Pour un paquet, n^o 5, à prendre à 10 minutes d'intervalle, dans une cuillerée d'eau sucrée (enfant de 6 ans).

Dans la dysenterie, on donne l'ipéca à la *méthode brésilienne*, en infusion :

| | |
|---|------------|
| Ipéca concassé | 2 grammes. |
| Eau bouillante | 200 — |
| Passez et ajoutez sirop de polygala | 20 — |

La *poudre de Dover* (calmante et sudorifique), contient 1/10 d'ipéca et 1/10 d'opium (5 centigrammes par année d'âge).

L'ipéca est indiqué dans les bronchites, catarrhes gastriques, coqueluches, quand les enfants ne sont pas trop déprimés.

J

Jaborandi. — *Infusion* de feuilles (2 pour 100); il se produit de la transpiration et salivation. *Teinture* de jaborandi en frictions pour la repousse des cheveux.

Pilocarpine en injections sous-cutanées :

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Chlorhydrate de pilocarpine | 0 ^{er} ,20 |
| Eau stérilisée | 10 grammes. |

Injecter 1/4 ou 1/2 seringue de Pravaz.

En collyre à 1 pour 100, rétrécit la pupille.

Jalap. — Purgatif énergique (5 centigrammes par année d'âge), entre dans la composition de l'eau-de-vie allemande (1 gramme par année d'âge).

Jambul. — *Semences pulvérisées* (5 centigrammes 5 fois par jour) dans le diabète.

Jéquirity. — *Macération de graines* à 1 pour 100, employée en collyre dans la conjonctivite grave. La macération à 2, 5, 5 pour 100 serait efficace contre l'ozène (Cl. Uriarte).

Jusquiame. — Propriétés analogues à celles de la belladone et du datura. Poudre de feuilles (2 centigrammes par année d'âge). *Infusion* (2 pour 500). *Extrait* aqueux ou alcoolique de semences (1 centigramme par année d'âge). *Teinture* (11 gouttes par année). *Sirop* (comme celui de belladone). *Baume tranquille* (à base de jusquiame et autres solanées); de même l'*onguent populéum*.

Hyoscyamine, alcaloïde de la jusquiame, peut remplacer l'atropine. De même l'*hyoscine*.

K

Kalagua. — *Extrait* en pilules de 10 centigrammes (5 à 6 par jour), ou en granulé (50 centigrammes par cuillerée à café).

Kamala. — *Poudre* (50 centigrammes à 1 gramme par année d'âge) contre les ténias. *Teinture* (2 à 4 grammes en potion).

Kola. — *Teinture* ou *extrait fluide* (X gouttes par année d'âge).

Kousséine. — Principe actif du kouso : granules de 1 centigramme, 20 à 40 le matin à jeun. Au bout de 2 heures, 15 à 20 grammes d'huile de ricin.

L

Lactose. — Le sucre de lait est diurétique, on peut en ajouter au lait 50 grammes par litre ou faire une tisane avec :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Sucre de lait | } $\bar{a}\bar{a}$ 50 grammes. |
| Eau distillée de menthe | |
| Eau | |

Huchard associe la lactose à la magnésie :

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Lactose | 40 grammes. |
| Magnésie calcinée | 60 — |

Une cuillerée à café dans un peu d'eau.

Laitue. — *Eau distillée* de laitue (véhicule pour les potions calmantes) :

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Bromure de potassium | 1 gramme. |
| Hydrate de chloral | 0 ^{er} ,25 |
| Sirop de fleurs d'oranger | 20 grammes. |
| Hydrolat de laitue | 80 — |

Lactucarium. — Suc retiré par incision des tiges de laitue; associé à l'opium, forme le *sirop d'Aubergier* :

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Sirop de lactucarium | } $\bar{a}\bar{a}$ 50 grammes. |
| Sirop de pavot pourpre | |

Une cuillerée 2 à 3 fois par jour.

Thridace ou extrait de laitue, servant à faire un sirop (40 centigrammes pour 20 grammes).

Lanoline. — Sert d'excipient aux pommades :

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Lanoline | } $\bar{a}\bar{a}$ 20 grammes. |
| Vaseline | |
| Oxyde de zinc | |

Laurier-cerise. — *Eau distillée* (1/2 à 1 gramme par année d'âge). *Sirop* (10 à 20 grammes).

Lavande. — Stimulante, sert surtout pour l'usage externe; frictions avec *alcoolat de lavande*, etc.

Lavements. — *Lavement évacuant* (50, 100, 200, 500 grammes suivant l'âge) d'eau bouillie chaude ou froide, de décoction de guimauve, d'infusion de camomille et d'huile d'olive. (On peut ajouter 10, 20, 40 grammes de *glycérine*), autant et plus de *miel de mercuriale*. Lavement purgatif avec :

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Follicules de séné | 5 à 10 grammes. |
| Sulfate de soude | 10 — |
| Eau bouillante | 200 — |

Petit lavement de glycérine (une cuillerée à café). Il y a intérêt souvent à porter le lavement haut dans l'intestin avec une sonde. Grands lavages avec eau bouillie (1/2, 1 litre) additionnée de borate de soude (2 à 4 grammes) ou de bicarbonate de soude, ou d'eau oxygénée dans l'entéro-colite.

Lavements astringents :

| | |
|--|------------------------|
| 1 ^o Décocté de guimauve | 100 grammes. |
| Extrait de ratanhia | } $\bar{a}\bar{a}$ 2 — |
| S.-N. de bismuth | |
| 2 ^o Eau tiède | 100 grammes. |
| Amidon délayé dans eau bouillante | 10 — |
| Laudanum | 1 à 11 gouttes. |

Lavements calmants :

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1° Musc. | 0 ^{gr} ,25 |
| Jaune d'œuf. | n° 1. |
| Laudanum | 1 goutte. |
| Eau tiède. | 60 grammes. |
| 2° Hydrate de chloral. | 0 ^{gr} ,50 |
| Jaune d'œuf. | n° 1. |
| Eau tiède. | 50 grammes. |
| 3° Chloral. | 0 ^{gr} ,25 |
| Lait tiède. | 50 grammes. |

Lavements nutritifs :

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1° Peptone sèche. | 5 grammes. |
| Jaune d'œuf. | n° 1. |
| Bicarbonate de soude. | 0 ^{gr} ,50 |
| Lait ou bouillon. | 60 grammes. |
| 2° Peptone liquide. | 20 grammes. |
| Jaune d'œuf. | n° 1. |
| Sel marin. | une pincée. |
| Lait tiède. | 60 grammes. |

Lavements stimulants : au lieu de sérum artificiel en injections sous-cutanées, on peut donner des lavements d'eau salée à 5 pour 1000 (20, 40, 60, 100 grammes suivant l'âge).

Lécithine. (Voy. *Ovolécithine*.)

Levure de bière. — Prescrite contre les pyodermites, les intoxications intestinales, les diarrhées, etc. Levure fraîche (2 à 5 cuillerées à café par jour délayées dans l'eau sucrée, la bière, etc.). Levure sèche ou *levurine* (même dose). La levure de bière a été donnée en lavement par Thiercelin.

Lichen d'Islande. — *Décoction* (10 grammes par litre); *gelée, pâte, sirop* de lichen, utilisés dans les bronchites.

Lierre terrestre. — *Infusion* de feuilles (1 à 2 pour 100).

Limonades. — Boissons acides convenables pour les fébricitants, dyspeptiques, etc. *Limonade au citron* ou à l'*orange, limonade tartrique, lactique, citrique, vineuse, sulfurique*, etc., comprennent environ 100 grammes de sirop par litre.

Lin. — *Infusion* de graines (10 grammes par litre), diurétique et adoucissante. *Graines de lin* à l'intérieur (une cuillerée à café) comme laxatif. *Lavement* par décoction (2 pour 100).

Liniment de Rosen. — Employé en frictions, très stimulant :

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Alcoolat de genièvre. | 90 grammes. |
| Essence de girofle | } aa 5 — |
| Huile de muscade. | |

Liqueur de Baumé. (Voy. *Fève de Saint-Ignace*.)

Lithine. — *Carbonate de lithine* (5 à 10 centigrammes deux fois par jour). *Benzolate de lithine* (*idem*) plus soluble.

Lobelia inflata. — Plante antispasmodique. *Teinture* à 1/5 (1 à 2 grammes par jour). *Lobéline* (1 granule de 1 milligramme par 2 années d'âge).

Lupulin. — Employé contre les érections trop fréquentes ou douloureuses. *Teinture* (1 gramme dans l'eau sucrée le soir). *Poudre* mêlée au sucre (1 gramme).

Lycétol. — Dissolvant de l'acide urique (20 centigrammes 3 fois par jour dans un verre d'eau sucrée).

Lycopode. — Excellent dessiccatif à employer chez les enfants (érythèmes, ecthyma, eczéma suintant) :

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Poudre de lycopode. | } aa 20 grammes. |
| Poudre de talc. | |
| Poudre d'amidon. | |
| Acide borique | 5 — |

Lysol. — Solutions désinfectantes à 1 pour 100.

M

Magnésie. — *Magnésie calcinée*, laxative (50 centigrammes à 1 gramme dans une cuillerée d'eau sucrée). Comme anti-acide et laxatif, je donne :

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Magnésie calcinée. | 0 ^{gr} ,25 |
| Bicarbonate de soude. | 0 ^{gr} ,20 |
| Poudre de noix vomique | 1 centigramme. |

Pour un paquet, à prendre matin et soir dans une cuillerée d'eau sucrée avant le repas.

Carbonate de magnésie, agit comme absorbant et anti-acide; analogue à la craie préparée comme action.

Bicarbonate de magnésie (fluid magnesia), liquide laxatif (1 à 2 cuillerées à café additionnées de sucre).

Sulfate de magnésie, purgatif (1 gramme par année d'âge), peut se granuler (sedlitz granulé).

Citrate de magnésie (2 grammes par année d'âge), sert à faire la limonade purgative avec eau (décupler le véhicule).

Peroxyde de magnésium dans les affections gastro-intestinales (10 à 20 centigrammes avant chaque repas); en poudre, comprimés, granulés, capsules kératinisées (Hopogan).

Malacine. — Sorte de salicylate de phénacétine, antithermique, anthelminthique, ténifuge, recommandée dans le rhumatisme (10 à 20 centigrammes 3 ou 4 fois par jour en suspension dans une cuillerée de lait ou sirop).

Malt. — Orge germée servant à préparer des bières ou extraits de malt, dont on donne un verre à Madère ou à Bordeaux par repas.

Manganèse. — Mêmes indications et mêmes doses que les ferrugineux.

Manne. — Purgatif sucré retiré du *Fraxinus ornus rotundifolia*. Manne en larmes (été), en sorte (automne), grasse (hiver). La *manne en larmes*, la meilleure, vient de Sicile; elle est presque entièrement composée de *mannite*. Il y a du sucre (1/10) et une matière gommeuse. On la prescrit dans le lait tiède (10 grammes par année d'âge). On fait un *sirop de manne*, des *tablettes*, une *potion purgative*, une *marmelade* dite de *Tronchin*.

Marchantie. — Plante diurétique qui entre dans le sirop de chicorée. *Décoction* (4 à 6 pour 100); *macération* dans le vin blanc (5 à 10 pour 100).

Marrube. — Plante tonique, stimulante et antispasmodique, recommandée dans la bronchite, l'asthme, la chlorose, les fièvres. *Infusion* ou *décoction* de feuilles et sommités (2 à 5 pour 100), *extrait* alcoolique (1 à 2 grammes), *poudre* (2 à 4 grammes), *sucre* et *conserve* (25 à 50 grammes).

Mastic. — Employé par Debout dans l'incontinence d'urine (gomme résine du *Pistacia lentiscus*) :

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Poudre de mastic | 52 grammes. |
| Sirop de sucre ou miel. | q. s. |

Électuaire à prendre en 4 ou 8 jours, suivant l'âge.

Matricaire. — Plante voisine de la camomille; *infusion* (1 p. 100), *poudre* (1 à

2 grammes), *eau distillée* (20 à 50 grammes). Peut se prescrire dans la chorée, l'hystérie, les coliques.

Mauve. — Plante béchique; *infusion* à 1 pour 100.

Mélilot. — *Infusion* ou *décoction* (2 à 3 pour 100).

Mélisse. — *Infusion* de feuilles et sommités (1 à 2 pour 100). *Alcoolat* (2 à 5 grammes dans un peu d'eau sucrée). *Eau distillée* (50 à 60 grammes).

Mellites. — Sirops à base de miel. *Mellite* simple un peu laxative. *Mellite de rose* ou *miel rosat* (collutoires, gargarismes). *Mellite* ou *miel de mercuriale* (40 à 50 grammes en lavement).

Ményanthe. — Amer et apéritif, se prescrit en *poudre*, *extrait* (20 à 50 centigrammes), *infusion* (1 à 2 pour 100).

Menthe. — *Infusion* de feuilles (1 pour 100). *Eau distillée* (20 à 50 grammes). *Alcoolat*, *sirop*, *essence* de menthe. Cette dernière se prescrit par gouttes (1 à X).

Menthol. — Camphre de l'essence de menthe, très irritant pour les muqueuses. Prescrit avec huile ou vaseline, à 1/100, 1/200, 1/500. On peut instiller dans les narines V à VI gouttes de :

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Huile d'amandes douces. | 10 grammes. |
| Menthol. | 0 ^{er} ,10 |

On se sert aussi de pommade :

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Vaseline blanche. | 20 grammes. |
| Menthol. | 0 ^{er} ,20 |

Contre les piqûres d'insectes, on peut toucher au pinceau avec :

| | |
|------------------|---------------------|
| Menthol. | 0 ^{er} ,50 |
| Éther. | 10 grammes. |

Dans le coryza, on peut priser la poudre suivante :

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Menthol. | 0 ^{er} ,25 |
| Poudre de benjoin. | } ãã 5 grammes. |
| Acide lorique. | |

Mercure. — Usage externe : *onguent napolitain* ou *mercuriel double* (2 grammes par jour en frictions). *Onguent gris* moins actif. *Emplâtre de Vigo* (près de 20 pour 100 de mercure). En injections sous-cutanées, on s'est servi de l'*huile grise* (mercure purifié avec huile de vaseline à 1/4) : 1/4 à 1/2 centimètre cube.

Calomel ou protochlorure de mercure, très usité chez les enfants (5 centigrammes par année d'âge). Se prescrit à dose unique ou par fractions (1, 2, 5 centigrammes toutes les heures ou les deux heures). Le calomel s'associe très bien à la santonine, à la scammonée, à l'ipéca et généralement à tous les médicaments d'origine végétale. Éviter l'association avec les minéraux et médicaments chimiques. Éviter les acides, les alcalins, les sels. Dans la syphilis, on a fait des injections profondes au calomel (5 centigrammes par gramme d'huile stérilisée). Pommade au calomel à 1/10. Insufflations de calomel pulvérisé contre les taies de la cornée.

Sublimé ou deutochlorure de mercure, forme la base de la *liqueur de Van Swieten*, employée à l'intérieur, à la dose de 1 à 2 grammes par année d'âge. En bain (baignoire en bois ou émaillée), on prescrit 1 gramme de sublimé par 10 litres d'eau (1 pour 10 000). Dans la diphtérie, on a employé les badigeonnages au sublimé avec glycérine (1 pour 50).

Protoiodure de mercure peut se prescrire aux enfants déjà grands (pilules de 5 centigrammes).

Le *biiodure* se trouve dans le sirop de Gibert (1 cuillerée à café par 2 années d'âge).

La solution aqueuse de biiodure sert aux injections sous-cutanées (méthode de Prokhorow) :

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Biiodure de mercure. | 0 ^{er} ,10 |
| Iodure de sodium. | 0 ^{er} ,20 |
| Eau distillée. | 10 grammes. |

Injecter 1/4, 1/2, 1 centimètre cube suivant l'âge (2 milligrammes par année d'âge).

Turbith minéral (sous-sulfate de mercure) est employé en pommade :

| | |
|-------------------|-------------|
| Turbith. | 1 gramme. |
| Vaseline. | 50 grammes. |

Le *précipité jaune* ou oxyde jaune de mercure est employé en pommade dans les blépharo-conjonctivites et kératites :

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Précipité jaune. | 0 ^{er} ,20 |
| Vaseline blanche. | 10 grammes. |

Les enfants supportent très bien toutes les préparations mercurielles et n'ont presque jamais de stomatite.

Mercuriale. — Le suc de cette euphorbiacée, mêlé à parties égales de miel, sert à donner des lavements laxatifs (20 à 60 grammes dans 150 ou 200 grammes d'eau tiède).

Méthacétine. — Antithermique soluble (20 à 50 centigrammes en potion).

Méthylal. — Hypnotique (1 à 2 grammes en potion).

Miel. (Voyez *Mellites*.)

Millefeuille. (Voyez *Achillée*.)

Millepertuis. (Voyez *Hypericum*.)

Mirabilis. — Plante purgative et vermifuge : 1^{er},50 de racine et 15 grammes de sucre à prendre dans une tasse de thé léger ou autre infusion. *Poudre* de racine (2 à 4 grammes dans un verre d'eau sucrée).

Moelle de veau. — La moelle osseuse de veau est employée dans les anémies et leucémies ou pseudo-leucémies ; une cuillerée triturée dans 5 cuillerées d'eau et mêlée au lait ou bouillon.

Molène. — Plante béchique donnée en infusion (1 pour 100).

Monésia. — Écorce astringente, peut remplacer le ratanhia. *Infusion* ou *décoction* (10 grammes pour 150) en lavements. On a fait un *sirop* avec l'*extrait* (20 à 50 grammes dans une potion). *Teinture* à 1/5 (1 à 5 grammes en potion). Peut se prescrire dans les diarrhées infantiles.

Mousse de Corse. — Algue marine vermicide. *Décoction* ou *infusion* dans eau ou lait (5 pour 100); poudre (2 à 4 grammes). Contre les vers, on peut prescrire :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Mousse de Corse. | } ãã 2 grammes. |
| Semen contra. | |
| Calomel. | 0 ^{er} ,20. |

Pour un paquet, à prendre le matin dans une cuillerée d'eau sucrée.

Moutarde. — Les graines de moutarde blanche sont laxatives; celles de moutarde noire sont irritantes et rubéfiantes (*sinapismes*, *cataplasmes sinapisés*, *bains sinapisés*).

Muguet. — Le convallaria maialis se prescrit en *sirop* (10 grammes d'*extrait aqueux* pour 500 grammes) : 2 à 5 cuillerées à dessert par jour. *Convallamarine* (2 à 4 centigrammes dans un sirop ou en granules de 1/2 centigramme).

Mûrier. — Le *sirop de mûres*, qui sert à édulcorer les gargarismes astringents (20 à 50 grammes), est fait avec les baies du mûrier noir.

Musc. — Antispasmodique prescrit en *teinture* au 1/10 (X gouttes par année d'âge), en *lavement* (25 à 50 centigrammes de musc avec jaune d'œuf et 100 grammes d'eau bouillie).

Muscade. — La noix de muscade est stimulante; elle entre dans la composition du liniment de Rosen, de l'élixir de Garus, de l'esprit de Sylvius, de l'eau de mélisse des Carmes, etc.