

## N

**Naphtaline.** — Antiseptique, peut se prescrire dans la diarrhée :

Naphtaline . . . . .	0 <sup>er</sup> ,05.
Sucre en poudre . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50.
Essence de bergamote . . . . .	1 goutte.

Pour un paquet; en prendre 5 par jour.

Filatoff l'associait au bismuth :

Naphtaline . . . . .	0 <sup>er</sup> ,10.
Sous-nitrate de bismuth . . . . .	0 <sup>er</sup> ,15.

Pour un paquet; en prendre un toutes les trois heures.

En potion, on peut formuler (Bongers) :

Naphtaline pure . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50.
Mucilage de gomme . . . . .	} aā 40 grammes.
Eau de camomille . . . . .	

Agiter avant de s'en servir; une cuillerée à café de 2 en 2 heures.

Contre les oxyures, Rossbach prescrit un lavement avec :

Naphtaline . . . . .	1 gramme.
Huile d'olives . . . . .	40 grammes.

**Naphtol.** — Pour l'antisepsie intestinale, on peut prescrire :

Naphtol A ou B . . . . .	0 <sup>er</sup> ,10.
Sucre en poudre . . . . .	1 gramme.

Pour un paquet, à prendre dans une cuillerée d'eau 4 à 5 fois par jour. Le *benzonalaphtol* est préférable. Contre la gale, on a employé la pommade au naphtol :

Naphtol β . . . . .	5 grammes.
Vaseline . . . . .	50 —

*Naphtol camphré* (100 de naphtol β pour 150 de camphre), s'emploie en badigeonnage dans les angines :

Naphtol camphré . . . . .	10 grammes.
Glycérine . . . . .	20 —

Le naphtol camphré a été injecté dans la cavité des abcès froids, dans le péri-toine, etc. Surveiller.

*Naphtol sulforiciné*, peut servir aux badigeonnages de la gorge :

Naphtol β . . . . .	5 grammes.
Sulforicinate de soude . . . . .	45 —

*Benzonalaphtol*, très usité pour l'antisepsie intestinale (10 centigrammes par année d'âge), peut s'associer au bismuth en cas de diarrhée, à la magnésie en cas de constipation, etc.

Benzonalaphtol . . . . .	} aā 0 <sup>er</sup> ,20.
Sous-nitrate de bismuth . . . . .	

Pour un paquet, à prendre dans une cuillerée d'eau sucrée 4 à 5 fois par jour.

Benzonalaphtol . . . . .	} aā 0 <sup>er</sup> ,25.
Magnésie calcinée . . . . .	

Pour un paquet, à prendre trois fois par jour avant le repas.

**Narcéine.** (Voyez *Opium*.)

**Nerprun.** — Baies purgatives, servent à faire un *sirup* associé à l'eau-de-vie allemande (1 gramme par année d'âge).

**Nickel.** — Le sulfate de nickel peut être prescrit dans les conjonctivites :

Sulfate de nickel . . . . .	0 <sup>er</sup> ,05.
Eau distillée . . . . .	10 grammes.

Instiller une goutte matin et soir. Contre la migraine, on a donné (Simpson) 2 à 5 pilules de 25 milligrammes par jour.

**Nirvanine.** — C'est un chlorhydrate de l'éther méthylique qui peut remplacer la cocaïne (sol. à 5 pour 100).

**Nitrite d'amyle.** — Inhalations employées parfois dans l'épilepsie, l'hystérie, la chorée, la tétanie, les convulsions, le tétanos, la rage, etc. (IV à V gouttes sur un mouchoir).

**Noix vomique.** — *Poudre* (un centigramme par année d'âge); ne pas prescrire plus de 10 jours consécutifs. Dans la dilatation de l'estomac avec constipation, je prescris souvent :

Poudre de noix vomique . . . . .	un centigramme.
Magnésie calcinée . . . . .	} aā 0 <sup>er</sup> ,20.
Bicarbonat de soude . . . . .	

Pour un paquet, n° 20, en prendre un avant chaque repas dans une cuillerée d'eau sucrée, de miel, de sirop ou de confiture; suspendre dix jours et recommencer.

*Teinture* de noix vomique à 1/5 (I à II gouttes par année d'âge), peut s'associer à d'autres amers :

Teinture de noix vomique . . . . .	} aā 2 grammes.
— gentiane . . . . .	
— colombo . . . . .	
— quinquina . . . . .	
— cascarille . . . . .	

En prendre X gouttes avant chaque repas dans une cuillerée d'eau sucrée.

La *liqueur de Bauné* (teinture à 1/2 de fève de St-Ignace) se prescrit par gouttes (une par année d'âge) dans les mêmes circonstances.

*Strychnine* (principe actif de la noix vomique), se donne par *granules* de 1 milligramme (sulfate de strychnine) ou en sirop (5 milligrammes par 20 grammes). On ne dépassera pas *un milligramme* par jour et par année d'âge.

On peut faire des injections sous-cutanées :

Sulfate de strychnine . . . . .	un centigramme.
Eau distillée . . . . .	10 grammes.

Faire 2 ou 5 injections par jour d'un centimètre cube.

Pour l'usage externe on a employé les frictions avec :

Strychnine . . . . .	1 gramme.
Axonge ou lanoline . . . . .	50 grammes.

**Nosophène.** — Peut remplacer l'iodoforme (renferme 60 pour 100 d'iode).

**Noyer.** — *Infusion* de feuilles (1 à 2 pour 100); pour l'usage externe (5 pour 100), on emploie la *décoction*. *Sirup* de suc de feuilles, *extrait* aqueux et *alcoolique*, etc. Bains de feuilles de noyer (500 grammes pour 50 à 40 litres) dans l'érythème des fesses.

## O

**Œuf.** — Comme aliment, un œuf par jour ou tous les deux jours à partir d'un an. — *Blanc d'œuf* (2 à 4 par litre), sert à faire l'eau albumineuse. Le *jaune d'œuf* sert à émulsionner les corps gras, résines et médicaments prescrits par voie rectale. Dans l'athrepsie, Muggia a injecté sous la peau 5 à 10 cc. de jaune d'œuf tous les 2 ou 3 jours. L'*ovoléctine* est aujourd'hui préférée pour cet usage (5 centigrammes par centimètre cube).

**Olive.** — L'huile d'olive sert de véhicule à la créosote, à la résorcine, etc. Elle est employée en lavement contre la constipation. Elle a été donnée par la bouche dans la lithiase biliaire.

**Opium.** — *Poudre* d'opium brut (un centigramme par année d'âge), dans les coliques, la diarrhée, etc.

Associée à l'ipéca, elle forme la *poudre de Dower* (1/10 de chaque). Cette poudre

se prescrit à la dose de 5 centigrammes par année d'âge dans l'asthme, la coqueluche, la toux coqueluchoïde, etc. Je formule ainsi :

Poudre de Dower . . . . .	0 <sup>rs</sup> ,05.
Sucre en poudre. . . . .	1 gramme.

Pour un paquet; à prendre dans une cuillerée d'eau toutes les deux heures (pour un enfant de 5 ans).

Le *laudanum* de Sydenham est un vin d'opium contenant 6 centigrammes d'extrait thébaïque par gramme (1 goutte par année d'âge).

*Elixir parégorique* (teinture d'opium camphrée), est dix fois moins fort en poids et 20 fois moins fort en volume (X gouttes par année d'âge).

*Sirop diacode* (1 centigramme d'extrait thébaïque pour 20 grammes), se prescrit à la dose de 2 grammes par année d'âge.

*Sirop thébaïque* (4 centigrammes d'extrait thébaïque pour 20 grammes), se donne à dose moindre.

*Sirop de codéine* (4 centigrammes pour 20 grammes), peut se donner comme le sirop diacode.

*Sirop de morphine* (un centigramme par 20 grammes) se prescrit à la dose de 1 gramme par année d'âge. Dans la diarrhée, Borde a été jusqu'à 1 gramme par mois d'âge.

*Sirop de narcéine* (coqueluche) contenant 2 centigrammes pour 20 grammes, peut se prescrire à la dose de 1 gramme par année d'âge.

Les *pâtes de lichen, pectorale, de réglisse*, contiennent environ 2 centigrammes d'extrait thébaïque pour 20 grammes.

Pour injections sous-cutanées, le *chlorhydrate de morphine* (solution à 1 pour 100) se prescrira à la dose de un milligramme par année d'âge. Dans l'appendicite, on peut dépasser cette dose; on peut aussi donner l'*extrait thébaïque* en pilules ou en potion (un centigramme par année d'âge), en fractionnant pour obtenir la tolérance.

**Or.** — Goubert a prescrit le *bromure d'or* dans l'épilepsie (granules de 1 milligramme, 2 à 5 par jour). Dans la diarrhée rebelle, Legrand a conseillé l'électuaire :

Or finement pulvérisé. . . . .	0 <sup>rs</sup> ,20.
Miel blanc . . . . .	125 grammes.

Une cuillerée à café le matin.

**Oranger.** — Infusion de feuilles sèches avec ou sans tilleul (5 grammes par litre). *Eau distillée de fleurs* (20 à 40 grammes); *sirop de fleurs* (20 à 30 grammes); *sirop d'écorce d'oranges amères* (15 à 20 grammes).

**Orexine.** — Le *tannate d'orexine* a été prescrit dans la dyspepsie (50 centigrammes de poudre deux fois par jour, 1/2 heure à 2 heures avant le repas, ne prendre que de l'eau jusqu'au repas).

**Orge.** — *Mondé* ou *perlé* sert à faire des *décoctions* (20 grammes par litre) pour boire ou se gargariser. Avec l'*orge germé* (malt) on fait une sorte de café tonique (50 grammes par litre).

**Origan.** — *Infusion* de sommités fleuries (1 pour 100) employée dans la bronchite et la dysménorrhée des chlorotiques.

**Orme.** — *Décoction* d'écorce d'orme pyramidal (10 pour 100) contre la scrofule et les dermatoses. *Extrait alcoolique, sirop* à base d'extrait (40 centigrammes pour 20 grammes).

**Orthoforme.** — *Poudre* employée contre les fissures et crevasses des mamelons, en insufflation ou prises dans le coryza.

On peut faire une pommade pour panser les plaies, fissures, brûlures, etc.

Vaseline . . . . .	50 grammes.
Orthoforme. . . . .	5 —

Danlos a ajouté l'orthoforme aux injections de calomel pour les rendre indolores :

Huile de vaseline . . . . .	1 cc.
Calomel . . . . .	0 <sup>rs</sup> ,05
Orthoforme. . . . .	0 <sup>rs</sup> ,08.

**Ouabaïne.** — Poison violent prescrit dans l'asthme et la coqueluche. On prend une solution mère (6 centigrammes d'ouabaïne pour 50 grammes d'eau distillée), et on formule :

Solution mère d'ouabaïne . . . . .	XVIII gouttes.
Sirop d'écorce d'oranges. . . . .	50 grammes.
Eau distillée . . . . .	150 —

Prendre 5 à 4 cuillerées à café par jour. Granules à 1/10 de milligramme (2 à 5 par jour).

**Ovo-lécithine.** — Injection de solution huileuse (5 centigrammes par 1 cc.). On fait des pilules à 5 et 10 centigrammes (2 par jour). Reconstituant, dynamogène.

**Oxycyanure de mercure.** — Pour l'usage externe, lavage des mains, trempage des instruments, etc., solution à 1 pour 1000.

**Oxygène.** — *Inhalations* d'oxygène dans tous les états asphyxiques (ballons avec entonnoir au bout du tube pour ne pas gêner l'enfant). *Eau oxygénée*, excellent antiseptique pour l'usage externe (pyodermites, gangrènes cutanées, otites, muguet de la bouche et stomatites diverses, vulvo-vaginites). A l'intérieur on peut prescrire 1 à 2 cuillerées à café dans un verre d'eau ou de lait. Le Dr Baroux a fait évaporer l'eau oxygénée près des enfants coquelucheux.

**Ozone.** — Les vapeurs ozonisées ont été employées dans la phtisie pulmonaire et dans la *coqueluche*. Dans la coqueluche, on place les enfants devant l'appareil à ozone pendant 10 minutes 2 à 5 fois par jour.

## P

**Pancréatine.** — Pancréatine sèche, en poudre (10 centigrammes par année d'âge). Peut s'associer à d'autres poudres digestives :

Pancréatine. . . . .	0 <sup>rs</sup> ,10
Magnésie calcinée. . . . .	} aa 0 <sup>rs</sup> ,20
Bicarbonate de soude. . . . .	
Poudre de noix vomique. . . . .	un centigramme.

Pour un paquet; en prendre 2 ou 5 par jour avant le repas, dans une cuillerée à café de sirop, eau sucrée, miel, confiture.

**Pancréatokinase.** — Mélange de pancréatine et d'eukinase (3 de la première, 1 du second) préparé par Hallion; se prescrit granulé par petites mesures (1 à 5 par jour).

**Papaïne.** — Dissolvant de l'albumine et de la fibrine, peut remplacer la pancréatine et la pepsine (5, 10, 15, 20 centigrammes par jour). Bouchut faisait des badigeonnages dans la diphtérie avec :

Papaïne. . . . .	1 gramme.
Eau distillée. . . . .	160 —

**Paraffine.** — Injection sous-cutanée (méthode de Gersuny) de paraffine, liquéfiée par la chaleur dans un but plastique (nez enfoncé, etc.).

**Paraldéhyde.** — Hypnotique, se prescrit par cuillerées à café (élixir d'Yvon); peut s'associer au trional (Ropiteau) :

Trional. . . . .	1 gramme.
Paraldéhyde. . . . .	2 —
Huile d'amandes. . . . .	15 —

On se sert de cette solution huileuse pour faire une potion :

Solution huileuse. . . . .	45 grammes.
Mucilage carragaen. . . . .	90 —
Kirsch. . . . .	15 —

Prendre une cuillerée à dessert le soir.

En suppositoire :

Trional. . . . .	0 <sup>gr</sup> ,25
Paraldéhyde. . . . .	0 <sup>gr</sup> ,50
Beurre de cacao. . . . .	2 grammes.

**Pariétaire.** — Plante nitrée, donc diurétique. *Infusion* (2 pour 100).

**Pas d'âne.** — (Voyez *Tussilage*).

**Pastilles et tablettes.** — On fait des pastilles de *menthe*, de sels de *Vichy*, bonnes pour la digestion, des tablettes de *soufre* (10 centigrammes), de *kermès* (1 centigramme), d'*ipéca* (1 centigramme), de *tolu*, de *calomel* (5 centigrammes).

**Patience.** — Plante soufrée prescrite dans les dermatoses. *Décoction* de racine sèche (5 à 4 pour 100), *infusion* (2 pour 100), *extrait* (4 à 5 grammes), *suc* purgatif (40 à 50 grammes).

**Paullinia.** — Des semences du paullinia sorbilis on retire le *guarana*, qui contient de la caféine et du tannin. *Sirap* à base d'extrait hydro-alcoolique (1 pour 100) : 20 à 50 grammes.

**Pavot.** — Les graines donnent l'huile d'œillette.

*Sirap* de pavot blanc à base d'extrait alcoolique (1 pour 100). *Décoction* de têtes de pavot concassées (1 à 2 par litre).

**Pêcher.** — *Sirap* de fleurs laxatif (2 à 5 cuillerées à café). *Infusion* ou *décoction* de feuilles (4 pour 100), a été employée dans la coqueluche. Cataplasme de feuilles de pêcher sur le ventre contre les ascarides.

**Pelletiérine.** — (Voyez *Grenadier*).

**Pensées sauvages.** — Contre les dermatoses on a prescrit l'*infusion* (1 pour 100).

**Pepsine.** — Ferment du suc gastrique; la solution évaporée à 40°, jusqu'à consistance de pâte, donne la *pepsine extractive* (10 centigrammes par année d'âge). La pepsine mêlée à parties égales d'amidon forme la *pepsine amylicée*. *Elixir* de pepsine (une cuillerée à café avant le repas). J'associe la pepsine à d'autres poudres :

Pepsine. . . . .	0 <sup>gr</sup> ,10
Magnésie calcinée. . . . .	0 <sup>gr</sup> ,15
Bicarbonate de soude. . . . .	0 <sup>gr</sup> ,20
Poudre de noix vomique. . . . .	un centigramme.

Pour un paquet, en prendre 2 ou 5 par jour avant le repas.

**Peptones.** — Produit de la digestion des matières albuminoïdes par la *pepsine* et l'*acide chlorhydrique*. Peptone sèche, peut se prendre dans le bouillon (5 grammes par tasse), dans le vin de Malaga (5 pour 100); on la donne aussi en lavement :

Peptone sèche. . . . .	5 grammes.
Jaune d'œuf. . . . .	n° 1
Eau tiède. . . . .	100 grammes.

La peptone représente 6 fois son poids de viande.

La *peptone liquide* se prescrit à dose double. On a associé la peptone aux sels métalliques (*peptonate de fer*, etc.).

**Permanganate de potasse.** — Désinfectant énergique et peu toxique, employé en injections à 1 pour 1000 dans la vulvo-vaginite des petites filles, à 1 pour 2000 dans l'ophtalmie purulente, dans la pleurésie putride ou purulente. Je l'ai employé dans le noma, l'angine gangréneuse. Dans la diphtérie, on a pu toucher les fausses membranes avec une solution à 1 pour 200 ou 1 pour 100 de permanganate de potasse ou de chaux. On a traité le lupus par les solutions fortes de permanganate.

Contre l'empoisonnement opiacé, on fait ingérer une solution de permanganate de potasse à 1 pour 1000 : deux cuillerées à soupe par heure dans un demi-verre d'eau. M. Torre, chez une fille de 5 ans, ayant avalé 6 centigrammes de chlorhydrate de morphine, a fait prendre 20 centigrammes de permanganate dans un verre d'eau, et a injecté ensuite 5 cc. à courts intervalles de :

Permanganate de potasse. . . . .	0 <sup>gr</sup> ,10
Eau distillée. . . . .	10 grammes.

**Persodine.** — Solution à 1 pour 100 de *persulfate de soude et ammoniacque*; action apéritive. On en donne, dans de l'eau pure, 1 heure à 1 heure 1/2 avant le repas, une cuillerée à café, à entremets, à soupe suivant l'âge (soit 5, 10, 20 centigrammes de persulfates alcalins).

**Persil.** — *Décoction* de racines (2 à 5 pour 100), *infusion* de feuilles (1 pour 100), *poudre* de feuilles sèches (1/2 à 1 gramme). Des semences, on a retiré l'*apiol* emménagogue.

**Pervenche.** — *Décoction* de feuilles (2 à 5 pour 100); ferait passer le lait; cataplasmes appliqués sur le sein.

**Petit-lait.** — (Voyez *Lait*).

**Pétrole.** — Huile de pétrole en badigeonnages de la gorge (diphtérie). Savon de pétrole contre la gale. Frictions au pétrole contre les poux de tête.

**Peuplier.** — *Charbon de Belloc* préparé avec les jeunes poudes de peuplier, employé dans les dyspepsies (1 à 5 grammes par jour).

**Phénacétine.** — Antithermique et analgésique comme l'antipyrine (10 centigrammes par année d'âge). On prescrit des paquets (2 à 5 par jour) en suspension dans l'eau sucrée, un sirop, etc.

**Phénocolle.** — Le chlorhydrate de phénocolle a été recommandé dans la coqueluche par Martinez Vargas (10 centigrammes par année d'âge).

**Phényluréthane.** — (Voyez *Euphorine*).

**Phosphore.** — *Phosphure de zinc* (granules de 4 milligrammes répondant à 1 milligramme de phosphore pur, dont 1/2 agit); on peut donner un de ces granules dans la première enfance. Ne pas continuer plus de 10 jours. Dans le rachitisme, je prescrivis environ 1/2 milligramme de phosphore par jour, pendant 10 ou 15 jours, avec suspension d'égale durée :

Huile phosphorée du codex. . . . .	10 grammes.
Huile d'amandes. . . . .	90 —

Prendre une cuillerée à café, le matin, avant le déjeuner.

Le *glycérophosphate de chaux* se prescrit en poudre (5 à 10 centigrammes, 2 fois par jour), en granulé (par cuillerées à café); le *glycérophosphate de soude* est soluble et peut se donner en solution ou sirop.

**Phosphates.** — Le phosphate tribasique ou tricalcique (poudre d'os) est peu assimilable, il est bon contre la diarrhée et je formule souvent :

Phosphate de chaux tribasique. . . . .	} aa 0 <sup>gr</sup> ,25
Benzonaphtol. . . . .	
Sous-nitrate de bismuth. . . . .	

Pour un paquet, en prendre 2 ou 5 par jour, dans une cuillerée d'eau sucrée.

Les *phosphates acides* sont solubles et servent à faire des solutions, sirops de chlorhydro-lacto-citro-phosphate de chaux, qu'on prescrit par cuillerées.

**Hypophosphites** (Churchill), peuvent remplacer les phosphates :

Hypophosphite de soude. . . . .	5 grammes.
Sirap de fleurs d'oranger. . . . .	50 —
Sirap simple. . . . .	550 —

1 à 4 cuillerées à café par jour.

Chaque cuillerée à soupe (20 grammes) contient 25 centigrammes d'hypophosphite.

**Pichi.** — Médicament de la gravelle; *décoction* de bois (2 pour 100), prise par tasses (2 à 5 par jour), serait diurétique et cholagogue.

**Picrotoxine.** — Poison tétanisant retiré de la coque du Levant. On a donné des granules de 1 milligramme (1 à 3, suivant l'âge), dans la chorée, les convulsions, l'épilepsie.

**Pilocarpine.** — (Voyez *Jaborandi*).

**Piment.** — Irritant pour les muqueuses, se prescrit dans l'atonie digestive, les hémorroïdes, en *poudre* (5 à 20 centigrammes), en *teinture* (1/2 à 2 grammes), en *extrait aqueux* (40 à 50 centigrammes), en *infusion* (5 p. 100) pour gargarismes.

**Pin.** — *Teinture* d'écorce de mélèze (*Pinus larix*), expectorante (1 à 2 grammes). *Bourgeons* de pin (*Pinus sylvestris*), s'emploient dans les bronchites en *infusion* (2 à 5 pour 100), en *sirop* (20 à 50 grammes), en *extrait* (1/2 à 1 gramme), en *eau distillée*, etc.

**Pipérazine.** — Dissolvant de l'acide urique (10 centigrammes par année d'âge).

**Pissenlit.** — *Décoction* de racines et feuilles (4 à 6 pour 100), *suc* (50 à 100 grammes), *extrait* (5 à 6 grammes).

**Plomb.** — *Extrait de saturne* (5 acétate de plomb, 1 litharge, 9 eau). *Eau de Goulard*, ou *eau blanche* (10 à 30 grammes d'extrait de saturne par litre). *Iodure de plomb*, se prescrit en pommade résolutive à 1/10 avec iodure de potassium.

*Nitrate de plomb*, employé en poudre contre l'ongle incarné.

**Podophylin.** — Racine purgative et cholagogue (5 centigrammes par année d'âge), en *poudre* mêlée au sucre, au miel, en pilules, cachets, etc.

**Polygala.** — Plante émétique, expectorante. *Infusion* ou *décoction* de racine (2 à 4 grammes pour 500); *extrait* (1 ou 2 grammes en potion); *sirop* (20 à 50 grammes).

**Polypode.** — *Décoction* purgative (4 à 6 pour 100).

**Potassium.** — *Acétate* de potasse, diurétique, peut s'associer au *nitrate* ou *azotate* de potasse (10 centigrammes par année d'âge).

*Bicarbonate de potasse*, entre dans la composition de la potion de Rivière.

*Bromure de potassium.* — (Voyez l'article *Bromure*).

*Chlorate de potasse* (sel de Berthollet), employé à l'intérieur (10 à 20 centigrammes par année d'âge), et en gargarisme (4 pour 100), peut être remplacé par le *chlorate de soude* moins toxique; très usité dans les stomatites et amygdalites.

En potion, on peut prescrire :

Chlorate de potasse ou de soude . . . . .	1 à 2 grammes.
Julep gommeux . . . . .	400 —

Prendre par cuillerées de 2 en 2 heures (enfant de 5 à 10 ans).

En gargarisme :

Chlorate de potasse ou de soude . . . . .	10 grammes.
Miel rosat . . . . .	40 —
Décoction de feuilles de ronces . . . . .	250 —

*Citrate de potasse*, prescrit dans la diathèse urique (5 à 10 centigrammes par année d'âge) en paquets ou solution.

**Pyramidon.** — Antithermique plus puissant, mais plus toxique que l'antipyrine (5 centigrammes par année d'âge).

**Pyrèthre.** — *Décoction* de racines (10 pour 100) stimulante de la digestion. *Poudre* de *Chrysanthemum rigidum*, dite de *pyrèthre*, contre les puces, poux, etc.

**Pyridine.** — Inhalations contre l'asthme (4 à 5 grammes dans une assiette près du malade).

## Q

**Quassia.** — *Macération* de copeaux (1 pour 100). *Décoction* pour lavement contre les oxyures (10 grammes pour 50). *Poudre*, *teinture*, à 1 pour 5.

*Quassine* amorphe (par centigrammes), cristallisée (par milligrammes).

**Quebracho.** — *Poudre* d'écorce (5 centigrammes par année d'âge), *teinture* (1 à 2 grammes), *extrait fluide* (1 à 2 grammes), fébrifuge. L'*aspidospermine* se prescrit par centigrammes (1 par année d'âge).

**Quinquina et quinine.** — *Extrait* mou ou sec (10 à 20 centigrammes par année d'âge), peut se prescrire granulé (quinium granulé). *Sirop* fait avec l'extrait (20 à 50 grammes). *Teinture* à 1/5 et *extrait fluide* (1 à 2 grammes). *Vin* de quinquina, trop alcoolique pour les enfants (ne le donner qu'après le repas, jamais à jeun). *Macération* de quinquina (5 pour 100). *Poudre* de quinquina avec charbon et essence de menthe (IV gouttes) comme dentifrice. Pour le pansement des plaies :

Poudre de quinquina rouge . . . . .	} ã 20 grammes.
— charbon . . . . .	
Camphre . . . . .	5 —

*Quinine* (alcaloïde du quinquina), tonique vasculaire, antithermique, antiseptique général (10 centigrammes par année d'âge). *Quinine brute*, peu usitée parce qu'elle est insoluble (cependant insipide). On préfère les sels de quinine, quoique très amers : *sulfate* (60 pour 100 de quinine), *chlorhydrate* (81 pour 100), *lactate*, *bromhydrate*, *valérianate*, *tannate* (50 pour 100), *chlorhydrosulfate*, etc.

Pour masquer l'amertume des sels de quinine, on peut les prescrire dans le café sucré qui en précipite une partie, ou les édulcorer avec la glycyrrhizine (jus ou extrait de réglisse). En ajoutant l'antipyrine on les rendra solubles :

Sulfate de quinine . . . . .	} ã 1 gramme.
Antipyrine . . . . .	
Extrait de réglisse . . . . .	5 grammes.
Sirop de fleurs d'oranger . . . . .	10 —
Eau distillée de menthe . . . . .	40 —

Prendre en 2 ou 4 gorgées dans la journée.

Parmi les sels insipides récemment préparés, il faut citer les carbonates, tels que l'*euquinine*, et surtout l'*aristochine* (96 pour 100 de quinine) qu'on peut donner en petits paquets de 20 à 50 centigrammes dans une cuillerée à café d'eau sucrée.

Pour les préparations à employer par la voie rectale (lavements, suppositoires) ou sous-cutanée (injection hypodermique), on emploiera les sels solubles tels que le *chlorhydrate neutre* ou *bichlorhydrate de quinine* et le *chlorhydrosulfate* :

Chlorhydrate neutre de quinine . . . . .	0 <sup>er</sup> ,25
Beurre de cacao . . . . .	2 grammes.

Pour un suppositoire.

Chlorhydrosulfate de quinine . . . . .	0 <sup>er</sup> ,25
Eau distillée . . . . .	40 grammes.
Laudanum de Sydenham . . . . .	1 goutte.

Pour un lavement à garder.

Bichlorhydrate de quinine . . . . .	2 <sup>er</sup> ,50.
Eau distillée q. s. pour . . . . .	10 c. c.

Pour injections hypodermiques.

Les pommades à la quinine livrent trop peu à l'absorption pour qu'on puisse compter sur la voie cutanée.

## R

**Raifort.** — Crucifère antiscorbutique; *poudre* de racine (2 à 4 grammes), *décoction* (2 pour 100), *sirop* antiscorbutique (avec cresson et trèfle d'eau) dit encore *sirop*

de raifort composé, peut être additionné d'iode (2 centigrammes pour 20 grammes).

**Ratanhia.** — Écorce de racine très astringente. *Infusion* prolongée (2 pour 100), *teinture*, *extrait* aqueux et hydroalcoolique à 1/5 et *extrait fluide*, *sirop* (25 grammes d'extrait par litre). Le ratanhia contient 40 pour 100 de tanin. Employé dans les hémorragies, la fissure anale, le prolapsus rectal (suppositoires avec 1 gramme d'extrait pour 2 grammes de beurre de cacao).

**Réglisse.** — Rhizomes d'une légumineuse contenant un sucre spécial, la *glycyrrhizine*. *Infusion* prolongée (5 pour 100). *Extrait* ou *suc* pour masquer l'amertume de certains médicaments (5 à 10 grammes en potion).

**Reine des prés.** — *Infusion* de fleurs sudorifiques (1 à 5 pour 100). Gubler a préconisé l'*infusion* prolongée de feuilles (4 à 8 grammes par litre) comme diurétique. On prépare une eau distillée, un extrait, un sirop, une teinture, etc.

**Résorcine.** — Antiseptique et antithermique. Solution à 5 ou 10 pour 100 en badigeonnages dans la coqueluche (Moncorvo), dans les angines scarlatineuses, etc. (Comby):

Résorcine . . . . .	1 gramme.
Glycérine . . . . .	} à 10 grammes.
Eau distillée . . . . .	

Pommades à 1/10 dans les dermatoses. Instillations nasales avec V à VI gouttes matin et soir de :

Résorcine . . . . .	1 gramme.
Huile d'olives stérilisée . . . . .	25 grammes.

En potion (5 centigrammes par année d'âge).

**Rhubarbe.** — *Poudre* (2 centigrammes par année d'âge comme stomachique, 20 centigrammes comme purgatif). *Macération* ou *infusion* (1 à 5 pour 100). On prescrit la *teinture*, l'*extrait*, le *sirop de rhubarbe* composés ou sirop de chicorée (par cuillerées à café dans le premier âge), le vin de rhubarbe.

**Rhus aromatica**, etc. — Cette plante de la famille des térébinthacées (*sumac*) a été prescrite dans l'incontinence d'urine :

Extrait fluide de rhus aromatica . . . . .	0 <sup>er</sup> ,50
Sirop de fleurs d'oranger . . . . .	1 gramme.
Eau distillée . . . . .	4 grammes.

Prendre cette dose 5 fois par jour (Freyberger).

Feuilles sèches de rhus radicans . . . . .	1 gramme.
Alcool à 21° Cartier . . . . .	5 grammes.

Macérer 15 jours, passer et filtrer; V à XX gouttes matin et soir dans l'eau sucrée; aller à XL gouttes après 6 ans (R. Saint-Philippe).

Poudre de feuilles de rhus toxicodendron . . . . .	0 <sup>er</sup> ,10
Sucre en poudre . . . . .	1 gramme.

Pour 1 paquet; en prendre 1 à 2 par jour.

**Riz.** — *Décoction* (2 pour 100) contre la diarrhée.

**Romarin.** — *Infusion* (1 à 2 pour 100), *eau distillée* (50 à 50 grammes), *alcoolat* (2 à 5 grammes), *huile essentielle* (II à V gouttes).

**Ronce.** — *Infusion* ou *décoction* de feuilles (5 pour 100) édulcorée avec sirop de mûres ou miel rosat (15 pour 100) en gargarismes.

**Roses.** — *Infusion* de pétales de roses rouges (1 pour 100) pour collyres, lavements et injections astringents; *poudre* (2 à 4 grammes), *consève* (10 à 20 grammes), *sirop* (50 grammes en potion), mellite ou *miel rosat*.

Infusion de roses rouges . . . . .	250 grammes.
Miel rosat . . . . .	40 —

Pour gargarismes.

*Sirop* de roses pâles laxatif.

## S

**Safran.** — *Sirop* (15 centigrammes par cuillerée), *teinture* à 1/5; le sirop de dentition Delabarre est à base de safran.

**Safran de mars apéritif.** (Voyez *Fer.*)

**Salacétol.** — Prescrit par Bourget dans les diarrhées et le rhumatisme (75 pour 100 d'acide salicylique). Se prescrit par 1 ou 2 grammes par jour dans 10 ou 15 grammes d'huile de ricin.

**Salicaire.** — *Poudre* (1 gramme), *décoction* (2 à 3 pour 100) comme antiscorbutique, antidiarrhéique.

**Salipyrine.** — Antithermique (25 centigrammes par année d'âge), en paquets ou potion :

Salipyrine . . . . .	2 grammes.
Glycérine . . . . .	40 —
Sirop de fleurs d'oranger . . . . .	20 —
Eau distillée . . . . .	40 —

**Salol.** — Sert au pansement des plaies (expose aux érythèmes), *salol camphré* dans l'otite, *vaseline salolée* à 1/10. A l'intérieur contre la diarrhée (10 centigrammes par année d'âge).

**Salsepareille.** — *Décoction* de racines (6 pour 100); *sirop* simple et *sirop* de Cuisinier avec miel, séné, anis vert, etc.

**Santal.** — *Essence* en capsules de 50 centigrammes (5 à 6 par jour).

**Santonine.** — Principe actif du semen-contra (1 centigramme par année d'âge) contre les vers nématodes, ascarides, oxyures, etc.; s'associe au calomel :

Santonine . . . . .	0 <sup>er</sup> ,05
Calomel . . . . .	0 <sup>er</sup> ,10
Sucre de lait . . . . .	1 gramme.

Pour un paquet, n° 5, à prendre 5 jours de suite le matin à jeun dans une cuillerée d'eau (enfant de 5 ans).

**Saponaire.** — *Décoction* de racines, en *infusion* (2 pour 100), *extrait*, *sirop* avec extrait (60 pour 1000). On donne en potion 20 à 30 grammes de ce sirop qui passe pour diurétique, sudorifique, emménagogue, etc.

**Sarracenia.** — *Décoction* ou *infusion* de poudre de racines (2 à 5 pour 100), prise au début de la variole.

**Sauge.** — *Infusion* (2 à 5 pour 100); *poudre* (1 à 2 grammes), *eau distillée* (20 à 50 grammes), *suc* (4 à 8 grammes), *huile essentielle* (IV à VI gouttes en potion), se prescrivent dans la diarrhée et la dyspepsie atonique.

**Saule.** — *Décoction* d'écorce (5 à 6 pour 100); *extrait* (1 à 2 grammes); contre le rhumatisme.

**Scammonée.** — Bon purgatif insipide pour enfants (5 centigrammes par année d'âge), s'associe bien avec le calomel.

**Scille.** — *Poudre* (1 à 2 centigrammes par année d'âge); peut s'associer à la digitale, à la scammonée :

Poudre de scille . . . . .	} à 0 <sup>er</sup> ,05.
— digitale . . . . .	
— scammonée . . . . .	
Sucre de lait . . . . .	1 gramme.

Pour 1 paquet, n° 5; à prendre dans la journée (enfant de 8 à 10 ans). On peut donner aussi la poudre de scille avec calomel, soufre, etc.

Poudre de scille . . . . .	} à 0 <sup>er</sup> ,05
Soufre lavé . . . . .	
Sucre . . . . .	
	0 <sup>er</sup> ,50

Pour 1 paquet; 5 à 4 par jour.