

Trional. — Hypnotique (25 centigrammes le soir avec tasse de lait chaud ou thé). En suppositoire, on prescrit :

Trional	0 ^{er} ,25
Beurre de cacao	2 grammes.

Tuberculine. — Sert au diagnostic de la tuberculose latente; injecter 1/10 de milligramme par centimètre cube, parfois 1/5 de milligramme pour avoir la réaction thermique révélatrice.

Turquette. — *Infusion* (5 pour 100), serait diurétique. A recommander chez les asthmatiques, hydropiques, etc. On peut lui associer l'aigremoine.

Tussilage. — *Infusion* (1 pour 100) dans les bronchites.

Tussol. — Prescrit par Behn dans la coqueluche (15 centigrammes 5 ou 4 fois par jour); augmenter ensuite et aller jusqu'à 4 grammes par jour.

U

Uréthane. — Hypnotique (10 centigrammes par année d'âge), à prendre dans une cuillerée d'eau sucrée ou sirop.

Ural (mélange de chloral et d'uréthane), se prescrit aux mêmes doses.

Uricédine. — *Poudre* granulée (1/2 à 1 cuillerée à café, matin et soir dans un peu d'eau) contre l'uricémie. Boire beaucoup d'eau après l'ingestion.

Urophérine. — Analogue à la diurétine (2 à 5 grammes par jour).

Urotropine. — Dissolvant de l'acide urique, diurétique (25 à 50 centigrammes par paquet : 5 à 6 suivant l'âge dans une cuillerée d'eau sucrée).

Ustilago maidis. — Hémostatique, champignon analogue à l'ergot de seigle; *extrait fluide* (2 à 5 grammes). *Ustilagine* (principe actif).

Uva ursi. (Voyez *Busserole*.)

V

Valériane. — On emploie la racine pulvérisée dans la polyurie avec l'*extrait* (25 centigrammes de chaque 4 ou 5 fois par jour). *Infusion* de valériane (10 pour 100 en lavement avec jaune d'œuf).

Valérianate d'ammoniaque (5 centigrammes par année d'âge). J'ai prescrit :

Valérianate d'ammoniaque	0 ^{er} ,50
Sirop de fleurs d'oranger	20 grammes.
Eau de menthe	60 —

Par cuillerées de 2 en 2 heures.

Valérianate de quinine (10 centigrammes par année d'âge); *valérianate de zinc* (1 centigramme).

Valérobromine (50 centigrammes par cuillerée à café : 2 à 4 par jour).

Vanadium. — *Métavanadate de soude* en solution à 1 pour 100 : injections hypodermiques de 1 à 2 grammes (1 à 2 milligrammes de métavanadate), contre la tuberculose, l'anémie, la chlorose.

Vanille. — *Poudre* (5 centigrammes par année d'âge) mêlée au sucre. *Teinture* (II gouttes par année d'âge). *Infusion* (4 à 5 centigrammes pour 1000). *Vaniline*, sert à faire le sucre vanillé (2 pour 100).

Potion stimulante :

Teinture de vanille	} aā 2 grammes.
— cannelle	
Élixir de Garus	10 —
Sirop d'écorces d'orange	20 —
Eau distillée de mélisse	60 —

Vaseline. — Sert de véhicule aux pommades.

Vaseline liquide ou huile de vaseline, sert de véhicule pour de nombreuses substances qui seraient insolubles dans l'eau (iodoforme, menthol, etc.).

Vasogène (vaseline oxygénée), est un bon excipient pour l'ichtyol, le menthol, l'iodoforme, etc.

Vératrine. — *Pilules* de 2 à 5 milligrammes. Frictions avec la *pommade* dans l'anasarque, l'hydarthrose, etc. :

Vératrine	0 ^{er} ,25
Dissoudre avec alcool et ajouter axonge	50 grammes.

Comme liniment résolutif :

Vératrine	0 ^{er} ,50
Huile d'olive	2 grammes.
Iodure de potassium	4 —
Axonge	50 —

Bouchut a traité le rhumatisme infantile par la vératrine (1 à 5 milligrammes au début, 4 centigrammes à la fin).

Veratrum viride. — Hypotenseur. *Teinture* (II gouttes par année d'âge). Illoyay la prescrit avec la teinture d'aconit dans la pneumonie et la broncho-pneumonie.

Véronal. — Hypnotique (5 centigrammes par année d'âge, le soir, avec tasse de thé ou tilleul).

Véronique. — *Infusion* (15 grammes de feuilles sèches par litre) expectorante et diurétique.

Verveine. — *Infusion* de feuilles sèches (1 pour 100). *Extrait fluide* de verveine bleue (1 à 2 grammes). Sudorifique.

Viburnum prunifolium. — *Extrait fluide* (2 à 5 grammes), *extrait aqueux* en pilules (15 à 20 centigrammes trois fois par jour), *teinture* (1 à 2 grammes).

Viburnine (5 à 10 centigrammes).

Vinaigre. — L'acide acétique dilué peut être utile en lotions contre le prurit, l'urticaire, etc. Contre la phthiase, on emploie le peigne trempé dans :

Sublimé corrosif	1 gramme.
Vinaigre chaud	500 grammes.

On emploie pour l'usage externe le *vinaigre aromatique*, pour l'usage interne le *vinaigre scillitique*, le *vinaigre de colchique*, etc.

Violette. — *Infusion* de fleurs (1 pour 100); *sirop* de violettes. Béchique.

X

Xéroforme. — Cette poudre (tribromophénolate de bismuth) est employée comme antiseptique intestinal (diarrhée), comme topique en poudre ou pommade (1/20) dans l'eczéma des enfants.

Z

Zédoaire. (Voyez *Curcuma*.)

Zinc. — *Chlorure de zinc*, bon antiseptique (50 pour 1000 pour l'usage externe). *Injections* d'une solution à 1/20 ou 1/10 dans les tuberculoses locales (méthode sclérogène de Lannelongue). *Solution* à 5 pour 1000 pour vulvo-vaginite, pleurésie purulente, etc.

Le *peroxyde de zinc* ou *ektogan* est une poudre antiseptique qu'on peut employer à la place de l'iodoforme, etc., dans les brûlures, dermites et eczémas; on peut se servir d'une pommade à 1/10.

Dans les lésions dermiques superficielles sus-indiquées, on peut employer la poudre pure d'*ektogan*. Quand il s'agit d'ulcérations, de lésions plus profondes, on ajoute un acide faible (citrique, tartrique) ou l'on mêle avec tanin.

Par exemple 1 gramme d'*ektogan* avec 3 grammes d'acide donne 40 centigrammes d'eau oxygénée à 12 volumes à l'état naissant, tout en dégageant de l'ozone.

De même les iodures d'*ektogan* donnent de l'iode à l'état naissant.

Sulfate de zinc, sert en collyre dans les conjonctivites :

Sulfate de zinc 0^{re},05
Eau distillée 5 grammes.

Instiller matin et soir I à II gouttes entre les paupières.

On a prescrit ce sel à l'intérieur dans la chorée, etc. (5, 10, 15 centigrammes).

Oxyde de zinc, se prescrit en pommade à 1/10, 1/5, dans les eczemas ; on en fait aussi des pâtes et des colles. A l'intérieur (1 à 2 centigrammes par année d'âge).

Valérianate de zinc (5 à 10 centigrammes 3 fois par jour) dans l'épilepsie et autres névroses.

TABLE DES MATIÈRES

DU TOME V

CHAPITRE XVIII. — MALADIES DU FŒTUS ET DU NOUVEAU-NÉ 1

I. Maladies du fœtus (BALLANTYNE) 1

Historique 1

Classification 2

Pathologie intra-utérine 4

Diagnostic 6

Traitement 9

Anasarque généralisée du fœtus 10

Éléphantiasis kystique congénital 12

Atrophie congénitale du tissu cellulaire sous-cutané 13

Ichtyose fœtale, type grave 15

Ichtyose fœtale, type bénin 14

Nævus névrotique 15

Tylosis palmæ et plantæ 15

Kératolyse, desquamation, hyperkératose congénitale 15

Hypertrichose congénitale 16

Hypotrichose congénitale 16

Pemphigus congénital 16

Absence congénitale de la peau 17

Maladies fœtales des os 17

Ascite fœtale 18

Péritonite du fœtus 19

Oblitération congénitale des voies biliaires 19

Distension de la vessie 19

Goitre congénital 20

Prolapsus congénital de l'utérus 20

Maladies fœtales transmises 20

Des fièvres chez le fœtus 21

Tuberculose congénitale 22

Paludisme congénital 25

Diabète fœtal 25

Autres maladies transmises du fœtus 25

Intoxications transmises 24

Traumatismes fœtaux 24

II. Infections septiques du fœtus, du nouveau-né et du nourrisson (R. FISCHL) 27

Notions générales 27

Étiologie 30

Symptômes 42

Diagnostic 49

Pronostic 51

Anatomie pathologique 52

Traitement 62