

**LIQUOR FERRI ET QUININÆ CITRATIS.**

**SOLUTIO FERRI ET QUININÆ CITRATIS.**

(Farmacopea Americana, 1880.)

SOLUCION DE CITRATO DE HIERRO Y DE QUININA.

Citrato de hierro amoniacal, <i>sesenta y cinco partes</i> . . . . .	65
Quinina, (el alcaloide) desecada á la temperatura de 100° C. (212° F.) hasta que cese de perder en peso, <i>doce partes</i> . . . . .	12
Ácido cítrico, <i>veinte y ocho partes</i> . . . . .	28
Alcohol, <i>treinta partes</i> . . . . .	30
Agua destilada, q. s., cantidad suficiente.	
Para obtener <i>doscientas partes</i> . . . . .	200

Disuélvase el citrato de hierro amoniacal en *doscientas* (200) *partes* de agua destilada, contenida en una cápsula de porcelana; caliéntese la solución á la temperatura de 60° C. (140° F.) al baño-maría y agréguese el ácido cítrico, y cuando esté disuelto, añádase la quinina y agítese la mezcla hasta obtener una perfecta solución. Evapórese despues hasta obtener *ciento sesenta* (160) *partes*, déjese enfriar y finalmente agréguese el alcohol y suficiente agua destilada para hacer que la solución pese *doscientas* (200) *partes*.

Un líquido de un verde-amarillo á un amarillento-oscuro transparente y de capas delgadas sin olor de un gusto medianamente amargo-ferruginoso y de una reacción ligeramente ácida. La solución contiene *seis por ciento* de quinina.

*Uso único: Vinum Ferri Amari.*—Vino de hierro amargo, muy usado, y con buenos resultados, en los Estados Unidos. Aunque el proceso de la Farmacopea Americana de 1880 es mas laborioso, no cabe la menor duda que el resultado es mas perfecto que si se emplea la sal de citrato de hierro y de quinina; y no solamente es mas perfecto, sino mas uniforme, requisito de la mas alta importancia y contra cuya falta (de uniformidad) el médico tiene que luchar frecuentemente.

BIBLIOTECA  
MUSEO DE MED. U. N. B.

**CAPÍTULO LVI.**

FÓRMULAS MAS FRECUENTEMENTE USADAS EN LA TERAPÉUTICA GINECOLÓGICA.

No es mi intencion el dar aquí una idea completa de las fórmulas sin cuento que se emplean en el tratamiento terapéutico de las enfermedades de las mujeres, ni siquiera la de publicar un formulario especial de la ginecología, sino la de reunir y ordenar las que están diseminadas en el cuerpo de la obra, uniformándolas y dando á muchas de ellas la exactitud de que carecen. Además he creído útil y práctica la adición de aquellas que aun siendo modernas y hasta recientes, están ya reconocidas como buenas por los ginecólogos de los diversos países y tambien las esplicaciones sobre el uso de cada una y del mérito que se las asigne. Asimismo he modificado aquellas que exigian el ser adaptadas á la práctica de España y de los países españoles é hispano-americanos, y hecho notar también la diferencia de algunos preparados compuestos segun las diversas farmacopeas.

He omitido la repetición de aquellos que ó son oficinales en todos los países ó son semejantes á los indicados por el autor, como por ejemplo de muchos glicerolados, que varían muy poco en todas las farmacopeas y cuya sola indicación es suficiente.

Cuando la buena ejecución de una receta lo exige, he indicado brevemente la manera de prepararla, indicación que, aunque inútil como regla general, puede ser necesaria en determinadas circunstancias y en ciertas localidades.

Resumiendo: estoy muy léjos de creer que el presente capítulo llene todas las necesidades terapéuticas de la ginecología; pero sí espero que satisfaga una exigencia del libro mismo y sea de alguna utilidad práctica á la profesion en general.

**TERAPÉUTICA DE LAS ENFERMEDADES DE LA VULVA.**

LOCION DE OPIO Y PLOMO.

R	Tintura de opio, . . . . .	gramos,	64
	Acetato de plomo cristalizado, . . . . .	decigramos,	11
	Agua, . . . . .	gramos,	64



Mézelese el acetato de plomo con el agua y una vez efectuada la disolucion, añádase la tintura de opio.

Agítese antes de usarlo.

En el tratamiento de la vulvitis purulenta, despues de calmado el estado inflamatorio, conviene hacer aplicaciones constantes de esta locion empapando hilas ó algodón absorbente en el líquido y manteniéndolo entre los labios.

## GLICEROLADO FÉRRICO.

- ℞ **Persulfato de hierro**, (Licor de Monsel) . . . . . *gramos*, 4  
**Glicerina pura**, . . . . . *gramos*, 32  
 Mézelese.

Cuando despues de empleado el tratamiento anodino y emoliente en la vulvitis purulenta, queda aun alguna superficie inflamada, conviene el uso de este glicerolado-férrico y se deben tocar con él varias veces al dia las superficies por medio de un pincel de pelos de camello.

## SOLUCION ARGÉNTICA.

- ℞ **Nitrato de plata**, cristalizado, . . . . . *decigramos*, 5  
**Agua destilada**, . . . . . *gramos*, 30  
 Mézelese en un mortero de cristal.

Cuando la vulvitis purulenta no cede, á pesar de haberse empleado los diversos recursos terapéuticos, será necesario hacer uso de este tóxico-argéntico, tocando todas las superficies enfermas por medio de un pincel de pelos de camello, y esta operacion deberá repetirse á lo ménos cada tres dias, espolvoreando frecuentemente las partes con el Bismuto ó el Licopodio, y aumentando la cantidad de nitrato de plata en los casos rebeldes.

## SOLUCION FÉNICA.

- ℞ **Ácido fénico**, puro, . . . . . *gramo*, 1  
**Alcohol**, . . . . . *gramos*, 10  
**Agua**, . . . . . *gramos*, 490  
 Mézelese y agítese.

Cuando en la vulvitis purulenta, el prurito se manifiesta en el último período de la enfermedad, conviene el uso de esta débil disolucion de ácido fénico, á la cual se pueden agregar el opio y el acetato de plomo, siempre que su empleo esté aun indicado en este período.

## MEZCLA PARA APLICACIONES.

- ℞ **Ácido cianhídrico**, diluido, . . . . . *gramos*, 10  
**Sub-acetato de plomo**, líquido, . . . . . *gramos*, 10  
**Tintura de opio**, . . . . . *gramos*, 10  
**Glicerina**, . . . . . *gramos*, 60  
 Mézelese.

Es una fórmula muy recomendable en la vulvitis foliculosa : despues de lavadas las partes con agua, en la cual se haya disuelto un poco de borato de sosa, se hacen aplicaciones, que se han de repetir tres veces al dia.

## MEZCLA OLEOSA.

- ℞ **Ácido cianhídrico**, diluido, . . . . . *gramos*, 8  
**Acetato de plomo**, cristalizado, . . . . . *decigramos*, 11  
**Aceite de cacao**, . . . . . *gramos*, 62

Pulverícese finamente el acetato de plomo en un mortero ; tritúrese el polvo con algunas gotas del aceite de cacao, y gradualmente agréguese el aceite restante.

El Dr. Oldham ha empleado esta fórmula con buen suceso en la vulvitis foliculosa, y recomienda se mantengan las partes untadas con esta mezcla, que se puede renovar dos ó tres veces al dia.

## MEZCLA PARA LOCIONES.

- ℞ **Agua de laurel cerezo**, . . . . . *gramos*, 70  
**Agua alcanforada**, . . . . . *gramos*, 50  
**Glicerolado bórico**, . . . . . *gramos*, 60  
 Mézelese.

Para lociones frecuentes en la vulvitis foliculosa, y se emplea con ventaja en el intermedio de las aplicaciones, que se hacen cada tres ó cuatro dias, del persulfato de hierro ó del tóxico-argéntico.

## POLVOS PARA LOCIONES.

- ℞ **Borato de sosa**, (Borax) pulverizado y refinado, . . . . . *gramos*, 45  
**Aceite esencial de cayeput**, . . . . . *gotas n.º.*, 15  
 Mézelese en un mortero y háganse 6 paquetes.

Uno de estos paquetes, disuelto en medio cuartillo de agua templada para locionar la vulva y aun para inyectar la vagina toda, ha producido los mejores resultados en los casos mas intensos de prurito, y tres de estos paquetes han de usarse diariamente, para derivar prontos y buenos resultados de su empleo.

## POCION DE HIERRO Y QUININA.

- ℞ **Tintura de muriato de hierro**, (F. Americana) . . . . . *gramos*, 20  
**Sulfato de quinina**, . . . . . *decigramos*, 15  
**Glicerina pura**, . . . . . *gramos*, 50  
**Agua**, . . . . . *gramos*, 60

Mézelese la quinina y el hierro y añádase despues la glicerina y el agua. La tintura *ferri muriatis* es suficientemente ácida para poner la quinina en solucion ; la glicerina la hace menos amarga y el agua ménos espesa ; el todo es de un bellissimo color, pero de un gusto poco



agradable ; si se diluye en agua al tomarla, el paciente lo soportará mejor. La dosis puede ser desde una hasta cuatro cucharaditas al día. Es una fórmula muy usada en los Estados Unidos, y á no dudarlo produce buenos resultados y merece ser empleada con mas frecuencia, ya aumentando ó disminuyendo la dosis de quinina, ya suprimiendo completamente ésta cuando el hierro solamente esté indicado. En la vulvitis gangrenosa ha producido favorables resultados, reanimando las abatidas fuerzas, lo mismo que en la difteritis de la vulva, y en otra multitud de enfermedades similares. (Véase fórmula para la tintura de muriato de hierro y el licor para la misma.)

## LOCION É INYECCION.

℞ Acetato de plomo cristalizado, . . . . .	gramos,	15
Ácido fénico puro, . . . . .	gramos,	3
Tintura de opio, . . . . .	gramos,	125
Agua, . . . . .	gramos,	2000

Mézclese.

Se puede emplear como locion en el prurito intenso de la vulva ; y diluida en igual cantidad de agua, en inyecciones para la vagina.

## LOCION DE SUBLIMADO CORROSIVO Y OPIO.

℞ Sublimado corrosivo, . . . . .	gramos,	2
Tintura de opio, . . . . .	gramos,	30
Agua destilada, . . . . .	gramos,	250

Disuélvase el sublimado en la tintura de opio y agréguese el agua. Para aplicaciones externas y hechas con prudencia, en el prurito de la vulva. Es un preparado muy usado y ha dado muy buenos resultados, así como en el *prurigo podicis*, y en el *pediculus pubis*.

## LOCION DE CLOROFORMO OLEOSA.

℞ Cloroformo del comercio, . . . . .	gramos,	4
Aceite de almendras dulces, . . . . .	gramos,	30

Mézclese y agítese.

Para aplicaciones en forma de locion sobre la vulva y á la entrada de la vagina. En el prurito.

## LOCION OLEOSA ; CON PLOMO Y ÁCIDO CIANHÍDRICO.

℞ Ácido cianhídrico diluido, . . . . .	gramos,	8
Diacetato de plomo, . . . . .	gramos,	1
Aceite de cacao, . . . . .	gramos,	60

Mézclese.

Úsese como la anterior y recomiéndese el lavar la vagina de antemano con agua fria.

## SUPOSITORIOS DE OPIO Y BELLADONA.

℞ Ácido tánico, . . . . .	gramos,	8
Extracto de belladona, . . . . .	decigramos,	6
Extracto de opio, . . . . .	decigramos,	6
Manteca de cacao, . . . . .	q. s.	

M. S. A. y h. en partes iguales, supositorios vaginales núm. 24.

Aplíquese uno ó dos al día, procurando poner el supositorio en contacto con el cuello del útero, y recomendando de antemano el uso de una inyeccion que contenga en solucion sal marina ó borato de sosa. La combinacion del opio con la belladona evita los accidentes que pudieran ocurrir en caso de que sean empleados con mas frecuencia estos supositorios ; y sin destruir la accion medicinal del primero, el segundo evita los accidentes de aquel, y vice-versa. Úsanse contra el prurito ó comezon de la vulva y la vagina.

Finalmente, entre los agentes farmacológicos mas usados en las diversas enfermedades de la vulva, se hallan los siguientes, cuyo empleo queda á la buena discrecion del práctico :

## GLICEROLADO DE ÁCIDO TÁNICO.

Tómese :

Ácido tánico, . . . . .	gramos,	60
Glicerina, . . . . .	gramos,	240

Colóquese el ácido tánico en un mortero y añádase gradualmente la glicerina. Triturando continuamente ; una vez bien incorporado traspásese á una cápsula de porcelana y caliéntese lentamente hasta que el ácido esté completamente disuelto. Farmacopea Americana, 1870.

La fórmula del *Codex* es mas débil ; no está el tanino en perfecta solucion y exige el glicerolado de almidon como base.

## APLICACION HIDRARGÍRICA.

℞ Sublimado corrosivo, . . . . .	gramos,	2
Alcohol, . . . . .	gramos,	15
Tintura de opio, . . . . .	gramos,	30
Agua, . . . . .	gramos,	217

Para aplicaciones en el prurito de la vulva.

## LOCION DE PIXENE.

℞ Pixene, . . . . .	gramos,	8
Glicerina, . . . . .	gramos,	15
Agua, . . . . .	gramos,	180

Es una fórmula muy recomendada, últimamente por el Dr. Locke, en forma de locion, para el *pruritus vulvae* ; y la usa en el acné tambien.



## POMADA CON CLOROFORMO.

℞ Cloroformo, . . . . .	gramos,	3
Cera blanca, . . . . .	gramos,	10
Manteca preparada, . . . . .	gramos,	90

Pomada eficaz contra el prurito.

## LOCION PARA SATURAR LOS TAPONES DE ALGODON.

℞ Ácido fénico, . . . . .	gramos,	1
Laudano, . . . . .	gramos,	15
Ácido hidrocianico, diluido, . . . . .	gramos,	8
Glicerina, . . . . .	gramos,	20
Agua, q. s. para obtener, . . . . .	gramos,	125

Un poco de algodón saturado con esta locion, se aplica á las partes afectadas y se mantiene por algunas horas renovándolo dos ó tres veces al dia.

## POLVOS CON LA COCAINA.

℞ Hidroclorato de cocaina, ( <i>muriato ó clorhidrato</i> ) centigramos,	20
Hidroclorato de morfina, . . . . . centigramos,	15
Subnitrate de bismuto, . . . . . gramos,	30

Se ha empleado recientemente con buenos resultados y es á la vez un poderoso calmante en el prurito, y un astringente útil.

## LOCION CON LA COCAINA.

℞ Hidroclorato de cocaina, ( <i>muriato ó clorhidrato</i> ) centigramos,	20
Alcohol, q. s. para disolver la cocaina.	
Agua, . . . . .	gramos, 300

Para lociones, cuando sea necesario calmar violentamente el prurito.

## LOCION DE COCAINA COMPUESTA.

℞ Hidroclorato de cocaina, ( <i>muriato ó clorhidrato</i> ) centigramos,	30
Clorato de potasio, . . . . .	gramos, 10
Agua de laurel cerezo, . . . . .	gramos, 20
Agua, . . . . .	gramos, 500

Se disuelve la cocaina en q. s. de alcohol.

Es una locion, como todas las que contienen la cocaina, muy costosa, pero sumamente rápida en accion. Además se requiere tan pequeña cantidad de ella para calmar el dolor, comezon ó ardor, que puede muy bien ser económica en este sentido. En las tres fórmulas anteriores que contienen la cocaina (el clorhidrato), como base, se puede aumentar ó disminuir la cantidad de esta sustancia y en las dos últimas se puede reemplazar por las soluciones de un 2 por ciento ó de un 4 por ciento, segun lo exija la fuerza del mal.

Permanganato de potasio, 10 centigramos por libra de agua y se lociona la parte mientras la solucion conserve el color violáceo.

El hidrato de cloral en proporcion de 8 gramos con 30 de la tintura de eucaliptus en dos libras de agua, para aplicaciones.

El sublimado corrosivo con el cloruro de amonio, 15 centigramos del primero por 5 decigramos del segundo; disueltas ambas sustancias en 45 gramos de agua de Colonia y 90 de agua forman una buena locion.

Algunos otros medicamentos, como el carbonato de potasio, el azufre, el alcanfor, el ioduro de plomo, el alquitran, el ácido prúsico diluido, el ácido sulfúrico muy diluido, el agua de lechuga, las soluciones de Magendie, de Fowler y de Donovan y el *Calladium Sequinum*, últimamente muy recomendado, casi completan la terapéutica farmacológica de las diversas variedades de vulvitis, á saber: la purulenta, la foliculosa, la gangrenosa y de las afecciones eruptivas é inflamatorias.

## TERAPÉUTICA DE LAS ENFERMEDADES DE LA VAGINA.

## MEZCLA EMOLIENTE.

℞ Subacetato de plomo líquido, . . . . .	gramos,	30
Estracto de belladona, . . . . .	gramos,	15
Glicerina, . . . . .	gramos,	30
Tintura de opio, q. s. para completar . . . . .	gramos,	120

Una cucharadita de las de café de esta mezcla, en una vasija que contenga por lo ménos dos litros de agua caliente, es muy útil como baño emoliente, y la misma cantidad por cada litro de agua templada, para inyecciones en la *vaginitis granulosa*.

## INYECCIONES.

℞ Sulfato de zinc, . . . . .	} á á . . . . .	gramos,	8
Alumbre calcinado, . . . . .			
Agua, . . . . .		gramos,	300

Despues de calmada la gravedad del mal, convienen estas inyecciones, lo mismo que las que contengan el borato de sosa, el tanino, el roble, el nogal, el cardo batanero, etc.

## SOLUCION ARGÉNTICA.

℞ Nitrate de plata cristalizado, . . . . .	gramos,	4
Agua destilada, . . . . .	gramos,	30

En la vaginitis, cuando la forma aguda tiende á tomar un carácter sub-agudo ó crónico, se emplea esta solucion argéntica para barnizar toda la vagina, valiéndose del spéculum y taponando inmediatamente el canal con el glicerolado de tanino y morfina, el de plomo opiado ó el de zinc ó borato de sosa. Recientemente se empleó un glicerolado de un 4 por ciento de muriato de cocaina, con buenos resultados para el médico y alivio instantáneo de la enferma.



## SUPOSITORIOS.

Los mas frecuentemente empleados, son los que contienen opio y belladona, que deben ser colocados despues de cada inyeccion por la mañana ; las dos fórmulas siguientes son las de mas frecuente uso.

℞	Ácido tánico, . . . . .	gramos,	5
	Sulfato de morfina, . . . . .	centigramos,	20
	Manteca de cacao, q. s.		

H. supositorios vaginales, cilíndricos n.º 12 : dos al dia.

℞	Ácido tánico, . . . . .	gramos,	4
	Estracto de belladona, . . . . .	gramo,	1
	Estracto de opio, . . . . .	gramo,	1
	Manteca de cacao, c. s.		

H. supositorios cilíndricos n.º 10 : dos al dia.

## POMADA.

℞	Cold cream, . . . . .	gramos,	30
	Sulfato de atropina, . . . . .	centigramos,	12
	M.		

Esta pomada representa la fórmula del Dr. Pearlee, é incuestionablemente es una modificacion acertada.

Como aplicacion local, en el vaginismo.

## LOCION DE COCAINA.

℞	Hidroclorato de cocaina, ( <i>muriato ó clorhidrato</i> ) centigramos,	20
	Tritúrese con q. s. de alcohol para disolver el alcaloide y agréguese :	
	Glicerina, . . . . .	gramos, 30
	Agua, . . . . .	gramos, 90

Para calmar la escitacion de los nervios de la vagina, es un preparado muy recomendable : se usa en aplicaciones sobre la parte sensible ó se satura un poco de algodón absorbente y se deja sobre la parte durante 20 minutos ó mas.

## TERAPÉUTICA DE LA ENDOMETRITIS.

## POCION CONTRA LAS PERTURBACIONES NERVIOSAS.

℞	Bromuro de potasio, . . . . .	gramos,	5
	Agua alcanforada, . . . . .	gramos,	30
	Tintura de paregórico, ( <i>elixir</i> ) . . . . .	gramos,	20
	Espiritu de nitrato dulce, . . . . .	gramos,	10
	Jarabe de corteza de naranjas amargas, . . . . .	gramos,	60

Una cucharadita tres veces al dia en un poco de agua, en las perturbaciones del sistema nervioso que ocurre en la endometritis cervical.

## LAXANTE-TÓNICO.

℞	Sulfato de magnesia, . . . . .	gramos,	50
	Sulfato de hierro, . . . . .	gramos,	1
	Ácido sulfúrico diluido, . . . . .	gramos,	4
	Glicerina pura, . . . . .	gramos,	120
	Agua, . . . . .	gramos,	880

Para tomar dos cucharadas de las de sopa en un medio vaso de agua fria ó helada, por la mañana en ayunas, cuando sea necesario regularizar el vientre, en la endometritis cervical crónica.

## POCION DIGESTIVA.

Cuajar lavado y picado, N.º 1.

Vino de Jerez, . . . . . gramos, 500

Macérese el cuajar en el vino por espacio de diez ó doce dias, decántese, fíltrese y añádase :

	Ácido nitro-muriático diluido, . . . . .	gramos,	8
	Tintura de nuez vómica, . . . . .	gramos,	8
	Subnitrato de bismuto, en polvo sutilísimo . . . . .	gramos,	7
	Glicerina pura, . . . . .	gramos,	120

Es una modificacion de la fórmula que el Dr. Thomas recomienda en la página 219 de esta obra. La adición de la glicerina no solamente aumenta la actividad del medicamento, sino que lo hace muy agradable. Se puede tambien sustituir el vino de Jerez por uno dulce, como el Moscatel, y en este caso ó se disminuye ó se suprime la glicerina. En la endometritis cervical y sobre todo en la forma crónica, así como en otras enfermedades del útero, la falta de apetito y la mala digestion se hallan reunidas, y, en semejantes casos, la fórmula anterior obra como un digestivo, como reconstituyente, y hace recobrar el apetito.

Una cucharada de las de sopa en agua, unos 15 minutos ántes de cada comida.

El autor ha descrito tan estensa y completamente los recursos terapéuticos empleados en las diversas formas de endometritis, que hace innecesaria una repeticion en este lugar, mucho mas cuando en el capítulo LV se dan las fórmulas de los preparados oficinales que ántes se indicaban en el libro ; pero de los cuales no se daba una idea completa, como se da en la presente edicion.

## TERAPÉUTICA DE LA ULCERA SIFILITICA DEL CUELLO DEL UTERO.

En el Capítulo XVIII de esta obra al tratar de la úlcera sifilítica del cuello del útero se indica en el tratamiento, entre otros remedios, la *pomada mercurial*, que es no solamente inútil, sino nociva. La cau-



terizacion es el remedio por excelencia y como locion las siguientes me han producido resultados muy satisfactorios.

## LOCION FAGEDÉNICA.

- ℞ Solucion de ácido fénico,  $\frac{2}{100}$  (que contenga 2 por ciento del ácido) . . . . . gramos, 120  
 Solucion (ácida) de muriato de hierro (F. Americana) gramos, 5  
 M. Un líquido violáceo claro.

## LOCION FAGEDÉNICA OPIADA.

- ℞ Solucion de ácido fénico,  $\frac{3}{100}$  . . . . . gramos, 100  
 Tintura de opio, . . . . . gramos, 15  
 Solucion de muriato de hierro, . . . . . gramos, 10  
 M. Un líquido violáceo turbio.

## APLICACION.

- ℞ Protoioduro de mercurio, (amarillo) . . . . . gramos, 2  
 Sulfato de morfina, . . . . . centigramos, 10  
 Tritúrese en un mortero con unas diez gotas de glicerina y añádase:  
 Bálsamo del Perú, . . . . . gramos, 8  
 Se incorpora en el mortero.

Este medicamento semi-líquido, es mi fórmula predilecta y lo uso al mismo tiempo que una de las dos lociones anteriores, tanto en la úlcera como en el chancro: hago que se lave bien la parte y se loicione durante algunos minutos con uno de los líquidos, y despues por medio de un pincel se aplica el tópic. Esta operacion se repite de dos á tres veces por día. Los síntomas secundarios se combaten con los recursos comunes. Como polvo, en caso de emplear alguno, he aquí mi preparacion:

- ℞ Calomel, . . . . . gramos, 10  
 Azúcar, en polvo muy fino, . . . . . gramos, 4  
 Opio en polvo, . . . . . gramos, 1  
 M.

## TERAPÉUTICA DE LA DISMENORREA, LA MENORRAGIA, LA METRORRAGIA Y LA AMENORREA.

- ℞ Hidrato de cloral, . . . . . gramos, 10  
 Bromuro de potasio, . . . . . gramos, 8  
 Tintura de cáñamo indiano, . . . . . gramos, 4  
 Agua, . . . . . gramos, 30  
 Jarabe de azahar, . . . . . gramos, 60  
 Conac, . . . . . gramos, 30

Es una fórmula no solamente bien ejecutada, sino eficaz y fácil de ser administrada. En los casos de dismenorrea, cuando el médico ne-

cesita calmar los dolores sin atender á la causa del mal: una cucharadita en un poco de agua cada hora, ó cada dos horas, hasta abatir el dolor. Al mismo tiempo se deben aplicar los recursos ordinarios ó de costumbre en estos casos, y además son muy beneficiosos los siguientes

## SUPOSITORIOS:

- ℞ Extracto de belladona, . . . . . } á á gramos, 1  
 " " cáñamo indiano, . . . . . }  
 " " opio, . . . . . decigramos, 6  
 Asafétida en polvo finísimo, . . . . . gramos, 3  
 Aceite esencial de enebro, . . . . . gotas, 8  
 Manteca de cacao, . . . . . q. s.

Para ahormar diez ó doce supositorios, é introducir desde uno hasta tres al dia en el recto.

- ℞ Tintura de cáñamo indiano, . . . . . gramos, 10  
 Eter sulfúrico, . . . . . gramos, 10  
 Espíritu alcanforado, . . . . . gramos, 10  
 M.

Ocho gotas en agua fria repetidas con alguna frecuencia, producen los resultados favorables en la menorragia y en la metrorragia; es una forma relativamente nueva, pero de una eficacia incontestable.

- ℞ Persulfato de hierro, . . . . . gramos, 5  
 Glicerina, . . . . . gramos, 10  
 Agua, . . . . . gramos, 15

Para saturar los tapones de algodón. Con la adición de la glicerina se puede aún aumentar la cantidad del persulfato férrico, sin temor de que se destruya la mucosa vaginal.

- ℞ Percloruro de hierro, . . . . . (normal) gramos, 10  
 Glicerina, . . . . . gramos, 20  
 Agua, . . . . . gramos, 30

Tambien para saturar los tapones de algodón. Es preciso no confundir las soluciones de percloruro de hierro, y cuidarse de especificar la normal ó de Pravaz, en estos casos; la ácida produciria accidentes funestos.

Actualmente se emplea con mucha frecuencia el extracto fluido de cornezuelo de centeno al interior y al exterior. En el primer caso es preferible, y se debe asociar, el cáñamo indiano.

- ℞ Tintura de muriato de hierro, . . . . . gramos, 15  
 Glicerina pura, . . . . . gramos, 45  
 Tintura de nuez vómica, . . . . . gramos, 4  
 Agua, . . . . . gramos, 60  
 M.