

CAPITULO XII

TIPOS NEGRO, CAFRE, HOTENTOTE.—TIPOS PAPÚ, NEGRITO, TASMANIANO.—TIPO AUSTRALIANO.—CONCLUSION
SOBRE LAS RAZAS HUMANAS

El tipo negro se encuentra en algunos puntos aislados del Asia meridional, en Oceanía, donde reviste dos formas, el papú y el negrito, y en Africa, su tierra clásica, donde abraza dos grupos principales, los cafres al Sureste, y los etíopes negros ó guineos al Noroeste. Fijémonos especialmente en su tipo africano.

El límite septentrional de las tribus negras mas ó menos homogéneas, parte del rio Senegal, se inclina hácia el Este



Fig. 64.—Americano del centro

hasta el décimo grado de latitud Norte (Maury) y se pierde en la region visitada por Speke y Baker, donde habitan algunas tribus, cuyo parentesco está todavía mal determinado. Encima de esta línea, en el desierto, se encuentra, sin embargo, una tribu negra aislada, los tebous ó tibbonous. En sus confines se suceden en continuas capas bien que desfiguradas aquí y allí por los foulahs, los negros indígenas del Adamawa, del Massina, del Haoussa, del Burnou, del Barghimi y del Darfour, los noubas del Kordofan, los chillouks, fungi y schangallas, próximos á la Abisinia y los nonairs, bari y seré del Bahr-el-Ghazal.

Su límite occidental está formado por el Océano y sus principales tribus se extienden desde el Senegal al Benguela y están como empujadas hácia la costa y son: los yoloffs, serees y mandingas de la Senegambia; los feloupes de Sierra Leona; los kroumanes de la Liberia; los fantis, acras y asantis de la Costa de Oro; los mahis y dahomey del golfo de Benin; los ibos, makos y calebar de la desembocadura del Niger; los bouldous, bakalais y m'pongwe del Gabon, etc. Detrás de ellos se agrupan otras tribus, cuyo tipo mejora sucesivamente y cuya tez se aclara un poco ó se mezcla con un color rojizo.

Los peuls de Senegambia, los bambaras del alto Niger y algunas tribus de los faus ó pohoninos del Gabon, pertenecen á ese número.

La siguiente descripción concierne especialmente al subtipo guineo, considerado como tipo negro general (figs. 69 y 70).

La piel del negro es aterciopelada, fresca, brillante y varía desde el negro rojizo, al amarillento, azulado y negro de azabache. Sus cabellos y sus ojos son negros, su esclerótica empañada ó amarillenta; y en su lengua, en el velo del paladar y aun en la conjuntiva, se observan ciertas manchas. Las partes genitales son mas oscuras, y la palma de la mano y la planta del pié mas claras: tienen muy poca barba y aun les sale tarde: el cuerpo está desprovisto de pelo excepto en el púbis y en los sobacos. Su cráneo es dolicocefalo (cerca de 73,0 en la costa occidental de Africa), pero ostenta algunas excepciones de mesocefalia y sub-braquicefalia: su capacidad, en 85 negros cubitados por M. Broca, era de 1372 centímetros cúbicos, ó sea 151 centímetros menos que entre los auverneses. Su *norma verticalis* presenta una forma elíptica: la porción sub-iniaca de su occipital es á menudo saliente; sus partes laterales son achatadas y verticales, y las líneas curvas temporales describen un extenso arco proporcionado á la masa de los músculos temporales que se ingieren en la parte inferior. El frontal se articula á menudo con el temporal, no articulándose por consiguiente las grandes alas del esfenoides con el parietal: las suturas craneales son mas sencillas que en el tipo blanco y se borran con mas facilidad (Gratiolet): su frente es estrecha en su base, unas veces saliente y poco elevada y otras recta y bombada en su parte superior: las protuberancias frontales son á menudo confluentes ó están reemplazadas por una única protuberancia media. Los arcos superciliares son poco salientes y lisos, lo cual marca una importante diferencia con el negro melanesio, de modo que bajo ese punto de vista los dos sexos tienden á parecerse. De ello resulta que las órbitas son menos profundas, lo cual, unido á cierta hendidura en la raíz de la nariz y á un rostró menos chocante, contribuye á dar al negro de Africa un aspecto menos feroz que el del negro de la Oceanía.

Los globos oculares están á flor de la cabeza y las hendiduras palpebrales, que son pequeñas, se encuentran en una misma línea horizontal. El intervalo de los ojos es menos achatado y menos ancho que en el tipo mogol, pero lo es mas que en el tipo europeo. La nariz se desarrolla en anchura perdiendo otro tanto en longitud: su base, gruesa y aplastada, á consecuencia de la blandura de sus cartilagos, se extiende en dos alas divergentes, con ventanas nasales elípticas mas ó menos descubiertas. Esa extremidad es á veces trilobada: el esqueleto nasal es platirino (54,78), y sus dos huesos propios están á veces soldados como entre los monos. El borde inferior de su abertura anterior está borrado ó reemplazado por una especie de plataforma, de modo que el límite entre



RAZA NEGRA.—NEGROS DE GUINEA EN CUBA

El tipo de los negros de Guinea, de las barbas del alto Níger y al
del alto Volta, de las montañas de Guinea y de las montañas del Gabón, pertenecen
al tipo de los negros de Guinea, especialmente al tipo de los negros de Guinea
que se encuentran en el África Occidental y en el África Central.



El tipo de los negros de Guinea, de las barbas del alto Níger y al
del alto Volta, de las montañas de Guinea y de las montañas del Gabón, pertenecen
al tipo de los negros de Guinea, especialmente al tipo de los negros de Guinea
que se encuentran en el África Occidental y en el África Central.



RAZA NEGRA. -- NEGROS DE GUINEA EN CUBA