

para evitar la acometida de su enemigo. Si la serpiente se enrosca, el gato permanece largo tiempo sin atacarla; pero da vueltas á su alrededor hasta que el reptil se cansa de mover la cabeza en todas direcciones para seguir los movimientos de su adversario. En aquel momento, el gato le aplica otra manotada, saltando con rapidez de lado, y si la serpiente trata de huir, la coge por la cola como para jugar con ella. Procediendo así, y por una serie de golpes repetidos, llegan los gatos comunmente á matar estos reptiles en menos de una hora; pero nunca tocan la carne.»

En varios puntos, por ejemplo en Bélgica y en la Selva Negra, se cria el gato principalmente por su piel. Los labradores de la Selva Negra tienen, segun Weinland, con preferencia gatos negros ó de un solo color gris (gatos azules); los matan en invierno y venden á buen precio las pieles á comerciantes ambulantes. Se dice que en Bélgica los criados al entrar á servir en una casa, imponen la condicion de poder tener un número de gatos con el mismo fin. Las pieles son muy buscadas, sobre todo por los habitantes del mediodía. Hasta la carne se come y, segun se dice, es muy buena. «El asado de gato, refiere mi querido amigo Geoffroy de Saint-Hilaire, hablando de una comida durante el sitio de Paris, era muy delicado. Esta carne es blanca, tiene un aspecto muy agradable, al mismo tiempo es tierna y su gusto recuerda en algo la carne fiambre de ternera.» Por consiguiente el gato es útil tambien en este concepto.

Yo creo tener razon, despues de todo lo expuesto, al abogar en favor del animal, tantas veces tratado injustamente. «El que tiene un gato, dice Lenz, que araña y muerde á los niños, rompe vasos y ollas, roba salchichones, manteca y carne, degüella los pollitos y otras avecillas y no coge nunca un raton, hace muy bien en matarle á golpes, á tiros, ó en ahogarle cuanto antes. Pero cuando posee un gatito, que es el favorito de los niños, no hace daño en la casa, y caza ratones de día y de noche, tendrá mucha razon en tratar y cuidar este animal como á un amigo.»

ENFERMEDADES.—De todas las que pueden aquejar á los gatos, la mas comun y peligrosa es la sarna, que les ataca con violencia y suele ser muchas veces mortal. Segun Lenz, se les cura con flor de azufre, con la cual se espolvorea una tostada con manteca, cortándola luego en pequeños pedazos que debe comer el animal. Parece que tambien es muy bueno dar á los gatos sanos, cuando menos, una vez en su vida, y como medio preservativo, una rebanada con azufre.

Pocas veces molestan á estos animales los parásitos y mucho menos las lombrices: se les libra de estas últimas haciéndoles comer granos de bayas de agavanzo, ó bien dándoles á beber un cocimiento de hojas de kouso.

El gato tiene pocas variedades. En Alemania hay comunmente individuos de los siguientes colores. Negros con una estrella blanca en medio del pecho; blancos del todo; amarillo pálido ó rojo de zorra; el mismo color mas oscuro con fajas atigradas, azul gris; gris claro con fajas oscuras y tricolores con grandes manchas blancas, amarillas, amarillo pardas, negras ó grises. Los de color gris con tinte de azul son muy raros, los de gris claro ó gatos de Chipre muy comunes; pero los verdaderos deben tener las prominencias carnosas de los piés, negras, y las plantas de las patas posteriores tambien negras. Los gatos mas bonitos, ó gatos cebras, tienen dibujos grises oscuros ó pardo oscuros como los tigres. Es notable que casi todos los gatos tricolores que en varios puntos se consideran como brujas por lo cual se les mata, sean hembras. Por lo demás ningun color es constante, y de un solo parto puede haber tantos colores, cuantos gatitos nacen; por eso la zoología da poco valor al colorido.

EL GATO DE ANGORA—FELIS MANICULATA DOMESTICA ANGORENSIS

CARACTÉRES.—Como tipo de raza, en el verdadero sentido de la palabra, se considera comunmente el *gato de Angora* (fig. 148), uno de los gatos mas hermosos que se conocen, notable por su tamaño y su largo pelaje sedoso de color blanco, amarillento, gris ó tambien mezclado, con los labios y plantas de color de carne.

Ya hemos dicho que Pallas parece inclinarse á considerar al manul como estirpe del gato de Angora, si bien este se distingue esencialmente en sus formas. Fitzinger, el cual es de la opinion de Pallas, lo menciona como mezcla entre el manul y el gato doméstico, sin apoyar su opinion en nada. Yo creo muy bien que este animal es una raza montañesa, criada en domesticidad, que se ha formado poco á poco, á consecuencia de influencias climáticas, trasmitiendo sus caracteres de generacion en generacion. Radde vió en el sur de la Siberia únicamente hermosos gatos de Angora de color gris ó gris azul. Los primeros los encontró ya en la villa de Tjumen un poco al este de la vertiente oriental del Ural, vió otros en las colonias rusas; pero dichos animales eran tambien allí mas raros que el gato comun. Prescindiendo de si este gato tiene su origen efectivamente en Angora, afirmaré que no tenemos ninguna noticia, al menos que yo sepa, sobre su verdadera patria.

En comparacion con el gato doméstico comun, el de Angora pasa por perezoso, pero es tambien muy inteligente y afable; no sé hasta qué punto es esto verídico.

EL GATO DE MAN—FELIS MANICULATA DOMESTICA ECAUDATA

CARACTÉRES.—De la isla de Man viene otra variedad—no se puede decir raza—del gato doméstico, el *gato rabon ó de Man* (fig. 149), animal no muy bonito á causa de sus altas piernas, demasiado desarrolladas por detrás y de la falta de cola; su color es variado.

Puede que Fitzinger tenga razon cuando supone que la falta de cola es consecuencia de una mutilacion artificial, que se ha trasmitido y desarrollado como carácter especial. No podemos considerar esta falta de cola como natural, porque el primer apareamiento de este gato con el gato doméstico comun produce crias con cola. Weinland y Schmidt refieren, con respecto á una gata rabona del jardin zoológico de Francfort, que habiéndose apareado con un gato comun de cola, dió á luz gatitos, de los cuales unos tenian las piernas largas y carecian de cola como la madre, mientras que otros se parecian al padre. De otro parto nacieron tres pequeños con cola larga, uno con cola mediana y dos rabones; de otro, tres con cola larga y uno rabon, y de un tercero, tres con cola larga.

«El antiguo aserto segun el cual la hembra corta con los dientes la cola á sus hijuelos, dice Schmidt, no ha sido confirmado despues de una observacion detenida. En las islas de la Sonda y en el Japon, Martens vió gatos con las colas de diversos tamaños, y Kessel contó á Weinland que, especialmente en Sumatra, los gatos sufren una atrofia de la cola poco despues del nacimiento á cuyo fenómeno se debe que, antes de llegar á ser adultos, se desprende aquel apéndice. Por consiguiente, no se debe extrañar demasiado la falta de cola en el gato.

»Refiere el último autor citado, que el gato de Man es incansable trepador; que puede dar grandes saltos de una rama á otra, gracias á la longitud de las patas posteriores, y que de consiguiente es mucho mas peligroso para los pájaros que

el gato doméstico de casta comun. Por eso no debemos desear de modo alguno la introduccion en Alemania de este gato sin cola.»

El gato de Angora y el de Man son las razas mas conocidas. Además, se habla tambien del gato cartujo, que se distingue por el pelaje largo, suave, casi lanudo y de color uniformemente azul gris intenso, que vive en Persia. Menos conocidos son: el gato *cumano* del Cáucaso, el *gato rojo de Tobolsk* en Siberia, los *gatos rojo y azul* del Cabo de Buena Esperanza, y el *gato chino*, que tiene el pelaje largo, fino y sedoso y las orejas colgantes como un perro zarcero: esta especie sirve de alimento á los indígenas despues de haberles cebado bien, como dije antes, es la misma que constituye una mercancia en las transacciones con los quiliacos, etc. Está en lo posible que algunas de estas últimas variedades no sean mas que productos degenerados de cruzamientos de diversas especies. Es sabido que el gato doméstico se apareaba bastante fácilmente con los individuos de otras razas.

Naturalistas ilustres dan como cierto que se apareaba con la *garduña*, engendrando cachorros que, segun dicen, tienen una chocante semejanza con esta en color y pelaje.

LOS GATOS-GARDUÑAS—VIVER-RICEPS

Segun opina Gray, hay en la India un esbelto gato que constituye un género separado, cuyo nombre *Viverriceps* se puede traducir por *gato-garduña*, aunque no comprendamos por la voz «Viverra» las garduñas, sino las civetas.

CARACTÉRES.—En conjunto, la cabeza prolongada, las orejas redondas, desprovistas de pincel, la pupila linear del ojo, la cola mediana y puntiaguda y algunas particularidades poco importantes del cráneo, son los caracteres anatómicos del grupo, que sin vacilar podemos incluir en el de los gatos propiamente dichos, porque las diferencias que existen entre él y el gato tipo, no parecen de modo alguno mayores que en otras especies de esta familia, cuyos individuos son tan semejantes.

EL GATO MOTEADO Ó WAGATI—FELIS VIVERRINA

CARACTERES.—Este gato, llamado *tarai* por los indios, y por los naturalistas *Felis viverrina*, *F. viverriceps*, *bengalensis*, *himalayana* y *celidogaster*, *viverriceps viverrina*, apenas llega al tamaño de nuestro gato salvaje; su cuerpo tiene cerca de un metro de largo, contando la cola, cuya longitud es de 0^m,20 á 0^m,22. Comparado con el último citado, obsérvase que es de constitucion mas débil y mucho mas bajo; la cabeza es mas pequeña, y en conjunto mas esbelto. El color principal y predominante es un gris amarillento difícil de definir, que ora tira á gris, ora á pardo, segun los matices de los pelos que son de color gris subido en la base, amarillentos en el centro y pardos ó negros en la punta. Por la frente corren dos fajas laterales formadas por manchas confluentes, y tres longitudinales que pasando por en medio de las otras, terminan en el cuello en forma de máculas ovaladas; en las mejillas, que son blanquizas, como tambien el labio superior, la garganta, lado inferior y el pecho, se ven dos fajas laterales no interrumpidas. Toda la parte superior de los costados, los brazos y muslos, tienen manchas ovaladas, de color pardo subido, y hasta pardo negro; las piernas ofrecen fajas transversales, tambien maculadas; y la cola tiene ocho ó nueve anillos, que cesan inferiormente en la mayor parte de los individuos. Los ojos son de color amarillo bronceado,

las orejas negras por fuera, excepto una mancha blanquizca en forma de huevo, y blanquizas interiormente. La gran variedad de matices en el color principal y lo caprichoso de los dibujos, han inducido á describir algunas variedades de este gato como otras tantas especies.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Recientes investigaciones han demostrado que el *wagati* habita un vasto territorio; la esfera en que se halla propagado comprende toda la India inglesa, con Ceilan, Nepal, Burma, Malacca y llega hasta la isla Formosa. En Tenasserim es comun, y asaz abundante en otros países; solamente escasea, segun Swinhoe, en la Formosa, porque allí se le persigue mucho.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—No tenemos noticias exactas sobre su vida en libertad; pero parece que esta no difiere mucho de la de otros gatos salvajes. Unos de ellos enjaulados en el jardin zoológico de Lóndres, eran tímidos, taciturnos, y tan difíciles de mantener como otras especies salvajes, de las cuales les distingue, en desprestigio suyo por cierto, una traspiracion algo fétida, que molesta mucho á los guardianes. En la Formosa se aprovecha el magnífico y suave pelaje del *tarai* para cuellos y mangas, y es bastante caro, pagándose á razon de 5 á 6 francos. Por eso se persigue á este animal constantemente, exterminándole poco á poco, sobre todo en las regiones cultivadas; las selvas, empero, le servirán de refugio aun mucho tiempo, del propio modo que al gato salvaje nuestros bosques.

LOS SERVALES—SERVAL

CARACTÉRES.—Mas bien que el *tarai*, podria considerarse el *serval* como tipo de un género especial y así se ha hecho muchas veces; pero al fin se le ha vuelto á reunir siempre con los otros gatos. Por su forma y costumbres sirve de tránsito entre el gato y el lince. Toda su configuracion es raquítica; tiene piernas largas y cabeza un poco aplanada por los lados; á causa de ser las orejas muy grandes, anchas en la base y redondas en forma de huevo en la punta, el animal parece mas alto; la cola es de mediana longitud, de modo que llega, á lo mas, hasta el talon; el ojo es pequeño y oblicuo, con la pupila de forma ovalada; y el pelaje bastante largo, espeso y recio.

EL SERVAL PROPIAMENTE DICHO—FELIS SERVAL

CARACTÉRES.—El *serval* (fig. 150), gato silvestre de los colonos del Cabo, *tshui* de los suahelis (*Felis capensis* y *galeopardus*, *Serval galeopardus*, *Chaus servalina*) tiene una altura de 0^m,50 hasta la cruz, y una longitud total de 1^m,35, de los cuales la cola figura por 0^m,30 á 0^m,35; su color, en general, es amarillo leonado claro, con manchas, ya mas claras ó mas oscuras; la extremidad y el surco de la nariz son negros, el borde inferior y una estrecha faja corta entre los ojos y la nariz, de un amarillo pálido; una mancha blanca longitudinal se corre desde el ángulo interno del ojo hasta la mejilla; las orejas son leonadas en la base y negras en lo restante con una mancha central en sentido de su longitud. De la parte superior de cada ojo parte una línea formada por pequeñas manchas redondas, la cual recorre la frente y la coronilla, continuando ensanchada hasta la nuca, donde las manchas comienzan á ser mas grandes y menos densas; en medio de estas, hay dos líneas mas estrechas que tambien se trasforman en manchas, pasando despues sobre el lomo en direccion oblicua. En las mejillas escasean las manchas puntadas; en los costados hay otras líneas de manchas; las de