

que estos se precipitaron al momento en tumulto fuera del templo.

Segun Azara, los europeos establecidos en América pretenden tambien que el mejor remedio para el dolor de costado es tomar una pequeña cantidad de hígado de mofeta, secado á la sombra y reducido á polvo. Creen asimismo que este polvo, mezclado con vino ó caldo, es el mejor sudorífico que se conoce.

### LAS ZORRILLAS — RHABDOGALE

**CARACTÉRES.**—El representante del surillo en la fauna del Africa es la *zorrilla ó veso rayado*, como le llama Brehm; es un animal muy afine del anterior, tanto por la forma como por su aspecto general, solo que por su dentadura, que consiste



Fig. 292.—LA ZORRILLA

*Viverra y Zorrilla striata, Zorrilla capensis y leucomelas, Ictonyx capensis, etc.*) La longitud del cuerpo, oblongo aunque no muy esbelto, es de 0<sup>m</sup>,35 y la cola de 0<sup>m</sup>,25. Tiene la cabeza ancha, hocico prolongado á manera de trompa, orejas cortas y redondas, ojos medianamente grandes, con pupila oblonga; piernas cortas, patas anteriores con fuertes uñas, bastante largas pero embotadas; cola larga y poblada, y todo el pelaje espeso y largo. El color predominante es negro lustroso, con diferentes manchas y listas blancas variables. Entre los ojos hay una mancha blanca y estrecha, y otra pasa desde los ojos á las orejas; á veces se reúnen y forman entonces en la frente una sola faja, terminada en punta hácia el hocico. Los labios tienen frecuentemente el borde blanco. El dibujo de la parte superior del cuerpo es muy variado, aunque se observa siempre cierta regularidad: algunos individuos presentan una faja trasversal, ancha y blanca que pasa por el occipucio y de la cual arrancan cuatro listas longitudinales separadas por otros tres espacios negros que, recorriendo el lomo, se ensanchan en medio del cuerpo. En el nacimiento de la cola se reúnen las dos listas blancas exteriores y sepáranse despues en ambos lados de aquella. Otras tienen toda la cabeza, la nuca y hasta una parte del lomo blancos, naciendo solo en la cruz tres listas oscuras que continúan en los lados de la cola; esta última puede presentar manchas ó listas longitudinales.

**DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.**—La zorrilla variada

en 34 dientes, se asemeja mas á las martas que á las mofetas, y tiene las plantas cubiertas de pelo. El tubérculo interior del diente carnívero es oblongo y saliente. Las raíces de las puntas cónicas y bajas de los falsos molares se distinguen por su volúmen. En cuanto á la estructura del esqueleto, resulta que las zorrillas representan el tránsito entre las martas y las mofetas, y por su género de vida se parecen mas á las primeras.

### LA ZORRILLA—RHABDOGALE MUSTELINA

**CARACTÉRES.**—La única especie del género que ha podido determinarse con seguridad es la *zorrilla*, el «perro ratonero» de los colonos del Cabo de Buena Esperanza (*Rhabdogale mustelina, Viverra, Mustela y Putorius Zorrilla*,

se encuentra en toda el Africa, y tambien se ha extendido por el Istmo de Suez, en el Asia Menor. Se la ha visto igualmente hasta cerca de Constantinopla, en la orilla asiática del Bósforo.

**USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.**—Habita con preferencia en los terrenos pedregosos y vive en las cavernas ó en madrigueras, que construye ella misma en los bosques ó en los matorrales.

Como es un animal nocturno, rara vez se ha tenido oportunidad de observarle en su estado natural. Durante mi permanencia en Africa, he oido hablar á menudo del *Padre de la pestilencia*, pero nunca le he visto. Todo cuanto me han dicho de él concuerda perfectamente con la descripción de Kolbe, el primero que ha descrito este animal.

La zorrilla se alimenta de mamíferos pequeños, especialmente de ratones, de pajarillos, huevos de reptiles é insectos. Con frecuencia se desliza en las granjas y ocasiona grandes destrozos en los corrales.

Sus movimientos no se parecen á los de las martas; es menos ágil y anda con tanta lentitud como las mofetas; no trepa y tiene miedo al agua, aunque sabe nadar muy bien. El producto de sus glándulas anales es tambien para ella un arma defensiva. «Si se encuentra en un campo ó en una pradera, dice Kolbe, y si la persigue un perro ú otro animal, inunda á su perseguidor con un líquido tan infecto, que le obliga á detenerse para frotarse el hocico contra la tierra ó contra un

árbol. Cuando su adversario vuelve á la carga, contesta con una nueva emision, consistiendo en esto toda su defensa. Si el cazador coge una zorrilla muerta con la mano, se le comunica un olor tan penetrante, que no puede quitárselo ni aun lavándose con jabon. Por esto mismo le abandona el hombre cuando le ha matado: el que una vez percibe semejante hedor se aleja presuroso de este animal, guardándose muy bien de molestarle.»

Los machos de esta especie, y los de las mofetas, son los que tienen la sustancia mas infecta, particularmente en el periodo del celo. Acaso sea agradable para la hembra este olor que nos repugna tanto.

Nada se sabe acerca de la reproduccion de la zorrilla.

**CAUTIVIDAD.**—Hay en el cabo de Buena Esperanza algunos colonos holandeses que domestican las zorrillas y las tienen en sus casas para cazar las ratas y ratones; pero nunca se amansan mucho, y son siempre insensibles á las caricias y buenos tratamientos. La multitud de nombres que la zorrilla tiene designan en todos los respectivos idiomas su calidad de pestífera.

### LOS TEJONES—MELINA

**CARACTÉRES.**—En honor de nuestro tejon damos al



Fig. 293.—EL RATEL DEL CABO

último grupo ó sub-familia de los mustélidos el nombre de *tejones (Melina)*, reuniendo en la misma los animales mas rechonchos y torpes de toda la familia; representan en cierto modo las especies de tránsito entre los mustélidos y los ursídeos, entre las martas y los osos.

Sus caracteres consisten en tener la cabeza pequeña, ancha por detrás y prolongada hácia el hocico como en forma de trompa; ojos pequeños y hundidos; orejas oblongas, mas ó menos cortas; cuello grueso; piés cortos, de planta pelada, con cinco dedos cortos provistos de uñas propias para escarbar, bastante largas; la cola es mas corta que la cabeza, y el pelaje corto y basto, de color negro en el fondo y en la parte inferior, y gris en las extremidades. El sistema dentario consiste en 32 ó 38 dientes, distribuidos regularmente como sigue: seis incisivos y un colmillo en ambas mandíbulas; tres falsos molares, de los cuales puede faltar uno en cada cual de aquellas, y hasta dos en la superior; además hay dos molares superiores é inferiores. El cráneo y demás partes del esqueleto son relativamente sólidos, como corresponde al aspecto del animal. Tambien tienen los tejones su bolsa

glandular al lado del ano, que en algunas especies segrega una sustancia pestilente.

### LOS RATELES—MELLIVORA

**CARACTERES.**—El primer género está representado por los *rateles* ó tejones melívoros (*Mellivora*), que son las especies de la familia que tienen el lomo mas ancho y el hocico y la cola mas largos; difieren de las demás por su dentadura de 32 dientes, distribuidos en la proporcion indicada de incisivos, caninos, con solo tres falsos molares y un molar en cada mandíbula, cuyo diente, de tubérculo superior, es trasversal á manera de liston, faltando del todo el inferior. El cuerpo es mas informe que el de nuestro tejon y de sus congéneres mas afines, y hasta parece algo comprimido en sentido vertical; el lomo es ancho y aplanado; el hocico largo; las conchas de las orejas, muy pequeñas, sobresalen poco del pelaje; los ojos son pequeños y hundidos; las piernas cortas y robustas, y los dedos están provistos de uñas largas propias para escarbar.