

embotados, se inclinan hácia delante; el cráneo es completamente huesoso; el arco cigomático tiene la forma de un bastoncillo; la columna vertebral se compone de 13 vértebras cervicales que llevan costillas, de 6 que no tienen ninguna, de 5 sacras y 27 coxígeas.

CARACTERES.— Su cuerpo es mas recogido que el de las demás musarañas, su cuello muy corto, tan grueso como el resto del cuerpo; las patas, en extremo pequeñas, tienen cinco dedos reunidos por una membrana palmar; las piernas posteriores son mas largas que las anteriores; su prolongada cola, redondeada en la base, y que se ensancha en la punta en forma de remo, es anillada, escamosa y con poco pelo; carece de orejas externas, y los ojos son muy pequeños. La parte mas curiosa de todo el animal es la nariz, que representa una verdadera trompa, formada por dos conductos estrechos y cartilaginosos, soldados entre sí; estos se mueven por medio de cinco músculos, dos grandes y tres mas pequeños, de los cuales se sirve el animal para diversos usos, principalmente como órgano del tacto. La trompa reemplaza, al parecer, á todos los demás órganos de los sentidos. Los labios son blandos y carnosos: bajo la raíz de la cola hay una glándula almizclera, compuesta de veinte á cuarenta lóbulos, cada uno de los cuales tiene la parte superior ensanchada y la inferior encogida, conteniendo en sus paredes un gran número de celdillas glandulares. El producto segregado por dicha glándula exhala un olor muy fuerte y sirve para aletargar ó entorpecer á los animales de que se alimenta el desman.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Solo se conocen dos especies de este género, pertenecientes ambas á la Europa meridional.

EL DESMAN DE LOS PIRINEOS—MYOGALE PYRENAICA

CARACTERES.— El desman de los Pirineos (fig. 11) conocido en España con el nombre de *almizclero*, mide 0",27 de largo, de los cuales corresponde una mitad á la cola, poco mas ó menos. Tiene el pelo de color pardo castaño en el lomo, gris pardo en los costados, y gris plata en la parte inferior del vientre. Los labios superiores se hallan provistos de un mostacho pectíneo; los lados de la trompa cubiertos de pelos blancos; en las piernas delanteras es el pelaje pardo; las posteriores están desnudas y escamosas, y la cola tiene un tinte pardo oscuro con pelos blancos.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Se ha creído durante mucho tiempo que esta especie no existía sino en los Pirineos. Don Mariano de la Paz Graells, director del Museo de Madrid, la encontró últimamente en la sierra de Gredos, siendo por lo tanto probable que se halle extendida por todo el norte de España.

EL DESMAN ALMIZCLADO—MYOGALE MOSCHATA

CARACTERES.— El desman ó *wychuchol*, musaraña *almizclada* de Rusia, se distingue de la especie anterior por su talla, mayor que la del hamster. El cuerpo mide 0",25 de largo, la cola 0",19, y la altura es de 0",04. Pesa de 500 á 750 gramos: el pelaje se compone de un bozo muy suave y de pelos sedosos y lisos; su color es pardo rojo en el lomo y gris ceniciento en el vientre, con reflejos plateados. Las piernas están desnudas y escamosas en su cara superior, aureoladas en la inferior, y orilladas de pelos natatorios; la cola, muy estrecha en su raíz, es luego cilíndrica, y comprimida en su mitad terminal, escamosa y guarnecida de pequeños folículos (fig. 12), que segregan una especie de materia sebácea.

Los ojos son pequeños y tienen por encima, lo mismo que el conducto auditivo, una mancha blanca; la abertura del conducto externo está oculta por el pelo; una válvula interna abre ó cierra las fosas nasales.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— El desman almizclado habita en el sudeste de Europa, y principalmente en las aguas del Don y del Volga. En Asia, solo se encuentra en la Bukaria, y allí donde existe, es muy abundante.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Sus costumbres se asemejan á las de la nutria; vive tan pronto en tierra como en el líquido elemento; las aguas estancadas ó de curso lento, con orillas escarpadas, donde pueda construir su madriguera fácilmente, son los lugares que elige con preferencia. Sus guaridas se asemejan á las de la nutria: hácia arriba se dirige oblicuamente una galería que comunica por abajo con el nivel del río; su longitud es de seis metros, ó mas, y desemboca en un espacio cerrado, que se halla á cosa de metro y medio sobre la superficie del agua, siempre fuera del alcance de las mayores avenidas. No existe galería de ventilación; pero es un error creer que el desman, segun se ha dicho, muere asfixiado en su madriguera en invierno por la falta de dicho conducto. Es de presumir que cuando le falta el aire, se sumerge y sale á respirar por otra abertura, practicada en el hielo.

Nadador y buzo por excelencia, el desman almizclado pasa la mayor parte de su vida en el agua; solo cuando las inundaciones le ahuyentan de su guarida subterránea, aparece sobre la tierra, aunque sin alejarse mucho de su centro predilecto. En él se deslizan sus días y sus noches, sus veranos ó inviernos; aun cuando la superficie del agua se halle cubierta de una capa de hielo, continúa sus cacerías, y no se retira á su madriguera hasta que está cansado y harto de comer. Se alimenta de sanguijuelas, gusanos, moluscos acuáticos y larvas de insectos. Los pescadores dicen que se come las raíces y las hojas del *acorus*; pero es un error, fundado en que el animal acostumbra á cazar en medio de estas plantas.

Es muy ágil, por mas que parezca pesado y torpe: apenas comienza el deshielo, recorre por debajo del agua los cañaverales, gira con la mayor rapidez, busca gusanos con su trompa, y sale de vez en cuando á respirar á la superficie. Cuando hace buen tiempo retoza en el agua y sale á la orilla para calentarse al sol; vuelve y revuelve su trompa, tocando todos los objetos; á veces se la pone en la boca y grita entonces como un ánade. Si se le hostiga ó se le acomete, silba y trata de defenderse mordiendo. Con su trompa coge hábilmente los animales pequeños para llevárselos á la boca; y por esta costumbre le ha sido justamente aplicado el nombre de *musaraña elefante*. Cuando el animal se halla en terreno seco manifiesta mucha inquietud y trata de huir; pero una vez en el agua, todos sus movimientos indican el placer que experimenta.

No se sabe todavía nada acerca de la reproducción del desman almizclado: parece que la hembra pare varias veces al año, y que debe ser bastante considerable el número de sus pequeños atendido á que tiene ocho mamas.

CAZA.— Es fácil coger este animal en la primavera, particularmente en la época del celo, cuando el macho y la hembra retozan. Pasando por el agua una gran red, se sacan siempre algunos; pero es preciso retirarla con prudencia y á menudo, para que los desman cogidos no se ahoguen debajo del agua. Muchas veces se ve que han muerto así en las redes de los pescadores. Durante el otoño se organizan batidas en regla; y como en esta época han llegado ya los pequeños á ser adultos, no deja de ser la caza abundante: en invierno se cogen mas machos que hembras, y en verano sucede lo contrario, sin que se sepa cuál es la causa del hecho.

LOS SOLENODON Ó SOLENODONTES

CARACTERES.— El cuerpo de estos animales es vigoroso; el cuello corto; la cabeza estirada; la parte de la nariz prolongada en forma de larga trompa; los ojos muy pequeños; las orejas redondas y medianamente largas, y la cola de la longitud del cuerpo. Las piernas son algo largas, y los piés anteriores, con cinco dedos, se presentan armados de uñas muy fuertes y encorvadas; los posteriores las tienen mas cortas y menos resistentes. El cuerpo está cubierto de cerdas bastante largas, las cuales se trasforman en pelo mas fino en las piernas; la trompa no ofrece mas que unas pocas, y el dorso y las partes traseras, como tambien la cola, que es escamosa, están casi enteramente desnudos. La fórmula dentaria se compone de cuarenta dientes, dos incisivos, un canino, cuatro falsos molares y tres muelas en cada mandíbula.

EL FACUACHE—SOLENODON CUBANUS

Una variedad del grupo, al cual corresponde este animal, conocido con los nombres de *Almiquí* y *Aedarás*, fué exactamente descrita por Peters.

CARACTERES.— Su cuerpo mide 0",34 de longitud, y 0",19 la cola; la cabeza, los lados del cuello y el vientre son de un amarillo de ocre sucio, y el resto del cuerpo negro; la cola es negra azulada. Debajo de los largos pelos del dorso hay algunos completamente amarillos, otros del todo negros; pero la mayor parte son del primer color citado en la raíz y del segundo en la punta (fig. 13).

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Es animal nocturno, como las verdaderas musarañas; duerme todo el día y emprende sus excursiones por la noche. Es bastante comun en varias montañas; cuando se le caza, oculta la cabeza y permanece tranquilo, de modo que se le puede coger por la cola. En el estado de cautividad no rehusa comer; pero masca difícilmente, y por esto se debe tener cuidado de darle carne picada, á fin de que no se le atragante. Exige mucha limpieza; parece complacerse en el agua y bebe fácilmente; en ciertas posiciones le molesta su trompa.

Su voz es penetrante y variable: tan pronto se asemeja al gruñido del cerdo como al chillido del pájaro; con frecuencia silba como el buho, y cuando se le toca gruñe como el cochinito. Se encoleriza fácilmente, en cuyo caso eriza su pelaje; una gallina ó un pequeño animal que pasen cerca de él, le excitan en el mas alto grado, y trata de cogerlos: desgarrar la presa con sus largas y encorvadas uñas.

De su piel destila de vez en cuando un líquido rojizo, aceitoso y fétido.

CAUTIVIDAD.— El Sr. Corona tuvo algunos de estos mamíferos cautivos, pero murieron todos; los unos por efecto de las heridas que se hicieron mutuamente, y los otros de una singular enfermedad verminosa. Al abrirlos se descubrió entre los músculos y el tejido celular, principalmente en el cuello, una cantidad prodigiosa de gusanos, envueltos en una especie de bolsa blanda.

LOS TAUREC Ó ERIZOS CERDOSOS—CENTETES

CARACTERES.— Los taurec ó erizos cerdosos se distinguen de los solenodon por la falta de cola visible, y de todos los insectívoros por los caninos de la mandíbula infe-

CAUTIVIDAD.— Pallas, el único que ha publicado observaciones sobre el desman cautivo, nos dice que este animal no sobrevive á la pérdida de su libertad. Rara vez se consigue conservar un individuo mas de tres días; pero el citado naturalista cree sea debido á los malos tratamientos que sufre el animal cuando se le coge. Si se vierte agua en su jaula se pone muy contento, se lava la trompa y lo olfatea todo; revuélcase sin cesar, se sostiene de lado sobre las dos patas posteriores, y se peina y se rasca con las otras. La planta de los piés está articulada de una manera notable, de modo que el animal la puede acercar al lomo; la cola es poco móvil y se halla siempre encorvada, á la manera de una hoz. El desman coge con su trompa, como con un dedo, todo cuanto le tiran, y se lo lleva á la boca; parece tan insaciable como los demás animales de su familia. Por la noche descansa: cuando se echa, recoge el cuerpo; pone las piernas delanteras á un lado, colocando la trompa casi debajo de los brazos; y aunque duerma, siempre está agitado y cambia de posición. Al poco tiempo se corrompe el agua puesta en su jaula, á causa de la mezcla de los excrementos con el producto de las secreciones de sus glándulas anales, siendo por lo tanto necesario renovarla á menudo. Aunque se le produguen todos los cuidados necesarios, este pobre animal, arrancado así de su elemento, tarda muy poco en morir.

Si el desman puede agradar por la gracia y viveza de sus movimientos, es en cambio insoportable por el olor almizclado que exhala, olor que infecta toda la habitación donde se encuentra el animal, comunicándose tambien á los carniceros que se lo comen. Este desman no tiene muchos enemigos, ni entre los mamíferos ni entre los pájaros; pero los peces carnívoros, y en particular los sollos, le persiguen activamente y se alimentan de él; por lo mismo no se puede comer la carne de estos animales, á causa del olor que adquiere.

USOS Y PRODUCTOS.— El hombre da caza al desman para obtener su piel, tan parecida á la del castor y del ondra, que Linneo clasificó á este animal entre los roedores, con el nombre de *castor almizclado*. Con la piel, que vale poco mas de cinco céntimos la pieza, se ribetean gorros y vestidos.

LOS ERIZOS CERDOSOS—CENTETINA

Los individuos de la quinta familia de nuestro orden se llaman erizos cerdosos, á causa de una especie de insectívoros parecidos al erizo, que se encuentran en Madagascar.

CARACTERES.— Parécense tan poco entre sí por su aspecto estos animales, como por el número de los dientes. Son de formas estiradas; la cabeza, oblonga, se distingue por una trompa bastante larga; tienen ojos pequeños y orejas medianamente grandes; carecen de cola, ó si la tienen, es larga y desnuda; las piernas son cortas, y los piés, con cinco dedos, están armados de fuertes uñas; su cuerpo está cubierto, parte de pías cerdosas, parte de pelos ásperos y rígidos. El cráneo no tiene arco cigomático; los huesos de la parte inferior del muslo están separados; la columna vertebral está compuesta de siete vértebras cervicales, de catorce á quince que llevan costillas, de cuatro á siete sin ellas, de tres á cinco sacras y de nueve á veintitres coxígeas.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.— Los erizos cerdosos son propios de Madagascar.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.— Apenas es posible decir nada acerca del modo de vivir de los varios individuos de esta familia, pues tan solo hemos podido adquirir algunas noticias un tanto verdicas sobre pocas variedades.

rior relativamente mas pequeños que los otros extraordinariamente grandes, los cuales están alojados en una cavidad de la mandíbula superior. La fórmula dentaria, como la de todos sus congéneres, consta de cuarenta dientes; sin embargo, se notan tan solo tres incisivos y seis molares.

EL TAUREC CERDOSO—CENTETES CETOSUS

CARACTERES.—El taurec (*Centetes ecaudatus*, *erinaeus ecaudatus*, *centetes armatus* y *variegatus*) es la variedad mas conocida del grupo.

Su cuerpo delgado sostiene una cabeza que, muy ancha por detrás, se estrecha hácia adelante, igualando en longitud á la mitad del tronco. Tiene las orejas cortas, redondas y echadas hácia atrás; los ojos pequeños, aunque mayores que los del erizo propiamente dicho; el cuello mas corto y delgado que el cuerpo; las piernas de mediana extension, siendo las posteriores algo mas altas que las delan-



Fig. 11.—EL DESMAN DE LOS PIRINEOS

Los individuos jóvenes son pardos, con fajas longitudinales amarillas que desaparecen con los años.

Describe una variedad que tiene la cara de un color gris de raton, la cabeza rojiza, las piernas rojo amarillas, los pelos anillados y las espinas rojas; pero probablemente será una especie distinta.

El taurec cerdoso adulto mide 0",38 de largo por 0",10 de alto.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—No se ha encontrado el taurec cerdoso sino en Madagascar, aunque últimamente se ha conseguido aclimatarle en la isla Mauricio.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Habita á orillas del agua, cerca de los rios y del mar.

Es un animal desconfiado y temeroso, que se oculta casi todo el día y solo sale de noche, sin alejarse nunca mucho de su escondrijo. Unicamente se le ve en la primavera y en el verano, desde las primeras lluvias hasta el principio de la sequía. Mientras dura esta, período que corresponde al invierno, retirase al fondo de la madriguera que ha formado, y allí duerme desde el mes de junio hasta noviembre. Los indígenas creen que los ruidosos truenos, que anuncian las primeras lluvias, despiertan al taurec de su letárgico sueño.

La primavera es para este animal la época mas feliz del año, porque entonces puede almacenar en su propio cuerpo la grasa que ha de alimentarle durante el invierno. Apenas comienzan las primeras lluvias á reanimar la vida de aquellos países, déjase ver el taurec: anda muy despacio, con la cabeza baja, olfateando por todas partes, en busca de su alimento, que consiste principalmente en insectos, gusanos, ca-

teras; tiene cinco dedos en cada pata; el del medio es un poco mas largo que los otros, y las uñas mas fuertes. Todo su cuerpo se halla cubierto de púas, de sedas y de pelos, que adquieren la forma de aquellas ó indican cuando menos que las primeras resultan de la trasformacion de los últimos. El occipucio, la nuca y los lados del cuello, están cubiertos de verdaderas espinas, algo flexibles, de medio centimetro de largo, las cuales forman en aquel una especie de cresta. En los costados son mas largas, pero mas delgadas y flexibles, y se mezclan además con sedas; estas últimas predominan en el lomo, donde llegan á tener de 0",03 á 0",05 de largo y cubren por lo tanto todo el cuarto trasero. El vientre está cubierto de pelos cortos, así como las patas; un largo mostacho adorna el labio superior; el extremo del hocico está desnudo y tambien las orejas. Las espinas, las cerdas y los pelos, son de un amarillo claro en el extremo y la base, y de un pardo oscuro en el centro, particularmente las del lomo. La cara es parda, las patas amarillas y el mostacho de un pardo oscuro (fig. 14).

racoles y lagartos, los cuales encuentra con mas abundancia en los lugares húmedos. Parece ser muy aficionado al agua; gústale penetrar en los pantanos y revolcarse en el cieno como los cerdos.

A causa de su poca agilidad y su pesadez, cae fácilmente en poder de sus enemigos, contra los cuales no tiene armas. Su única defensa consiste en un olor de almizcle muy desagradable, que exhala de continuo y es muy fuerte cuando se espanta. El mas pesado mamífero puede vencerle, y cae fácilmente y con frecuencia en poder del hombre, quien se alimenta de su carne y de su grasa. Las aves de rapiña son igualmente para el taurec temibles enemigos, y los indígenas le cazan con verdadero entusiasmo, así en verano como durante su sueño invernal.

Segun Pollen, la morada de invierno del taurec está indicada por un pequeño monton de tierra que se levanta sobre aquella; y para perseguirle y hacerle salir de su madriguera suélese emplear perros hábilmente amaestrados. Probablemente no tardaria en extinguirse la especie á causa de tan activa persecucion, si no fuera por su gran fecundidad. En efecto, la hembra da á luz de doce á diez y seis pequeños en cada parto; estos al cabo de algunos meses miden ya 0",07 de largo y se hallan bien pronto en estado de buscar por sí solos el alimento.

«El amor de la madre hácia sus hijos, dice Pollen, es realmente digno de admiracion: los defiende con verdadero furor contra cualquier enemigo y prefiere la muerte misma á dejarlos abandonados.»

CAUTIVIDAD.—El taurec en su encierro se alimenta

de carne cruda, arroz cocido y plátanos. Duerme de día, y de noche está en vela; cuando le dan tierra, la revuelve y registra con su trompa, á la manera del cerdo, revolcándose tambien gustoso sobre ella. Intenta á veces con sus poderosas garras romper los barrotes de la jaula, y no pocas consigue su objeto. Vésele reñir á menudo con otros individuos de su familia y en especial á causa de la pitanza. Por las noticias que tengo, nunca se ha traído vivo este animal á Europa.

USOS Y PRODUCTOS.—Durante la época en que está mas gordo el taurec, vésele, ya vivo, ya muerto, ya preparado y condimentado, en todos los sitios del mercado de la isla, y los montañeses acuden á la ciudad en los días festivos tan solo para hacer provision de su carne, que es, á su decir, sabrosísima.

LOS ERINACEOS — ERINACEI

CARACTERES.—Los animales que forman nuestra sexta familia, tienen caracteres tan marcados, que bastarán muy pocas palabras para darlos á conocer. Un sistema dentario compuesto de 36 dientes y una piel cubierta de espinas son los atributos mas notables de las pocas razas que consideramos como verdaderos miembros de la familia. Su cuerpo es recogido; la cabeza no muy larga, pero con el hocico prolongado en forma de trompa; los ojos bastante grandes; las orejas regularmente desarrolladas; las piernas cortas y gruesas con patas macizas, las cuales tienen todas cinco dedos y alguna vez cuatro, siquiera sea por excepcion; la cola corta; la parte superior del cuerpo está cubierta de púas rígidas y cortas, y la inferior de pelos. Distinguese de los congéneres de su órden precisamente por la dentadura. «En la parte central del ancho hueso de la mandíbula superior y á cada lado de la misma, dice Blasius, se notan tres dientes anteriores de una sola raíz separados por medio de un hueco; siguen luego dos falsos molares de dos raíces y de una sola punta; viene tras estos un diente mas pequeño de dos puntas y tres raíces, seguidamente tres molares con muchas puntas y muchas raíces, y por último, una muela de dos raíces y dos puntas colocada oblicuamente. En la mandíbula inferior siguen á uno y otro lado del gran diente anterior tres molares de una sola punta y de una sola raíz, luego tres muelas de dos raíces y muchas puntas, y finalmente, una muela pequeña de una sola raíz. No se nota la presencia de caninos.»

El cráneo es corto, recogido y del todo huesoso; el arco cigomático está completamente desarrollado. La columna vertebral, además de las vértebras cervicales, tiene quince que llevan costillas, nueve sin ellas, tres sacras y catorce coxígeas. Los huesos de la parte inferior del muslo están entrelazados y confundidos. Entre los músculos merece especial mencion el torax facial, que rodea casi todo el cuerpo del erizo y le permite poder enroscarse.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta familia estuvo ya representada en la época terciaria: las especies que la constituyen se hallan hoy dispersas en Europa, Africa y Asia.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Todos los erináceos frecuentan los lugares secos, ó las orillas de los rios ó del mar, cuando están en país llano. Habitan con preferencia los bosques, las praderas, los campos, los jardines y las estepas; albérganse en matorrales, cercas, troncos de árboles secos, entre raíces, en las grietas de las rocas, en madrigueras abandonadas ó abiertas por ellos mismos; viven solitarios ó apareados, y sus costumbres son del todo nocturnas. Duermen de día, y despertándose despues de ponerse el

sol, van á buscar su alimento, que consiste en frutos, raíces jugosas, semillas, pequeños mamíferos, pájaros, reptiles, insectos, moluscos y gusanos. Es caso raro que acometan á otros animales mayores que ellos, como por ejemplo, á las gallinas y á los lebratos; y algunos observan un régimen exclusivamente animal.

Los erináceos son cachazudos, pesados y perezosos: todos viven en tierra: ninguno salta ni trepa, y al andar apoyan toda la planta del pié.

El olfato es el mas desarrollado de sus sentidos; el oído es fino, pero la vista y el gusto defectuosos; y en cuanto al tacto, está embotado completamente.

Su inteligencia es muy limitada: todos son temerosos, desconfiados y estúpidos, aunque dóciles, ó mas bien indiferentes; razon por la cual se dejan domesticar con facilidad.




Fig. 12.—COLA DEL DESMAN DE RUSIA

La hembra pare de tres á cuatro pequeños con los ojos cerrados; los cuida con tierna solicitud, y hasta los defiende con cierto valor.

La mayor parte de estos animales se enroscan en forma de bola á la menor señal de peligro, preservando así de todo golpe las partes blandas de su cuerpo; y para descansar toman tambien esta posicion. Los que habitan el norte duermen todo el invierno, y los que viven en los trópicos, durante la sequía.

USOS Y PRODUCTOS.—La utilidad directa de los erináceos es muy limitada, pues no se puede aprovechar ni su carne ni la piel; pero mediatamente son muy útiles, porque destruyen un número inmenso de animales nocivos. Por esto merecen nuestro aprecio y proteccion, en vez del desprecio que inspiran al vulgo.

Esta familia comprende varios géneros que difieren por los caracteres orgánicos y las facultades intelectuales. En primer término debe figurar, naturalmente, el que ha dado nombre á la familia.

EL ERIZO COMUN Ó DE EUROPA—ERINACEUS EUROPEUS

En las templadas tardes de la primavera, cuando jóvenes y viejos se diseminan por los bosques y jardines que han estado desiertos durante el invierno, y recobran nueva vida, el observador atento podria percibir un ligero rumor en medio de la hojarasca, bajo un vallado ó en alguna espesura. Si se detiene inmóvil, pronto reconocerá la causa: es un animalito de cuerpo redondeado, y pelaje espinoso, que saliendo de entre las hojas, olfatea, escucha y avanza á pasitos. Acercándose entonces, se verá un pequeño hocico puntiagudo, graciosa imágen del toco bello del cerdo; unos ojos pequeños y vivos, de mirada dulce, y una coraza de espinas ó púas, que cubre el lomo y los costados del animal. Aquel es el erizo, sér benévolo, aunque algo bestial, que pasa la vida