

El ojo se inclina hacia adelante al principio de la vida; el morro por dentro; el mogote superior, que es el que forma un gancho hacia adentro y atrás. Los pelos son gruesos y quebradizos, aunque más finos y menos ondulados en los del ciervo de crin; su color es muy variable, y depende del desacuerdo que se observa en las diversas partes del cuerpo que se han hecho de este animal. El tinte dominante es el pardo café, que se oscurece luego, pasando casi al pardo negro en el macho, mientras que en la hembra se aclara hasta el punto de asemejarse al color de la gamuza. Los pelos son de un gris canchento en su raíz, pardo negro en el centro, anillados después de un color de canela claro, y oscuros, por último, en su extremo. La faja del lomo, la que rodea el hocico, una tercera en forma de herradura, que se halla entre los dos ojos, y otra longitudinal, situada en medio de la frente, son oscuras ó casi negras; el vientre y las piernas de un gris canchento oscuro; la cabeza, los lados del cuello, la nuca y las orejas, de un gris leonado claro. En los costados del cuello, en las partes irregulares del mismo color; la extremidad de la mandíbula inferior, la cara interna de la pata y la parte superior de la pata.

Los machos de todos los axis son más vistosos que las hembras de pelaje claro que en los oscuros, y los machos jóvenes cuando el animal eriza sus pelos, y son más vistosos que los machos jóvenes.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—No se sabe á punto exacto en qué parte de Asia se origina el axis cerdo; pero se sabe que ha de ser muy vasta, y que la especie se encuentra numerosa allí donde habita. Parece que abunda en Bengala, de donde proceden todos los individuos que vemos en nuestros jardines zoológicos. Dicese que en las Indias está medio domesticado; nuestro clima le prueba bastante y le soporta fácilmente; pero es necesario cuidar á estos animales durante el mal tiempo.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Las costumbres de este cervino ofrecen diversas particularidades; está muy lejos de igualar á sus congéneres en cuanto á inteligencia; la hembra es tímida y miedosa sin ser prudente; el macho, al contrario, de carácter dominante, é inclinado á la lucha, hasta con el hombre. Tan pronto vive en paz con sus semejantes como los atormenta de todos modos; se precipita sobre ellos sin motivo alguno y los maltrata, peligrosamente á veces.

Después de la época del celo vive solitario, pero antes de esta muestra sus fuerzas de diversos modos; se lanza contra los árboles y las empalizadas, destroza la yerba con sus cuernos, arrojando los fragmentos á uno y otro lado, amenaza á cualquiera que se le acerque, mira de través con maligna expresión, y acometiendo al mismo hombre, le hiere gravemente.

A este ciervo se le caen los cuernos á principios del año; un axis cerdo del Jardín zoológico de Hamburgo, se desembarazó de los suyos el 20 de enero, y el 2 de abril se desprendió el pelo que los cubría; en julio entró en celo, el apareamiento verificase el 15 de agosto y el parto en 1.º de abril, después de una gestación de 228 días.

El cervato es un bonito animal; de color pardo claro con manchas amarillas; pero marcábanse ya las pesadas formas de los padres.

CAZA.—Este ciervo tiene en su país los mismos enemigos que sus congéneres: en Bengala se le persigue á caballo y le mata de un sablazo; algunos cazadores están ya muy prácticos en el arte de seguir á este animal por todos los senderos y de herirle con aquella arma, tan defectuosa á primera vista.

La carne de este ciervo parece ser muy delicada.

El ojo se inclina hacia adelante al principio de la vida; el morro por dentro; el mogote superior, que es el que forma un gancho hacia adentro y atrás. Los pelos son gruesos y quebradizos, aunque más finos y menos ondulados en los del ciervo de crin; su color es muy variable, y depende del desacuerdo que se observa en las diversas partes del cuerpo que se han hecho de este animal. El tinte dominante es el pardo café, que se oscurece luego, pasando casi al pardo negro en el macho, mientras que en la hembra se aclara hasta el punto de asemejarse al color de la gamuza. Los pelos son de un gris canchento en su raíz, pardo negro en el centro, anillados después de un color de canela claro, y oscuros, por último, en su extremo. La faja del lomo, la que rodea el hocico, una tercera en forma de herradura, que se halla entre los dos ojos, y otra longitudinal, situada en medio de la frente, son oscuras ó casi negras; el vientre y las piernas de un gris canchento oscuro; la cabeza, los lados del cuello, la nuca y las orejas, de un gris leonado claro. En los costados del cuello, en las partes irregulares del mismo color; la extremidad de la mandíbula inferior, la cara interna de la pata y la parte superior de la pata.

Los machos de todos los axis son más vistosos que las hembras de pelaje claro que en los oscuros, y los machos jóvenes cuando el animal eriza sus pelos, y son más vistosos que los machos jóvenes.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—No se sabe á punto exacto en qué parte de Asia se origina el axis cerdo; pero se sabe que ha de ser muy vasta, y que la especie se encuentra numerosa allí donde habita. Parece que abunda en Bengala, de donde proceden todos los individuos que vemos en nuestros jardines zoológicos. Dicese que en las Indias está medio domesticado; nuestro clima le prueba bastante y le soporta fácilmente; pero es necesario cuidar á estos animales durante el mal tiempo.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Las costumbres de este cervino ofrecen diversas particularidades; está muy lejos de igualar á sus congéneres en cuanto á inteligencia; la hembra es tímida y miedosa sin ser prudente; el macho, al contrario, de carácter dominante, é inclinado á la lucha, hasta con el hombre. Tan pronto vive en paz con sus semejantes como los atormenta de todos modos; se precipita sobre ellos sin motivo alguno y los maltrata, peligrosamente á veces.

Después de la época del celo vive solitario, pero antes de esta muestra sus fuerzas de diversos modos; se lanza contra los árboles y las empalizadas, destroza la yerba con sus cuernos, arrojando los fragmentos á uno y otro lado, amenaza á cualquiera que se le acerque, mira de través con maligna expresión, y acometiendo al mismo hombre, le hiere gravemente.

A este ciervo se le caen los cuernos á principios del año; un axis cerdo del Jardín zoológico de Hamburgo, se desembarazó de los suyos el 20 de enero, y el 2 de abril se desprendió el pelo que los cubría; en julio entró en celo, el apareamiento verificase el 15 de agosto y el parto en 1.º de abril, después de una gestación de 228 días.

El cervato es un bonito animal; de color pardo claro con manchas amarillas; pero marcábanse ya las pesadas formas de los padres.

CAZA.—Este ciervo tiene en su país los mismos enemigos que sus congéneres: en Bengala se le persigue á caballo y le mata de un sablazo; algunos cazadores están ya muy prácticos en el arte de seguir á este animal por todos los senderos y de herirle con aquella arma, tan defectuosa á primera vista.

La carne de este ciervo parece ser muy delicada.



EL CARIACO DE VIRGINIA



EL GAMO PLATICERCO