

Yo he cuidado y oído muchos sinsontes, pero ninguno cuyos variados cantos igualaran á mi modo de ver, al del ruiseñor comun ó al del mayor; sin embargo, personas conocedoras distinguidas aseguran que realmente hay machos cuyo canto incomparable es superior al de toda otra ave.

El sinsonte anida antes ó despues, segun los países donde se encuentra; en el sur de los Estados-Unidos comienza á construir su nido en abril; en el norte no suele hacerlo antes del mes de mayo: en el primero de dichos puntos pone la hembra tres veces al año, en el segundo solo dos. El macho se vale de todos los medios para cautivar á su compañera: extiende la cola, deja pendientes sus alas, y se pasea grave y altivo en el suelo ó en el ramaje, ó bien revolotea alrededor de su hembra, batiendo las alas como una mariposa; danza realmente en el aire y expresa sus sentimientos de mil modos.

El burlon forma su nido en la espesa copa de un árbol ó en un matorral, unas veces muy cerca de las casas, y otras en los lugares desiertos y retirados. El amazon se compone de ramas secas y las paredes de briznas, rastrojo y copos de lana, estopa y algodón; el interior está ocupado por una capa bastante espesa de raíces tiernas, entrelazadas unas con otras. La primera puesta es de cuatro á seis huevos, la segunda de cinco cuando mas, y la tercera no suele pasar de tres. Son de forma redondeada, de color verde claro, con puntos y manchas de un pardo oscuro y miden 0",026 de largo por 0",020 de grueso; la incubacion dura catorce días, y parece que solo cubre la hembra. Los hijuelos de las dos primeras polladas crecen rápidamente, y los de la última tardan mucho en desarrollarse.

Durante la incubacion se muestran muy afanosos macho y hembra, y si esta nota que álguien ha tocado sus huevos, lanza gritos de angustia, llamando á su compañero. Los americanos creen que en tal caso abandonan los padres la puesta; pero Audubon afirma, por el contrario, que redobla su amor y no abandonan el nido.

El régimen de estas aves es variable: en verano se alimentan principalmente de insectos; en el otoño comen bayas de toda especie jóvenes y viejos. A semejanza de los tordos, el burlon persigue por los aires á las mariposas, los coleópteros, las moscas y mosquitos, ó bien los coge en la superficie de las ramas y de las hojas.

Todos los carnívoros y las rapaces de América exterminan á los burlones, los pequeños deben temer también á las serpientes. En cuanto á los americanos han cobrado tal afecto á esta ave, que nadie la persigue para comer su carne; lejos de esto, todos la protegen por todos los medios posibles, y lo mas que se hace es coger algunos hijuelos en el nido para enjaularlos.

CAUTIVIDAD.—Cuando se cuida bien á los burlones no tardan en domesticarse perfectamente, y hasta se les puede acostumbrar á salir de la jaula y á entrar otra vez. Los individuos enjaulados se contentan con el alimento que se da á los tordos; pero son mas delicados que ellos, y es preciso que no les falten huevos de hormiga y gusanos de harina, en gran cantidad. Algunos de los que yo he cuidado, se han reproducido en la jaula.

LOS GALEOSOPTOS

—GALEOSOPTES

EL AVE GATO—GALEOSOPTES CAROLINENSIS

CARACTÉRES.—Esta especie de la sub-familia de los burlones figura en la fauna alemana porque un individuo llegó una vez á Heligoland, extraviado sin duda. La caracterizan el pico débil, mas alto que ancho, ligeramente corvo

en su mitad extrema y algo mas en la punta; el tarso medio cubierto por delante de placas confundidas; dedos cortos; ala corta también y además muy redondeada, y las rectrices de anchura casi igual, algo mas anchas cerca del extremo que es redondeado como lo es también toda la cola. La longitud es de 0",22, el ancho total de 0",30; el ala plegada mide 0",09 y la cola 0",10. El color dominante es un gris de pizarra algo mas claro en la region abdominal; la coronilla y el occipucio son negros; las cobijas inferiores de la cola castaño rojizo oscuro; las rémiges son negro parduscas con filete leonado en la parte interior; las rectrices negras y las dos externas con una orla gris en la punta. El iris es pardo, el pico negro, y la pata color pardo sombra de Venecia.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta ave habita toda la parte oriental de los Estados-Unidos desde el lago Winnipeg hasta la Florida, y visita en invierno además la América central, las Indias occidentales y las islas de Bahama. En febrero empieza su viaje de regreso y entonces se la ve en la Florida, Georgia y Carolina; sigue su ruta con calma y aparece en abril en la Virginia y Pensilvania, para llegar finalmente y establecerse en los matorrales, montes bajos y huertas de la Nueva Inglaterra entre el 1.º y 10 de mayo, y allí pasa el verano.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—El ave gato se parece en sus costumbres á los burlones y como ellos es de carácter vivaz, inquieto, curioso y pendenciero; pero no los iguala de mucho en el canto, bien que el de algunos machos se distingue en alto grado por su variedad. Posee un notable don de imitacion que segun se dice es verdaderamente delicioso en algunas ocasiones cuando remeda y varia el canto de las aves cantoras buenas ó malas de la comarca en que habita. Las hay que imitan estrofas enteras de las cantoras mas melodiosas, y otras se contentan con imitar la voz de las gallinas de monte, el cacareo de la de corral, el piar de los polluelos, ó cualquier otro sonido, graznidos, chirridos, etc., mezclándolos con otras frases, y logrando cuando no los aplausos de los conocedores, por lo menos divertir y entretenir á las personas que las escuchan.

Segun la localidad, empieza esta ave á construir el nido mas ó menos tarde, escogiendo para ello un sitio oscuro en alguna mata apartada. El nido suele estar á dos ó tres metros del suelo, es de construccion rústica, compuesto de ramitas, yerbas y hojas secas, pedacitos de corteza, de piel de culebra, papel, cintas y trapos, y tapizado interiormente de raicillas finas. Componen la puesta cuatro ó cinco huevos relucientes, color verde esmeralda, de 0",024 de largo y 0",017 de grueso. Macho y hembra comparten el trabajo de incubacion con extraordinaria solicitud; y lo mismo sucede despues con la cria de los pequeñuelos. Al divisar algun sér hostil ó simplemente molesto se precipitan sobre él con el mayor arrojo, aunque sean rapaces peligrosas ó personas; y cuando no les vale el arrojo, gritan lastimeramente y logran así no pocas veces ahuyentar á los intrusos. Hecha la primera cria proceden á otra, y si el año es bueno hasta á una tercera.

CAUTIVIDAD.—Como el régimen de esta ave es igual al de la especie anterior, es fácil mantenerla en la jaula, y si se la ha sacado pequeña del nido y se la alimenta y cuida con cariño, se domestica bien y se hace muy agradable con sus graciosos movimientos.

EL ARPORINCO Ó BURLON ROJO—HARPORHYNCHUS RUFUS

CARACTÉRES.—Se caracteriza por su pico, tan largo ó mas que la cabeza, mas ó menos corvo y desprovisto de escotadura; pata robusta, cuyo tarso tiene poco mas ó menos

la longitud del dedo medio; alas cortas y muy redondeadas, con la cuarta y quinta rémiges mas largas que las demás; la cola es larga, estrecha y muy puntiaguda. El ave mide 0",27 de largo; 0",32 de punta á punta de ala; esta plegada 0",11 y la cola 0",13. Toda la parte superior, las alas y la cola son de un color rojo de orin muy vivo; la línea naso-ocular y una línea al través del ojo, los lados de la cabeza y del cuello, así como las partes inferiores, son blancos con un matiz amarillento de orin; las plumas del vientre, de la cabeza, del pecho y de los costados tienen en el tallo manchas triangulares pardo oscuras; las rémiges llevan en la parte cubierta un filete pardo oscuro que tira á leonado; las grandes cobijas superiores de las alas y las del antebrazo tienen en la extremidad un filete blanco, y antes del filete una faja trasversal oscura; las rectrices externas tienen el extremo de color de orin amarillento medio borrado. El iris es de color de azufre, el pico pardo oscuro, por debajo pardo claro y la pata amarilla pardusca.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El burlon rojo se presenta en todas partes, pero segun los sitios es mas ó menos frecuente, desde las costas del Atlántico hasta las Montañas Pedregosas, y desde la América inglesa hasta Texas, habiéndose extraviado hasta Heligoland. En algunos puntos es muy comun, mientras que en otros ni le conocen siquiera.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—En la Nueva Inglaterra, y en general en el norte de su área de dispersion, se presenta en mayo, permanece todo el verano y emigra en setiembre para pasar el invierno en el mediodía, á partir desde la Virginia. En su patria no sale cada pareja de un espacio perfectamente limitado, que defiende animosamente contra todos sus vecinos, lo cual no obsta para que acudan todos cuando uno de ellos los llama en momentos de peligro á fin de perseguir juntos á algun enemigo. Dentro de su distrito no tarda el burlon rojo en llamar la atencion, pues tiene la viveza de todos los tordos burlones. Como no es gran volador, prefiere pasar el tiempo en tierra donde registra con su pico largo y corvo todos los escondrijos y revuelve la hojarasca en busca de su alimento, volando al próximo matorral cuando quiere descansar ó cuando amenaza algun riesgo. Desde lejos se le distingue por los muchos movimientos que hace con las alas y la cola, alzando, bajando, extendiendo y plegando unas y otra. Los americanos alaban muchísimo su voz, que en efecto es vibrante, sonora y variada, pero que no puede competir ni con el canto de nuestro tordo, ni con el del sinsonte; y dicen que no imita las voces de otros animales.

El burlon rojo hace la primera cria en marzo en los Estados meridionales, en mayo en Pensilvania, y á últimos de este mismo mes en la Nueva Inglaterra. El nido se encuentra en sitios semejantes al del ave gato y á igual altura; es muy voluminoso y rústico, pero bien tapizado interiormente. La puesta se compone por lo regular de cuatro huevos, á veces de cinco, en casos rarísimos de seis; estos huevos tienen 0",027 de longitud por 0",021 de diámetro, y sobre fondo blanco ó verde claro presentan pequeñas manchas pardo rojizas que hácia el extremo grueso se van confundiendo y acaban por formar un aro. El macho y la hembra cubren alternativamente; ambos cuidan de los pequeñuelos y se comportan cerca del nido de un modo análogo al del ave gato. Uno de los padres, por lo regular el macho, está al parecer continuamente de vigilante, para descubrir cualquier enemigo á tiempo, y ambos unen sus esfuerzos para apartar todo peligro, empleando todos los recursos, lamentos, súplicas y avisos que comueven hasta á personas rudas y las detienen si llevan el intento de dañar á su cria. Los pequeños abandonan el nido antes de poder volar enteramente; pero guiados y protegidos fielmente por los viejos, pasan el

tiempo que falta hasta su completo desarrollo en algun matorral enmarañado y protector.

CAUTIVIDAD.—Cogidos en el nido y bien cuidados se domestican tan bien que puede dejarse su jaula abierta para que entren y salgan á su gusto, y hasta llegan á acompañar á su amo en sus paseos por el jardín ó campo sin escaparse.

LOS AEDONINOS—AEDONINÆ

Componen esta sub-familia unas aves cuya afinidad con los turdinos es innegable, pero que no son cantoras ni pueden agregarse á ningun otro grupo. Sus caracteres son los del género siguiente.

LOS ACRÓBATAS—AEDON

CARACTÉRES.—Las nueve especies de este género que viven en la Europa meridional, Asia Menor, Palestina y Africa, son todas turdinos pequeños y esbeltos, de pico robusto con la arista superior bastante corva; tarso regular, alas cortas, cuya tercera y cuarta rémiges, de igual longitud, forman la punta; la cola es larga, ancha y muy redondeada; el plumaje blando y sedoso, igual en ambos sexos, y en los pequeños semejante al de los adultos del sexo respectivo.

EL ALZARABO Ó ACRÓBATA MOHOSO—AEDON GALACTODES

CARACTÉRES.—Tiene el dorso de un color entre gris rojizo y orin, algo mas oscuro en la coronilla, y tirando mas á gris en la nuca; la parte inferior del cuerpo es gris amarillenta ó blanca sucia con viso rojizo en los costados del cuello, y amarillenta con matiz de orin en las ingles; las mejillas son de un pardo blanquiczo, y la línea naso-ocular blanca, prolongándose mucho hácia atrás; las rémiges y sus cobijas son pardas, las primarias orladas de pardo claro, y las secundarias de amarillo de orin mas ancho que en aquellas; las rectrices son de un hermoso rojo de orin, excepto las del medio, que son mas oscuras, la extremidad es blanca precedida de una mancha redonda de color pardo negruzco. El ojo es pardo oscuro, el pico y las patas rojizas. Los polluelos se asemejan á los padres. La longitud es 0",18, el ancho de punta á punta de ala 0",27, esta última plegada mide 0",08 y la cola 0",07. Macho y hembra son del mismo tamaño.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta ave habita en España y el noroeste de Africa, desde donde visita á veces Italia, Alemania y la Gran Bretaña.

EL ACRÓBATA FAMILIAR—AEDON FAMILIARIS

CARACTÉRES.—Se distingue de la especie anterior por su menor talla y el color gris tirando á orin de la parte superior del cuerpo y de las cobijas superiores de las alas; la rabadilla es de color rojo de orin muy vivo, y la barba interior de las dos rectrices del medio, parda.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Habita la Grecia, el Asia Menor y el Egipto.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Ambas especies eligen para morada aquellos sitios secanos que no reciben otra agua que la pluvial, y están escasamente cubiertos de matas pequeñas, sin que por esto rehuyan las tierras de cultivo ni por consiguiente la proximidad de las moradas humanas, segun se ve tanto en España como en Grecia, y así en Egipto como en el páramo Samhara del interior del Africa mencionado ya otras veces. En España y Grecia prefieren