

Wodzicki tenían la figura de un cono invertido; y medían 0",10 de alto, 0",09 de diámetro y como 0",06 de profundidad. La puesta consiste en cinco, raras veces en cuatro huevos y queda terminada ó á últimos de mayo ó á principios de junio. La forma y el color de los huevos varían muchísimo así como el tamaño que oscila entre 0",021 y 0",025 de largo por un diámetro de 0",015 á 0",020. Sobre fondo blanquizco ó blanco de cal, están salpicados de puntitos en extremo diminutos que cubren el extremo grueso casi en su totalidad, y de otros mas gruesos de color amarillo ó negro-parduscos

con matiz violeta. En este caso se parecen mucho á los huevos de la curruca gárrula, pero otros hay que se parecen mas á los del pipí ó á los de la alondra de monte. Macho y hembra se relevan para cubrir, dedicándose con tanto ardor á este trabajo que se les puede observar muy bien, y si se espantan vuelven sin vacilar, ya de un solo vuelo, ya acercándose á saltitos de rama en rama. Cuando los pequeños pueden volar abandonan todos el carrizal y pasan á las espadañas ó á las altas yerbas, donde permanecen hasta setiembre corriendo por el suelo húmedo.



Fig. 225.—EL CISTICOLA TEJEDOR

LOS BRADÍPTEROS—BRADYPTERUS

CARACTÉRES.—Se caracterizan por su pico corto y estrecho, alas muy redondeadas con la tercera y cuarta rémiges mas largas que las demás, y las plumas sub-caudales muy anchas, largas y pobladas.

EL BRADÍPTERO SEDOSO—BRADYPTERUS CETII

CARACTÉRES.—Incluyo esta especie como representante de un género aparte, para completar este grupo. La parte superior del cuerpo es pardo rojiza, color algo mas subido en la rabadilla y en las cobijas caudales superiores; las rectrices y los filetes exteriores de las rémiges pardo-oscuros son mas oscuros; corre una línea mas clara apenas visible al través del ojo; el círculo que rodea este es mas claro por tirar mas á blanco; la parte inferior del cuerpo y las cobijas

sub-caudales son parduscas con matiz de orin, y las mas largas de estas últimas tienen una orla blanca indeterminada en el extremo. El ojo es pardo oscuro, el pico pardo de orin, la base de la mandíbula inferior de un amarillo de cuerno y la pata amarilla rojiza. La longitud es aproximadamente de 0",13, la del ala 0",06 y la de la cola 0",065. La hembra es bastante mas pequeña. El plumaje de los polluelos, además de ser extraordinariamente lacio, no es tan rojizo como el del macho y la línea del ojo apenas está indicada.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El bradíptero sedoso habita el mediodía de Europa desde España hasta el mar Caspio, el Asia occidental y el Africa septentrional, siendo sedentario en todos los puntos donde se le ha observado.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Busca sitios donde haya aguas, prefiriendo las corrientes, ya sean arroyos, acequias ó zanjas de desagüe, á las encharcadas siempre que sus orillas se hallen pobladas de juncos, matorrales y zarzales. Allí pasa su vida oculta. Alejandro de Homeyer dice que es ave en extremo vivaz y que está siempre en movimiento;

no se deja ver mucho, pero su canto repentino y alto la delata en seguida. El terreno que habita no pasa de un centenar de pasos de diámetro, pero el ave le recorre sin cesar con una actividad pasmosa; el observador no sabe dónde mirar ni cómo explicarse su rapidez cuando la oye cantar tan pronto á la derecha como á la izquierda, y esta sorpresa crece, porque no se la ve volar; no se tarda empero en convencerse de que no solamente se desliza con gran ligereza por las matas, sino que cruza volando grandes distancias á poca altura de la tierra, oculta entre las matas. Es animal en extremo previsor, huye al menor asomo de peligro, y si es difícil verle, mas lo es tirarle. Su canto y grito de llamada son tan característicos que basta haber oído al bradíptero sedoso una vez para no confundirlo ya jamás con otra ave. El grito de llamada suena como *chek, chek, chek*, y el canto se asemeja al principio al delruiseñor, á veces hasta tal punto que engañaría á cualquiera si fuese mas largo y no concluyese con la primera y única estrofa. Hausmann la traduce con la combinación *tsik, tsivít, tsivóit*, y von der Muehle con *chifút, chifút, chifút*, que por casualidad viene á ser una palabra turca, un apodo despreciativo que aplican en Turquía á los judíos, circunstancia que excita contra estas aves el odio de los pastores griegos, los cuales creen que se mofa de ellos y los quiere insultar llamándolos judíos.

Construye siempre el nido en lo mas enmarañado de algun jara! impenetrable á poca altura del suelo, y lo forma con desechos y restos vegetales como tallos y hojas medio descompuestos, tapizando el interior de yerba fina, pelo de cabra, lana de carnero y algodón. A últimos de abril se halla completa la puesta que consiste en cuatro ó cinco huevos de 0",020 de largo por 0",015 de grueso, de color uniforme rojo. Sobre su modo de educar la cria no poseo datos; Krueper dice que los inviernos rigurosos suelen causar grandes destrozos entre estas aves.

LOS DRIMOICINOS—DRYMOICINÆ

CARACTÉRES.—Las doscientas especies que á poca diferencia componen este grupo se agregan naturalmente al anterior, y se caracterizan por su pico mediano, comprimido lateralmente y por lo comun un poco corvo; patas relativamente muy robustas; alas cortas y redondeadas; cola de largura variable y casi siempre escalonada, y finalmente su plumaje por lo comun unicolor, salvo alguna especie que lo tiene muy variado.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Su área de dispersion se limita al antiguo continente y á la Oceanía.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Concuerdan en general con los calamoherpinos respecto á los sitios que apetece, y si alguna diferencia hay estriba acaso en que los drimoicinos tienen una preferencia aun mas marcada que aquellos por las matas bajas, juncos y yerbas. Reunen la destreza de aquellos y de los silvinos porque corren, trepan y se deslizan con la misma agilidad sorprendente; pero vuelan mal, con poca seguridad y vacilantes, lo que no obsta para que se eleven, cuando los excita el amor, á saltos, revoloteando á fuerza de aleteos hasta por cima de las plantas que les dan albergue, para hacer resonar su canto sencillo y reducido á una sola frase, y precipitarse otra vez en la espesura. Sus nidos artísticos y en cierto modo incomparables, formados de hojas cosidas entre sí por el ave, se hallan casi en el suelo; allí crían, allí encuentran su alimento y pasan la mayor parte de su vida.

LOS CISTICOLAS—CISTICOLA

CARACTERES.—Distinguese este género por su pico

corto, delicado, ligeramente encorvado; tarsos altos y dedos grandes; alas cortas y redondeadas con la cuarta rémige mas larga que las otras y la cola imperceptiblemente redondeada y corta.

EL TINTIN Ó CISTICOLA CORREDOR—CISTICOLA CURSITANS

CARACTÉRES.—La parte superior del cuerpo es de un pardo aceitunado con manchas pardo-oscuras, á excep-




Fig. 226.—EL ORTOTOMO DE COLA LARGA

cion de la nuca que es pardusca y de la rabadilla, simplemente parda; el centro de las plumas es pardo negruzco, pero el borde pardo amarillento tirando á orin. En la cabeza hay tres listitas negruzcas y dos de color amarillo claro; la region de la nuca, la garganta y el centro del vientre son enteramente blancos; el pecho, los costados y las cobijas sub-caudales son amarillos con matiz de orin; las rémiges de color negro gris orladas por fuera de amarillo orin; las rectrices medias son pardas con matiz de orin, y las demás parduscas cenicientas con filete blanco en el extremo, y antes de este hay una mancha negruzca en forma de corazon. El ojo es gris claro y pardusco; el pico color de cuerno y la pata rojiza. Los pequeños difieren de los viejos por su coloracion algo mas clara. La longitud es de 0",011, el ancho de ala á ala de 0",016, la del ala plegada de 0",05, y la de la cola de 0",04 (fig. 224). La hembra es un poco mas pequeña.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—La España central y meridional, la Italia meridional, la isla de Cerdeña, Grecia, el norte del Africa y el Asia central, oriental y meridional.