

mayo y á principios de julio, se encuentran de cuatro á seis huevos pequeños de 0^m,019 de largo por 0^m,014 de grueso, de color muy variable, por lo regular gris blanquizco, que tira al pardo ó rojo, y con manchas, puntas y vetas de un gris ceniciento ó de un pardo rojizo, mas ó menos marcadas y confluentes.

Este pájaro no es tímido, sobre todo cuando se halla cubriendo los huevos en su nido, pues el amor á su prole le hace olvidar toda su prudencia, hasta el punto de poderse coger á la hembra con la mano. Si álguien se acerca al nido, acude el macho presuroso, lanzando gritos lastimeros. Los pequeños se crían del modo ordinario.

Este emberiza es mas alegre, vivaz y ágil que sus congéneres: trepa hábilmente á lo largo de los tallos de las cañas, por muy delgadas que sean; salta con mucha rapidez y soltura por tierra; vuela ligeramente; complácese en remontarse á cierta altura, cerrando luego las alas, para dejarse caer en cierto modo; con frecuencia se divierte en revolotear al rededor de los matorrales. Cuando le afecta alguna cosa, ó se dispone á emprender su vuelo, ó acaba de posarse, imprime á la parte posterior de su cuerpo movimientos bruscos y repetidos, como lo hacen los gorriones de nogal. Su grito de llamada es *ziic*, pronunciado con fuerza, y mas prolongado que el de los otros embericidos: su canto es tartaleado. Este pájaro, como dice Naumann, «ahoga todas las notas.» En cambio se le oye desde por la mañana hasta la tarde; debo declarar que su continuado gorjeo me agradaba mucho.

Durante el verano se alimenta este pájaro casi exclusivamente de insectos acuáticos; en otoño é invierno come los granos de las cañas, de los juncos, de las yerbas y de diversas plantas pantanosas.

Poco despues del período del celo se reunen estos pájaros en reducidas bandadas para recorrer los campos. A la entrada de la mala estacion abandonan los países del norte y van á buscar un asilo en la espesura de cañas y en los pantanos cubiertos de altas yerbas, situados en el mediodía de Europa. En invierno vi muchos cerca de Toledo, en las orillas del Tajo, donde habitan las breñas de cardos mas espinosos: todos los años abundan estos pájaros en las orillas del lago de la Albufera, cerca de Valencia.

EL EMBERIZA ENANO—EMBERIZA PUSILLA

CARACTERES.—La longitud de esta especie es de 0^m,15; las alas miden 0^m,08 y la cola 0^m,065. La parte superior de la cabeza, la línea naso-ocular y los lados de la cabeza son de color pardo rojo de canela muy vivo; dos anchas fajas longitudinales que se corren desde las fosas nasales hasta la nuca son negras, y del mismo color otra mas ancha que empezando detrás de los ojos se reune con una que limita la parte posterior de la region auricular; una faja transversal en los lados del cuello es de color rojizo de orin; las regiones superiores son pardas y las inferiores blanquizcas; las primeras tienen en el manto y los hombros grandes manchas de un color negro pardo, orilladas de pardo rojo en los tallos; en el buche y el pecho hay numerosas líneas negras en los tallos; las alas y las rectrices, de un pardo oscuro, están orilladas en las barbas exteriores de un tinte pardo pálido; las rémiges secundarias inferiores y sus tectrices presentan un borde mas ancho de color pardo de orin; las tectrices mayores de las alas tienen la punta de este mismo tinte, que forma una faja transversal; la primera rectriz de ambos lados es blanca en toda la barba exterior y en la extremidad de la interior, mientras que la segunda de cada lado solo presenta una ancha faja blanca en las barbas interiores. Los ojos son

de un pardo oscuro; el pico del mismo color, y los piés parduscos. El color de la hembra es menos vivo; la coronilla presenta una faja pálida en el centro y dos mas oscuras en los lados; la línea naso-ocular y las fajas que hay sobre los ojos son de un color de orin pálido; las plumas que rodean las orejas de un rojo de orin.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El emberiza enano es propio de Europa y de todo el norte de Asia.

EL EMBERIZA SILVESTRE—EMBERIZA RUSTICA

CARACTERES.—Esta ave, muy congénica del emberiza enano, tiene la parte superior y los lados de la cabeza negros; una ancha línea de las sienas, la barba y la garganta son blancas; las regiones superiores y una ancha faja trasversal que se corre sobre la cabeza, de un pardo rojo oscuro; las tectrices inferiores de las alas son blancas; las plumas del manto y de los hombros tienen en sus tallos grandes manchas negras; las plumas pardo rojas de los costados están orilladas de blanco; las rémiges primarias, de un color pardo oscuro, están orilladas exteriormente de un pardo pálido; las secundarias son de un negro pardo, así como las mayores de las tectrices superiores, que tienen bordes pardos en las barbas exteriores y blancos en la extremidad; estos últimos forman dos fajas trasversales blancas; las pequeñas tectrices superiores son de un pardo rojizo; las rectrices negras, y las dos del centro orilladas de pardo; las dos exteriores de ambos lados tienen en las barbas interiores una mancha longitudinal blanca; la primera es blanca casi hasta la extremidad de las barbas exteriores. Los ojos son pardos; el pico pardo rojizo, mas oscuro en la arista, y los piés de un amarillo de cuerno. La hembra tiene la parte anterior y posterior de la cabeza de color pardo rojizo, con tallos rojizos; una línea que cruza las sienas de un amarillo de orin; la barba y la garganta de un blanquizco rojo; la nuca y una faja transversal del buche rojas de orin; cada pluma está orillada de amarillento en la extremidad; en los costados hay manchas longitudinales de un pardo rojo. Esta especie mide 0^m,17 de largo, por 0^m,27 de ancho de punta á punta de las alas; estas tienen 0^m,084 y la cola 0^m,064 de longitud.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El área de dispersion del emberiza silvestre es casi igual á la del emberiza enano; pero como se extiende mas hácia el oeste, llega desde Kamschatka hasta Laponia. Ambas aves visitan en invierno las regiones meridionales, solo que mientras la primera suele prolongar sus excursiones hasta el mediodía de la China y centro de la India, la segunda no se aleja nunca tanto de su patria.

Ambas viajan tambien hácia el sudoeste, visitando entonces la Alemania, por donde pasan desapercibidas con mucha mas frecuencia de lo que hasta ahora creíamos, fundándonos en las observaciones hasta aquí conocidas.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Poco hay que decir sobre el género de vida y el carácter de estas dos especies tan congénicas. Ambas habitan los bosques de su patria y sobre todo las espesuras de sauces en las orillas y en las islas de los grandes rios, las cuales no frecuentan, sin embargo, mas que para anidar, alejándose tan lentamente como llegaron apenas acaban de criar á sus hijuelos. Radde dice que el emberiza silvestre de la Siberia oriental es entre todos sus congéneres el que mas pronto pasa por el sudoeste de aquel país llegando ya el 26 de mayo á las orillas de Tarai-nor; pero tan cansado por el viaje á través de la solitaria estepa, que se le puede coger con la mano. A fines de abril, ó en mayo, llegan por fin á su patria. Lo mismo podemos de-

cir respecto al emberiza enano de cuyo género de vida en verano puedo dar algunas noticias, segun mis propias observaciones. Como su color es análogo al del terreno y vive siempre tan oculta, el ave pasa fácilmente desapercibida, y en rigor solo se la ve cuando el macho se posa en la copa de un árbol para dejar oír su pobre y breve canto, que se reduce á tres ó cuatro sonidos. Tan luego como la nieve desaparece de los bosques, ó sea á mediados de junio, la pareja hace súos preparativos para la reproducción. El 11 de julio, despues de buscar mucho tiempo, encontré un nido, que el mismo macho descubrió por haber fingido que cojeaba; este nido estaba en el suelo muy oculto en la yerba seca; bastante pequeño, atendido el tamaño del ave, y de forma plana, consistía tan solo en tallos de gramíneas muy unidos entre sí. Los adultos manifestaron gran temor, fingiendo del modo acostumbrado; advertida por el macho, la hembra abandonó por fin el nido, al principio á saltitos, sin que yo la viese, y luego con rapidez, hasta que estuvo muy léjos. Macho y hembra permanecieron inmóviles mientras yo buscaba cerca del nido, pero luego se acercaron á tres pasos de mí, produciendo continuamente su grito de llamada que es un agudo, pero débil *ziip, ziip, ziip*. No quise tocar los polluelos, y quizás hubiera obrado del mismo modo si en vez de ellos hubiera encontrado los huevos. Baldamus, que recibió algunos de estos por conducto de Middendorff, dice que son de forma muy variable; miden de 0^m,017 á 0^m,027 de largo por 0^m,014 de grueso; la cáscara es amarillenta, con puntos, líneas y manchas poco marcadas; de color pardo violeta, sobre todo en la extremidad gruesa; parécense mucho á los del emberiza hortelano, distinguiéndose no obstante por su reducido tamaño, tanto de estos como de todos los de emberiza. Seebohm, que encontró en junio á orillas del Petschora inferior, varios nidos, hace una descripción análoga de los huevos.

EL EMBERIZA GRIS Ó GORRIÓN TRIGUERO—EMBERIZA MILIARIA

CARACTERES.—Esta especie se distingue por sus pesadas formas; su longitud es de 0^m,19, por 0^m,29 de anchura de punta á punta de las alas; estas miden 0^m,09 y la cola 0^m,07 (fig. 239).

Las partes superiores, excepto las plumas de la rabadilla y las tectrices de la cola, son de un color pardusco de tierra, con líneas oscuras en los tallos, que forman desde la mandíbula inferior algunas fajas poco marcadas en forma de barba, y por su reunion en el centro del buche una gran mancha oscura; la línea naso-ocular y una faja poco marcada en las sienas son de un blanco pálido; la region de las orejas y de las mejillas es de color pardusco, con líneas longitudinales mas oscuras, limitadas en su parte inferior por una faja de un blanco pálido, que tambien presenta líneas oscuras; las rémiges y rectrices son de un pardo oscuro, orilladas de blanquizco pálido en las barbas exteriores; las rémiges secundarias y las mayores tectrices superiores de las alas están orilladas del mismo modo, y tambien en la extremidad; de modo que estos bordes forman dos fajas trasversales de color claro. Los ojos son de un pardo oscuro; el pico amarillo de cuerno, y los piés de un amarillo pálido.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Desde el mediodía de Noruega se encuentra esta ave en toda Europa é igualmente en los parajes convenientes del Asia occidental, donde suele anidar, emprendiendo solo cortas expediciones. En su emigracion de invierno llega aisladamente ó en bandadas hasta el norte del Africa, y entonces abunda bastante en Egipto y hasta en las islas Canarias. En verano prefiere las

vastas y fértiles llanuras cubiertas de trigo, pero mas le agradan aun las regiones donde alternan las praderas con los campos en que no faltan árboles y arbustos aislados: siempre se aleja de los grandes bosques y de las montañas. No es raro en ninguna parte de la Alemania septentrional; en el centro de este país se extiende mas y mas. En los ricos campos de trigo de Austria y Hungría es, si no la mas comun de todas las aves, por lo menos el emberiza que mas abunda.

Por el aspecto general de este pájaro, por su cuerpo grueso y recogido y sus alas cortas, se deduce ya que es pesado: salta con lentitud, encorvando el cuerpo y moviendo la cola; vuela con trabajo y ruidosamente, aunque no sin cierta rapidez, y cambia de dirección con mas facilidad de lo que pudiera esperarse. Su grito de llamada *ziik*, que lanza al emprender su vuelo, es bastante sonoro; su señal de aviso es un sonido equivalente á *sich*, muy prolongado; y en sus momentos de ternura parece pronunciar las sílabas *tik tik*. Su canto no es vigoroso ni agradable; aseméjase al ruido que produce un telar de tejer medias, y por esto se le aplicó en ciertos países de Europa el nombre de *bonetero*. El pájaro, no obstante, parece muy satisfecho de sí mismo; al cantar toma las posturas mas extraordinarias, y trata de reemplazar con sus gestos las notas que no puede emitir. El gorrión triguero de Europa no tiene ninguna cualidad buena; es fastidioso, y á mayor abundamiento pendenciero.

Anida por el mes de abril, en medio de las yerbas y muy cerca del suelo: las paredes de su nido se componen de rastrojos, hojas secas y pajas; y el interior está relleno de pelos ó yerbas muy finas. La hembra pone de cuatro á seis huevos de 0^m,024 de largo por 0^m,018 de grueso, de cáscara fina, mate, y color gris empañado, ó amarillento sucio, cubierta de puntos, pequeñas manchas y rayas de un gris rojizo ó azulado, principalmente en el extremo grueso. Los hijuelos se alimentan de insectos y comienzan á volar á fines de mayo, época en la que los padres anidan por segunda vez, formando despues bandadas, jóvenes y viejos, para comenzar sus emigraciones.

CAZA.—Persigueselos activamente para obtener su carne, que es muy delicada: se cazan con escopeta ó los cogen con lazos, redes, etc. No se les coge para la jaula.

EL EMBERIZA AMARILLO—EMBERIZA CITRINELLA

CARACTERES.—Esta especie abunda mas, pero no tiene un área de dispersion tan extensa como la de la precedente. Su longitud es de 0^m,17 por 0^m,27 de ancho de punta á punta de las alas; estas tienen 0^m,085 y la cola 0^m,07 de largo. La cabeza, el cuello y las partes inferiores son de un bonito amarillo vivo; la frente, una faja longitudinal que se corre sobre los ojos hasta la nuca, y otra que pasa desde el borde posterior de aquellos hasta las sienas, así como la parte posterior del cuello, son de un verde gris aceituna, con escasas líneas oscuras; la cabeza y sus lados presentan en los tallos líneas de color pardo rojo canela; la rabadilla y las tectrices superiores de la cola tienen otras iguales mas oscuras; en el manto y en los hombros estas líneas son de un pardo de orin pálido, y en las partes inferiores del tronco del mismo tinte, mas oscuro; las partes superiores del tronco tienen estas líneas mas anchas y de color negro; las rémiges son de un pardo oscuro; las primarias presentan en sus partes interiores un borde amarillo pálido; las secundarias y sus tectrices están orilladas en su extremidad de un pardo rojo, cuyos bordes forman una faja transversal; las rectrices de un pardo oscuro con un borde angosto de color mas claro en las barbas exteriores; las dos primeras de ambos lados pro-

vistas en la extremidad de las barbas interiores de grandes manchas blancas. Los ojos son de un pardo oscuro; el pico de un azul mas claro en los cortes; los piés de un amarillo rojizo (fig. 241). La hembra tiene todos los colores mas pálidos; una mancha en la coronilla, las cejas, la barba y la garganta marcadamente amarillas; el buche y el pecho de un pardusco rojizo pálido.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—La patria del emberiza amarillo comprende el norte y centro de Europa y



Fig. 240.—EL EMBERIZA HORTELANO

una gran parte del Asia, sobre todo la Siberia. No falta en ninguna region de Alemania; en la montaña se eleva hasta el limite de los bosques y habita con preferencia los sitios donde los arbustos alternan con campos, praderas y árboles frutales.

EL EMBERIZA DE LAS CERCAS—EMBERIZA CIRLUS

CARACTERES.—El emberiza de las cercas tiene 0",158 de largo, por 0",24 de punta á punta de las alas; estas miden 0",075 y la cola 0",07. La cabeza, la parte posterior, los lados del cuello y una ancha faja transversal del buche son de un verde gris; en la coronilla hay líneas negras; las cejas, una faja que hay debajo de los ojos; y una ancha placa en forma de media luna, situada entre la garganta y el buche son amarillas; la barba, la parte superior del cuello y otra faja que desde esta parte se corre hasta por detrás de la region de las orejas son negras; las regiones inferiores de un amarillo claro; los costados rojos de canela; el vientre y los lados de los muslos tienen en sus tallos líneas oscuras; el manto y los hombros son de un rojo canela; las plumas están orilladas de gris en la extremidad y son de un tinte oscuro; la rabadilla y las tectrices superiores de la cola son de un pardusco

co verdoso; las rémiges de un pardo oscuro, orilladas en sus barbas exteriores de un borde pálido; las tectrices del brazo y las rémiges secundarias ostentan en sus barbas exteriores un ancho borde pálido de canela; las tectrices superiores de las alas son de un pardo verde y las mas grandes presentan un borde rojizo pálido en la extremidad, formando una faja transversal; las rectrices son de un pardo oscuro, con borde pálido en las barbas exteriores; las dos primeras de cada lado tienen manchas longitudinales de color blanco, que en la primera rectriz de cada lado cubren casi todas las barbas exteriores. Los ojos son de un pardo oscuro; el pico negro por arriba y pardusco claro por debajo; los piés de un rojizo claro. La hembra no tiene el color negro de la garganta ni las dos fajas amarillas en la cabeza; las plumas de las partes inferiores son amarillentas, con tallos oscuros; la mancha rojo canela del lado del pecho es mas pálida.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Todo el verano se le ve en compañía de su hembra ó de sus pequeños: á principios de la primavera se verifica el apareamiento; en el mes de marzo se ven los nidos, que difieren del que fabrica el anterior en que son menos bastos los materiales empleados en la construcción. Este nido está situado en los jarales ó las cercas, y muy cerca del suelo: á principios de abril se encuentran siempre huevos; entonces está el macho muy contento, y canta todo el día, posado en una rama aislada.

Cada puesta es de cuatro á cinco huevos de cáscara muy delgada, color blanco sucio ó gris rojizo, y cubierta de manchas y venas oscuras. Macho y hembra cubren alternativamente, y alimentan á los hijuelos con insectos: si el año es favorable, las hembras jóvenes ponen dos, y hasta tres veces.

Después del periodo del celo se reúnen los pequeños de diversos nidos del mismo canton, y forman con los pájaros de mas edad y de la misma especie numerosas bandadas que recorren el país. Los emberizas forman entonces sociedad con las alondras, con los pinzones y los zorzales (*turdus pilaris*).

Cuando el invierno es muy riguroso, el emberiza amarillo tiene que pedir su alimento al hombre, y entonces se le ve llegar á las granjas, donde es recibido comunmente con gusto. En la primavera vuelve cada pareja á su antiguo retiro.

Para cogerle se emplean trampas ó lazos, pero las rapaces le son mucho mas peligrosas que el hombre.

EL EMBERIZA HORTELANO—EMBERIZA HORTULANA

CARACTERES.—La longitud de esta ave es de 0",16, por 0",26 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0",08 y la cola 0",07. La cabeza, el cuello y el buche son de color verdoso gris pálido; un angosto círculo que hay alrededor de los ojos, la barba, la garganta y una faja que se corre por debajo de la mandíbula inferior, limitada por otra mas oscura en forma de barba, son amarillentas; el resto de las regiones inferiores de un rojizo canela, mas claro en las tectrices inferiores de la cola; las partes superiores son de un pardo rojizo pálido; el manto y los hombros presentan anchas líneas oscuras en los tallos; las rémiges son de un pardo oscuro, con bordes angostos de un pardo pálido en las barbas exteriores, excepto la primera que le tiene blanco; las rémiges secundarias posteriores, y sus tectrices en los bordes exteriores, son de un pardo de orin; las tectrices superiores de las alas presentan además en su extremidad un borde pardo de orin que forma una faja transversal; las rectrices son de un pardo oscuro, orilladas de un tinte pálido por fuera; las dos primeras de cada lado son blancas en la última mitad interior; y la primera blanca tambien en el centro de las barbas

exteriores. Los ojos son de un pardo oscuro; el pico y los piés de un rojizo de cuerno. La hembra tiene la cabeza y la parte posterior del cuello de color gris pardusco; la garganta y el buche rojizos; y en todas estas partes cruzan líneas negras en los tallos; la barba, la garganta y una faja que hay por debajo de las mejillas, limitada en su parte inferior por otra mas angosta, de un tinte amarillo, son de color rojizo de orin; las mejillas pardas.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Tambien el emberiza hortelano está diseminado por una gran parte de Europa; pero falta en algunas regiones ó al menos es muy raro. En Alemania habita continuamente las regiones inferiores del Elba, la Marca y Lausicia, Silesia, Westfalia y la Prusia Renana. Abunda en el sur de Noruega y en Suecia, y es comun en el mediodía de Europa. Tambien anida en Holanda,

Inglaterra, Francia, Rusia, en el centro de Asia hasta el Alatau, y en las montañas del Asia Menor y de Palestina. En invierno prolonga sus viajes hasta el oeste y este de Africa; habita con preferencia las montañas donde se eleva á la altura de 3,000 metros sobre el nivel del mar.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Las del hortelano apenas difieren de las de los otros emberícidos: habita las mismas localidades que el emberiza amarillo y observa el propio género de vida. Tiene un canto mas dulce, agradable y variado: su grito de llamada es *giff gerr*, y el de ternura *gi ó pik*, pronunciado con suavidad y muy bajo; cuando se le excita lanza un grito asaz penetrante y duro.

Su nido se asemeja al del emberiza amarillo: anida cerca del suelo, en el ramaje mas espeso de las breñas, en las cercas y los campos de colza. La hembra pone de cuatro á seis




Fig. 241.—EL EMBERIZA AMARILLO

huevos cada vez, cuyo color es rojizo pálido, blanco ó gris rojizo, con puntos y líneas de un tinte negro y gris azulado.

USOS Y PRODUCTOS.—Los romanos, que apreciaban mucho comer su carne, le conservaban en jaulas, é iluminábanlas por la noche con lámparas para que el hortelano, engañado con aquella luz artificial, comiese entonces y engordara mas pronto. En Italia, en el mediodía de Francia, y sobre todo en las islas de Grecia, existe todavía esta costumbre: allí se cogen dichos pájaros en masa, y cuando han engordado bastante, se matan y despluman, introduciéndolos en agua hirviendo; luego se colocan en barrilitos por partidas de doscientos ó cuatrocientos, con vinagre y especias. Así preparados se venden á subido precio.

EL EMBERIZA ROJIZO—EMBERIZA CAESIA

CARACTERES.—Esta especie difiere del emberiza hortelano, su congénere mas afine, por tener la cabeza y una faja transversal en el buche de color gris; la garganta es de un rojo de canela; las partes inferiores del mismo color, mas oscuro; las manchas blancas de la extremidad de las rectrices exteriores son mas pequeñas, y el pico de color rojo de coral.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Esta especie habita, junta con la anterior, el sudeste de Europa, sobre todo la Grecia, y tambien el Asia Menor, Palestina, el Asia occidental y el norte de Africa: algunos individuos han sido cazados en el sur de Alemania y en Helgoland.

EL EMBERIZA LOCO—EMBERIZA CIA

CARACTERES.—Esta ave es una de las mas bonitas de la sub-familia; tiene 0",18 de largo, por 0",24 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0",075 y la cola 0",076. La cabeza y la parte posterior del cuello son de un gris ceniciento; la garganta y el buche un poco mas claros; una ancha faja que hay sobre los ojos, las mejillas y la barba, de un gris blanquizo; otras dos fajas que limitan por arriba y por abajo las cejas, y una de las cuales se corre desde las fosas nasales hasta la nuca, mientras la otra se prolonga sobre la línea naso-ocular hasta las sienas, son negras, así como una tercera faja que partiendo de los ángulos de la boca se reúne con las dos anteriores en la extremidad; el manto y los hombros son de un pardo rojo de orin, y todas las plumas tienen tallos oscuros; la rabadilla, las tectrices superiores de la cola y las partes inferiores son de un rojo canela, mas claro en el centro del vientre; las rémiges, de un pardo oscuro, presentan en las barbas exteriores un ancho borde pardo rojizo; las secundarias exteriores y sus tectrices tienen otro análogo que se extiende tambien sobre la extremidad mas ancha; las tectrices superiores de las alas son de un gris oscuro, y las mas grandes negras, con puntas de un rojizo pálido que forman una faja transversal; las rectrices, excepto las dos del centro, son de un pardo oscuro; los dos exteriores de ambos lados blancas en la mitad interior; la primera de cada lado blanca tambien en las barbas exteriores. Los ojos son de un