

EL PARDILLO DE LAS MONTAÑAS—CANNABINA FLAVIROSTRIS

CARACTÉRES.—Esta especie tiene la parte superior de la cabeza, los hombros y el dorso de color pardo amarillo, con manchas y fajas de un pardo oscuro; la nuca y los lados del cuello presentan un tinte algo mas claro; las plumas de la rabadilla son de un rojo purpúreo sucio; las cejas y el espacio que hay debajo de los ojos de un rojizo oscuro con viso amarillento; la línea naso-ocular pardusca; la parte superior de las mejillas presenta manchas del mismo color; la garganta es de un amarillento rojizo oscuro; los lados del buche y del pecho del mismo tinte, mas claro, con manchas negras longitudinales; el centro del pecho y el vientre de un blanco amarillento ó blanco del todo; los muslos de un amarillento de orin; las barbas exteriores de las rémiges son de un pardo rojo; las cuatro primeras tienen estrechos bordes de un

blanco pardusco, y las siguientes mas anchos y blancos, siendo en todas los ángulos de este color; las tectrices superiores de las alas, de un pardo oscuro, presentan ángulos de un pardo amarillento de orin; las mayores tienen además un borde blanco amarillento de orin en la extremidad; las rectrices son de un pardo oscuro; las del centro están orilladas de pardo claro, y las otras tienen bordes blancos. Los ojos son pardos; el pico de un amarillo claro, y en la primavera amarillo de limon; los piés de un gris de cuerno. En la hembra falta el rojo de la rabadilla. La longitud del ave es de 0^m,13 por 0^m,225 de ancho de punta á punta de las alas; estas tienen 0^m,073 y la cola 0^m,065.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—El pardillo es uno de nuestros pájaros mas bonitos, y de los mas buscados para las habitaciones por su canto. «El pardillo, dice mi padre, es sociable, alegre, vivaz y bastante tímido: fuera del tiempo de la reproducción vive con sus semejantes en ban-



Fig. 250.—EL VERDERON DE LOS ALISOS

dados numerosas, y hasta he visto algunos reunidos en el periodo del celo. Llegado el otoño, y con frecuencia ya en el mes de agosto, se reúnen por centenares; en el invierno se mezclan con los verderones, los pinzones comunes, los de las montañas, y los gorriones; sepáranse en la primavera y se aparean, pero continúan viviendo unos cerca de otros en buena armonía.

»Durante el periodo del celo vaga el pardillo de un lado á otro: todas las primaveras veo llegar á mi jardín una hembra cuyo nido está situado á un cuarto de legua de distancia. Cuando la pardilla no cubre los huevos, acompaña al macho en sus peregrinaciones; y así es que se les ve casi siempre juntos.

»He observado á menudo con sentimiento el tierno amor que se profesan; cuando matan á uno, vuela el otro mucho tiempo á su alrededor, llamándole sin querer alejarse, y procurando llevarle consigo. Manifiestan el mismo amor á su progenie, y caen fácilmente en los lazos donde ven á sus hijuelos.

»Su vuelo es bastante rápido, y vacilante cuando el pájaro quiere posarse: muchas veces vuela el pardillo describiendo círculos; otras va rasando el suelo como para posarse, y elevándose de pronto, recorre todavía un gran espacio.

»En tierra salta con bastante ligereza: para cantar le gusta posarse en la rama mas alta de un árbol ó en el extremo de

alguna que se halle aislada; también se sitúa en las breñas, y con preferencia en los pinos y abetos mas altos.»

Supone mi padre que el canto del pardillo es bien conocido: limitase á decir que canta, ya esté posado ó volando, desde el mes de marzo al de agosto, y que los pequeños se dejan oír despues de su primera muda, ó sea en los meses de noviembre y diciembre. El grito de llamada del pardillo es un sonido equivalente á *gaek* ó *gaecker*, lanzado con fuerza y repetido varias veces; si observa algo sospechoso, sigue á este sonido un *lu* sonoro. El canto es de los mas notables, comparado con el de los demás pájaros; comienza de ordinario por un *goeckgaeck* mezclado con notas aflautadas, emitidas con brio. Por el mes de abril es cuando comienza la pardilla á fabricar su nido, y pone dos ó tres veces al año. Está situado en un bosquecillo aislado ó en el lindero del bosque, muy cerca del suelo, y se compone de ramitas, raíces, yerbas, etc., mas finas por dentro que por fuera; el interior está relleno principalmente de crines. Cada puesta es de cuatro ó cinco huevos, de color blanco azulado, con algunos puntos y rayas de un rojo pálido, rojo oscuro ó pardo canela. La hembra, única que los cubre, está sobre ellos trece ó catorce días; los padres alimentan á su progenie y permanecen largo tiempo con ella, particularmente con la última pollada. Mientras la hembra cubre, visítala el macho con frecuencia, se posa sobre un árbol próximo y canta á cuello tendido.

Al contrario de los pinzones, los pardillos se llevan bien durante la estación del celo: los machos cuyas hembras están cubriendo los huevos vuelan á menudo juntos y se reúnen para cantar, sin pelear nunca.

Mi padre refiere el hecho siguiente: «Descubrí un nido donde piaban los pequeños, y pude observar á mi gusto las costumbres de estos pájaros: estuvieron en aquel mientras carecieron de plumas, y solo se les oía cuando los padres les llevaban de comer. Apenas les salió la pluma no dejaron ya oír su voz, y adquirieron pronto bastante fuerza para volar. Cierta dia comenzaron todos á batir las alas, repitiendo estos

movimientos hasta por la tarde; y á la mañana siguiente, apenas rayó el alba, habían emprendido todos su vuelo. Manteniéndose ocultos en el follaje, cerca del nido, revoloteando de un lado á otro, hasta que por fin se alejaron en compañía de sus padres.

»Estaban estos bastante domesticados para no asustarse al verme, aun cuando fuesen conmigo algunas personas.

»Llevaban de comer á su progenie á cada doce ó diez y seis minutos: iban juntos siempre; posábanse en un manzano vecino; lanzaban ligeros gritos de llamada, y se dirigían despues al nido por el mismo lado invariablemente, recibiendo




Fig. 251.—EL GORRIÓN DOMÉSTICO

entonces cada hijuelo en el pico su parte de alimento. El macho era siempre el primero en hacer la distribución; esperaba luego á que la hembra practicara lo mismo, y en seguida emprendían los dos su vuelo, piando en señal de llamada: una sola vez llegó la hembra sin su compañero, y solo entonces dió de comer á su progenie primero que él.

»Antes de abandonar el nido quitaba la pardilla todos los excrementos; pero no los tiraba al suelo, sino que se los tragaba é iba á expelerlos despues mas lejos: el macho no se cuidaba tanto del aseo; solo una vez le vi imitar en esto á su compañera. La pardilla procede así para que los excrementos no indiquen dónde se halla su nido; otros pájaros hay que hacen lo mismo.

»Despues de haber comenzado á volar, los pequeños estuvieron largo tiempo con sus padres, que los conducían y alimentaban.»

Rara vez abandonan las pardillas sus huevos, y jamás su cria, á la que continúan alimentando aunque se halle en jaula. Los aficionados se aprovechan á menudo de tal circunstancia para evitarse la molestia de cuidar á los pequeños; y yo no sé de ningún caso en que los pardillos hayan rehusado cumplir con los deberes paternos. Se puede atraer á los padres á larga distancia de su antiguo nido alejando poco á poco la jaula donde se halla la cria; pero esto tiene un inconveniente: criados así los hijuelos, continúan siendo salvajes

y tímidos; mientras que se domestican muy pronto los que alimenta uno mismo.

El pardillo se alimenta casi exclusivamente de simientes; pero no se le considera en ninguna parte como muy dañino, á no ser que se le haga responsable de las fechorías que al parecer comete al comer las simientes de col, zanahoria, lechuga y otras plantas de nuestros jardines. Sin embargo, aliméntase sobre todo de las semillas de las malas yerbas, tal como las del llanten y diente del leon; agrádanle en particular las simientes de toda clase de col, cáñamo y zanahorias, y sobre todo de gramíneas.

CAUTIVIDAD.—El pardillo es con justo motivo uno de los pájaros mas buscados para las habitaciones: al cabo de poco tiempo profesa al hombre un cariño poco comun en los demás pájaros, y canta la mayor parte del año. Todos los verdaderos aficionados tienen pardillos: se mantienen fácilmente con granos de colza, y les gustan mucho las hojas de lechuga ó escarola.

Los machos que se cogen cuando son pequeños, aprenden con facilidad á repetir diversos aires y las canciones de otros pájaros; pero con la misma se acostumbran á emitir sonidos desagradables y se malean muy pronto. Mi padre tenía un pardillo macho, el cual imitaba el canto del pinzon tan admirablemente, que se le hubiera tomado por uno de estos pájaros; también poseyó otro que cantaba como el ca-

nario. Naumann habla de pardillos que aprendieron el canto del jilguero, de la alondra y del ruiseñor.

LOS SICERINOS—LINARIA

CARACTERES.—Los sicerinos recuerdan los pardillos y se asemejan á los verderones: tienen el pico muy prolongado, cónico, comprimido lateralmente y de punta delgada; la mandíbula superior es un poco mas larga que la inferior; las fosas nasales, pequeñas y redondas, se hallan en la base del pico y están rodeadas de plumas cerdosas bastante largas y espesas; los piés son fuertes y cortos, con dedos provistos de uñas grandes, muy corvas y afiladas; las alas, de longitud regular, tienen las tres primeras rémiges mas largas; las rectrices son de mediana longitud, pero las del centro mucho mas cortas, de modo que la cola presenta una sesgadura bastante profunda. En el plumaje, muy abundante, predomina el color pardo pálido; la cabeza de los machos tiene siempre, sin embargo, un color rojo mas ó menos vivo.

EL SICERINO VULGAR—LINARIA VULGARIS

CARACTÉRES.—Esta especie es la mas comun del grupo. El borde de la frente y las plumitas cerdosas de las fosas nasales son de un gris pardo oscuro; la línea nasocular, una mancha oval de la barba y la parte superior de la garganta de un pardo intenso; la frente y la coronilla de un rojo de carmin muy vivo; las plumas de esta region de un negro gris en la base; el occipucio y el resto de las regiones superiores de un pardo de orin pálido con fajas longitudinales de un pardo oscuro; las plumas de la rabadilla son de un rojo de carmin pálido, con bordes blanquizcos en los lados y tallos de un pardo claro; las tectrices superiores de la cola, de color pardo oscuro, tienen bordes blancos amarillentos en los lados; las mejillas y la region de las orejas son de un pardo de orin con líneas mas oscuras; la garganta, el buche y los lados del pecho de un rojo de carmin; las plumas del centro de la garganta están orilladas de blanquizco; el resto de las partes inferiores es blanco, los costados de un pardusco de orin pálido con anchas fajas longitudinales oscuras, poco marcadas; las rémiges, de un pardo oscuro, tienen en sus barbas exteriores un angosto borde pardo, mas ancho y claro en las últimas rémiges secundarias; las tectrices pequeñas y las mas grandes presentan en la extremidad un ancho borde blanco rojizo, que forma dos fajas de color claro en las alas; las rectrices son de un pardo oscuro, con un estrecho borde rojizo de orin en las barbas exteriores y uno ancho mas extenso en las interiores. Los ojos son de un pardo oscuro; la mandíbula superior de un azul de cuerno; la inferior amarilla, y los piés de un pardo gris. Las hembras y los polluelos tienen muy poco color de carmin en el pecho y en la rabadilla; el buche y el pecho son de un pardusco de orin, con tallos oscuros; la placa roja de la cabeza es mas pequeña y de color menos vivo. La longitud del ave es de 0^m,13, por 0^m,22 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0^m,07 y la cola 0^m,06.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El área de dispersion de esta ave comprende la zona fria de ambos mundos, hasta donde llega la vegetacion arbórea; desde aquí se traslada todos los años á las regiones meridionales, presentándose á veces por bandadas innumerables en Alemania.

EL SICERINO DE LAS MONTAÑAS—LINARIA RUFESCENS

CARACTÉRES.—Esta especie se caracteriza por tener

el occipucio, los lados del cuello, el dorso, la rabadilla y los costados de un pardo de orin amarillento con manchas longitudinales de un pardo oscuro; la línea naso-ocular y una mancha de la garganta son de un negro pardo; la frente y la parte anterior de la coronilla de un rojo de carmin oscuro; la barbilla y la region superior del pecho de un color sonrosado pálido, con bordes blancos en las plumas; el resto de las partes inferiores blanquizco, con viso sonrosado; las tectrices inferiores de la cola tienen manchas longitudinales negruzcas; las alas y las rectrices, de un pardo negruzco, están orilladas en sus barbas exteriores de una estrecha faja de color blanco sucio; las últimas rémiges secundarias, las plumas de los hombros y las grandes tectrices de las alas presentan anchos bordes de color de barro, cuyos bordes forman dos fajas bien marcadas en las alas. Los ojos son de un pardo oscuro, el pico amarillento, mas oscuro en la punta y en los bordes, y los piés negros. La longitud de esta especie es de 0^m,115, por 0^m,12 de ancho con las alas extendidas.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El sicerino de las montañas anida en Escocia y en los Alpes orientales, sobre todo en los de Salzburgo, donde es muy frecuente, por ejemplo cerca de Tamsweg y Lungau; Tschusi fué el primero en darnos noticias sobre esta especie, que, segun dice, habita de continuo en los Alpes.

EL SICERINO DE PICO LARGO—LINARIA HOLBOELLI

CARACTERES.—El sicerino de pico largo se asemeja por su color y tamaño á la especie comun, pero distínguese por su pico mucho mas grande, y sobre todo mas largo, de color vivo de naranja con arista negra, cubierto en una tercera parte por las plumitas de las fosas nasales.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—La patria de esta especie, que algunos ornitólogos no consideran ni siquiera como variedad, es la Groenlandia; desde aquí el ave emigra á veces por bandadas á Europa.

EL SICERINO BOREAL—LINARIA BOREALIS

CARACTERES.—El sicerino boreal, llamado tambien sicerino gris, tiene el mismo tamaño del pardillo y su color en general se asemeja al del sicerino vulgar, pero siempre mucho mas claro, porque los bordes parduscos de orin de las plumas de este tiran en aquel mas á un blanco pálido. La rabadilla y las partes inferiores son casi de un solo color blanco; las últimas tienen en sus lados algunas líneas finas de color oscuro en los tallos; la garganta, el buche y el pecho del macho presentan en invierno y la primavera un ligero lustre rojo de carmin; las plumitas de las fosas nasales cubren mas de la mitad de la base del pico, á lo cual se debe que este parezca en extremo corto y mas alto que largo. Los ojos son de un pardo oscuro; la mandíbula superior de un negro de cuerno; la inferior amarilla en invierno, y los piés de un pardusco oscuro.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El área de dispersion del sicerino boreal se extiende desde el Petschora por todo el norte de Asia y América hasta Groenlandia, pero tambien esta ave visita la Alemania en inviernos rigurosos, á veces por bandadas mas ó menos numerosas.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Al recorrer los inmensos bosques de abedules de los países del norte, se comprende porqué estos pájaros no llegan regularmente y en el mismo número á nuestros países todos los inviernos. No necesitan emigrar mientras encuentran abundantes los frutos de dichos árboles, que constituyen su alimento prin-

cipal; solo cuando carecen de ellos se ven precisados á dirigirse hácia otros países. Por numerosas que sean las bandadas que á veces se ven entre nosotros, no se las puede comparar con las que pasan todo el año en su patria, puesto que en el norte encuentran estos pájaros mucho mejor todas las condiciones necesarias para su existencia. Los bosques de abedules cubren extensiones de varios centenares y hasta miles de miriámetros cuadrados, y ha de ser el verano muy malo para que aquellos séres no encuentren lo bastante para su alimento.

Necesita este pájaro dichos bosques para vivir, como el pico cruzado las coníferas: en el invierno encuentra granos y en verano insectos, principalmente moscas. Yo ví muchos al norte de Tromsø; vivian en familias con sus pequeños, que hacia poco habian dejado el nido, y los alimentaban con insectos sus padres; no eran fáciles de observar, ni conseguí adquirir una cria. Los mosquitos llenaban de tal modo el bosque, que no se podia cazar sin sufrir grandes molestias y tormentos de que no es fácil formarse una idea. En el lugar mismo donde se hallaban aquellos pájaros, todos los árboles y matorrales estaban materialmente rodeados de una nube de moscas; el que se aventuraba á cazar allí, era acometido al momento, y sufría picaduras tan dolorosas, que no podia seguir adelante. En cuanto á los pájaros, encuentran allí fácilmente de qué alimentarse en verano, y se necesitan circunstancias muy excepcionales para que padezcan hambre en el invierno: aquellos insectos y los frutos del abedul son muy suficientes en ambas estaciones para suministrarles cuanto les pueda hacer falta.

Lo que hemos dicho basta para explicar que hasta ahora sean tan escasos nuestros informes sobre la vida de este pájaro en libertad. Poco despues de llegar por bandadas á los sitios donde anida, disuélvense estas mas ó menos para dar principio á la construccion del nido. En el centro de la Escandinavia elige los bosques elevados de las montañas; en el norte anida tanto en las alturas como en las tierras bajas, con tal que los abedules constituyan la mayoría de los árboles. El nido se halla casi siempre á poca altura del suelo, en alguno de los abedules que tienen forma de arbustos, y por su construccion se parece mas al de nuestro pardillo; tiene la forma de una cacerola, cuyo fondo se compone de ramitas y las paredes de tallos, musgo y pelos, mientras que el interior está relleno de plumas. La puesta se compone cuando mas de siete huevos, de 0^m,017 de largo, por 0^m,014 de grueso, de color verde claro con manchas y puntas de un rojo opaco y pardo claro. El macho canta, segun Collet, con mucha aficion durante el período del celo, pero casi siempre volando. Es probable alterne con la hembra para cubrir los huevos, ayudándole en la cria de los polluelos, á los que alimenta solo con toda clase de insectos. Digno de notar es que aun durante la incubacion el ave demuestra su inconstancia, presentándose muchos años en gran número y por bandadas, mientras que en otros escasea y solo se la ve aislada.

No se sabe aun por qué conceptos difiere su reproduccion de las de otras especies. Luebbert, que en verano vió aun sicerinos en la montaña de Glatz y en el Riesengebirge, y creyó haber recibido los huevos de una pareja, habla sin duda del sicerino de las montañas. Debemos comprender á este tambien entre las aves que anidan en Alemania, pues Yocher encontró sus nidos en los Alpes de Salzburgo. En las regiones llanas y formadas de colinas en Alemania, el sicerino vulgar se presenta á principios de noviembre para pasar allí el invierno, á veces por grandes bandadas, y no siempre en los años que tambien entre nosotros comienzan con un invierno riguroso. Reúnese regularmente con el

verderon y recorre con este el país, albergándose de noche en las espesuras espinosas. Wagner asegura haber visto varios individuos de una bandada que se precipitaron de noche sobre la nieve para reposar en ella, y asegura además haber cogido algunos en aquella ocasion.

Mientras se halla entre nosotros el sicerino boreal se alimenta preferentemente del fruto del aliso y del abedul, y de granos oleaginosos.

En los primeros dias de su llegada no parecen conocer estos pájaros la malignidad del hombre, pues avanzan hasta los pueblos, buscan su alimento, y no les intimida la proximidad de su enemigo: cuando se les ha dado caza algunas veces, proceden con mas prudencia, sin ser por ello tímidos.

Este pájaro se distingue por lo alegre, lo vivaz y ágil; siempre está en movimiento; trepa mejor que los otros fringilidos y rivaliza por tal concepto con el pico cruzado, y hasta con los paros. Curioso de ver es el ramaje filiforme de un abedul cubierto por una bandada de tan bonitos pájaros: se suspenden tomando las mas variadas posiciones, y pican los frutos con verdadero frenesí; no es la tierra extraña para ellos; bajan mas á menudo que sus congéneres y saltan con mucha ligereza. En su rápido vuelo trazan líneas onduladas: para franquear espacios sin árboles, remóntanse por los aires á bastante altura; mientras que en los sitios cubiertos de bosque, permanecen cerca del suelo. Su grito de llamada podria traducirse por *tschelttschek*: le lanzan en el momento de emprender su vuelo, y á menudo va seguido de una especie de *main* muy suave: el canto se compone de estos dos sonidos, enlazados por un silbido fuerte.

Es muy sociable este pájaro con sus semejantes y otras especies afines: cuando se ha formado una bandada no se separan ya; todos los individuos que la componen llaman á gritos á los que se alejan un poco ó pasan cerca. Asíanse con los verderones, y si no los encuentran, con los pardillos vulgares y los gorriones, viviendo todos en muy buena inteligencia, sin pelear nunca.

CAZA.—No son difíciles de coger estos pájaros en un lazo bien dispuesto: su instinto de sociabilidad les pierde, pues cuando uno de ellos queda preso atrae á los demás, que sufren la misma suerte. Para apoderarse del primero se fijan en el extremo de una pértiga larga y flexible unas varitas de liga, con las que se tocan las alas del animal mientras come; para manejar aquella se necesita alguna destreza; pero como el pájaro es bastante estúpido, se deja coger por tan sencillo medio. Con las redes quedan presos muchos individuos, y se da el caso de que vuelvan á buscar á sus compañeros cautivos los que escaparon, desliziándose debajo de ellas: en varios puntos se les caza solo para comer su carne.

CAUTIVIDAD.—Los individuos que se enjaulan se domestican muy pronto y se contentan con el régimen mas sencillo. Seducen á la vista por su agilidad y sus movimientos; no tardan en trabar amistad con los otros pajarillos, y los acarician continuamente.

LOS GORRIONES—PASSER

CARACTERES.—Los gorriones son fringilidos de estructura sólida, tronco corto, pico de longitud regular y grueso; piés fuertes y uñas cortas y endebles; las alas son obtusas; las rémiges segunda, tercera y cuarta forman la punta; la cola es corta, ó cuando mas de longitud regular y apenas sesgada en su extremidad; el plumaje es abundante.

EL GORRION COMUN—PASSER DOMESTICUS

CARACTERES.—Esta especie es la mas conocida del