

sus movimientos, pero con el tiempo llegan á cansar tanto como todos sus congéneres.

LOS LAGONOSTICTIDOS —LAGONOSTICTA

CARACTÉRES.—El género de los lagonostictidos ó senegalís se caracteriza por el pico relativamente largo y comprimido lateralmente; la cola es corta y redondeada; el plumaje de color de sangre con puntos blancos.

EL SENEGALÍ ENANO—LAGONOSTICTA MINIMA

CARACTÉRES.—El senegalí enano tiene el plumaje de color purpúreo de vino; el manto y los hombros son de un pardo de corzo, presentando cada pluma en su extremidad un borde purpúreo; los lados del pecho tienen puntitos blancos; las tectrices inferiores de la cola son de un pardusco pálido; las rémiges y retrices pardas, con bordes purpúreos en las barbas exteriores. La hembra tiene casi todo el plumaje pardo de corzo; solo en la línea naso ocular y en la rabdilla hay algunas rayas y puntos blancos en el pecho. Los ojos son de un pardo oscuro; el pico rojo, con arista y barbilla negra, y los piés rojizos. La longitud de esta especie es de 0",09, por 0",12 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0",045 y la cola 0",035 de largo.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El senegalí enano habita toda el Africa central, desde la costa occidental hasta la oriental y desde los 22° de latitud norte hasta los 25° de latitud sur.

Hartmann, que recorrió algunos años despues que yo las orillas del Nilo, considera que esta especie sustituye al gorion doméstico; efectivamente puede considerársela como tal. Existe en todos los pueblos del sur de la Nubia y del Sudan oriental: encuéntrase en las chozas aisladas en medio de los bosques; y es uno de los primeros pájaros de la zona tropical que se ven al dirigirse desde Egipto al Sudan. Hay una especie de nectarinidos y loxias (*hypochera ultramarina*) que remonta mas que él hácia el norte.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Se encuentran á veces cerca de los pueblos innumerables bandadas de estos pájaros, que se reúnen con otros á menudo; pero tambien se les ve léjos de toda vivienda humana, en las estepas y las montañas, hasta una altitud de 1,500 metros.

El senegalí enano se distingue, no solo por la belleza de su plumaje, sino tambien por su carácter alegre y la gracia de sus movimientos. Mientras brilla el sol no descansa un minuto; solo algunas veces, cuando el calor es fuerte, busca entre el espeso follaje de los verdes árboles un refugio contra los abrasadores rayos del astro del dia. Vuela sin cesar de rama en rama; trepa rápidamente á lo largo de los troncos de los árboles, y corre con agilidad por el suelo. Apenas habrá un individuo en el órden de los pájaros que pueda rivalizar con él en cuanto á ligereza para volar, y seguramente no hay ninguno tan activo.

El pequeño senegalí muda el plumaje á fines de la estación seca; y á principios de setiembre, es decir, al caer las primeras lluvias, se prepara para la reproducción. Entonces se dispersan las bandadas para aparearse; macho y hembra penetran osadamente en los pueblos y ciudades, buscando un abrigo que les convenga bajo el tejado de paja de una cabaña ó en la choza de arcilla de un indígena. En un hoyo amontonan desordenadamente yerbas secas, y practican en el centro un agujero redondeado irregular; en caso de necesi-

dad anidan los pequeños senegalís en los árboles ó en tierra. En los bosques de las márgenes del Nilo Azul ví yo por el mes de enero una hembra que volaba inquieta alrededor del mismo sitio; sospeché que habria allí algun nido, y efectivamente, encontré en tierra, en medio de unas yerbas secas. Los tres á siete huevos son blancos, lisos y redondeados, de 0",014 de largo por 0",011 de grueso.

El macho es igualmente muy cariñoso con su hembra, pendenciero para con un rival y cubre los huevos alternativamente con aquella. Los pequeños salen despues de trece dias y se crían con simientes blandadas antes en el buche.

A causa del bonito plumaje y del gracioso ser de estos pájaros se ha hecho una tentativa de aclimatarlos en Cayena, pero sin obtener un resultado favorable, al menos que yo sepa.

LOS PLOCEINOS — PLOCEINÆ

CARACTERES.—Estos pájaros son los mayores de su familia y constituyen la mayoría de esta. Los mas de ellos tienen formas prolongadas y se caracterizan además por su pico cónico, relativamente largo y delgado, aunque fuerte, así como por sus tarsos largos y altos; los dedos son largos y están provistos de uñas fuertes y muy corvas; las alas son largas, pero obtusas; la cuarta rémige suele ser la mas larga; la cola corta y ligeramente redondeada. Fijándose en estos caracteres, difícil es confundir esos pájaros con otros congéneres de la misma familia. Un amarillo ó amarillo rojizo y negro son los colores predominantes de su plumaje, pero hay tambien ploceinos casi negros, rojos, grises pardos y blanquizcos. La cabeza ó la cara suelen ser de color oscuro; el dorso casi siempre verdoso ó amarillo rojizo, y las regiones inferiores amarillas ó de un rojo claro ú oscuro.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—En las regiones que habitan, encuéntrase en gran número, y se distinguen por su instinto sociable, tan extraordinariamente desarrollado, que aun en la época de la incubacion no se separan. Despues del período del celo forman grandes bandadas, de miles de individuos á veces; recorren largo tiempo el país; mudan su plumaje y vuelven luego al árbol que fué la cuna de sus pequeños, ó cuando no, muy cerca de él. Allí reina entonces durante varios meses la mayor actividad; la construcción de los nidos exige mucho tiempo, siendo tan caprichosos, si tal puede decirse, estos pájaros, que con frecuencia destruyen uno, casi terminado, para hacer otro.

En todo el interior del Africa constituyen los nidos de los tejedores un magnífico adorno para ciertos árboles; y obsérvase que los alados artistas prefieren sobre todo aquellos cuya copa sombrea en parte una corriente. A menudo se ven estos árboles completamente cubiertos de nidos.

Las colonias de ploceinos se podrian considerar como características del interior de Africa, de la India y de sus islas, pues comunican á los árboles un sello especial. Estos pájaros anidan siempre en gran número; raro es hallar un nido aislado; por lo regular se ven de veinte á treinta, y hay árboles que están enteramente cubiertos, segun he dicho antes. Estas construcciones son bastante sólidas para resistir durante años enteros el viento y la lluvia; de donde resulta que en un mismo árbol se encuentran al lado de los nidos de la colonia actual, los de tres ó cuatro generaciones anteriores.

En toda el Africa central se ven estos nidos, lo mismo en la montaña que en la llanura, así en los bosques mas desiertos como en la inmediacion de los pueblos.

Aquellas construcciones son muy artísticas y se componen de ramitas y raíces, ó mas bien de tallos de yerbas muy flexibles, entrelazados y hasta tejidos, pareciendo que el pájaro los aglutina con su saliva.