

apareció en la espesura; el macho no se hallaba cerca del nido; vagaba á la distancia de un cuarto de legua, en el bosque, dejando oír su canto sencillo, sostenido y un poco lastimero, cuya parte esencial, según dicho naturalista, podría expresarse por *di, di, teritsidé*.

LOS ICTÉRIDOS—ICTERIDÆ

CARACTÉRES.—Los ictéridos son los tejedores de América, pájaros cuya talla varía entre la de la corneja y la del gorrión. Los ictéridos tienen el cuerpo prolongado, pero grueso; el pico cónico, recto, redondeado, robusto en la base, sin escotadura, y con arista que avanza sobre la frente en forma de escudo; las alas medianas y obtusas, con la cuarta rémige mas larga; la cola mediana, redondeada ó escotada, cubierta por las alas en mas de la mitad de su extensión; los tarsos robustos como también las uñas; el plumaje blando y brillante, siendo los colores dominantes el negro, el amarillo y el rojo. En algunas especies la cabeza está provista de un moño; otras tienen las mejillas desnudas.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—También los ictéridos, de los cuales se conocen unas ciento diez especies, habitan exclusivamente en América; mas de las cuatro quintas partes son propios del sur y centro de este continente; pero también se han diseminado por el norte hasta el círculo polar.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Estas aves representan en el nuevo mundo á los estorninos del antiguo continente, pero también se parecen á los cuervos y á varios fringílicos. Todas las especies son sociables, alegres, vivaces y buenas cantoras. Habitan en los bosques y se alimentan de pequeños vertebrados, insectos, conchas, frutas y simientes. Las unas ocasionan á menudo perjuicios, mientras que las otras reportan gran utilidad. Sus nidos, que son tan bonitos, y quizás mas que los de los tejedores, hállanse colgados por lo regular en los árboles; pero las especies de un género no construyen nidos ni cubren sus huevos, pues confían estos últimos al cuidado de otras aves.

Para mayor claridad establecemos también en esta característica familia de América varias subdivisiones.

LOS AGELAINOS—AGELAINÆ

CARACTÉRES.—En este primer grupo figuran los pájaros mas pequeños de la familia. Su pico tiene arista recta; los bordes de las mandíbulas se recogen por dentro, y las comisuras son angulosas: el pulgar está provisto de una uña encorvada. El plumaje de los pequeños difiere mucho del de los adultos y se asemeja al de algunos embericidos.

LOS DOLICONIX—DOLICHONYX

El sér que sirve de base á este género es mitad pájaro y mitad ictérido: cuando no se ha tenido ocasión de observarle en vida, no se sabe en qué orden colocarle, y por consiguiente no tiene nada de extraño que ciertos naturalistas le hayan clasificado entre los embericidos. Mi opinión es que se asemeja mas bien á los ploceidos.

CARACTÉRES.—Los doliconix, ó comedores de arroz, se caracterizan por tener el pico de mediana extensión, fuerte, cónico, comprimido lateralmente, con la mandíbula superior mas angosta que la inferior y los bordes doblados por dentro, como en los emberizas. Tienen el cuerpo reco-

gido, la cabeza voluminosa y las alas de mediana extensión, siendo la segunda penna la mas larga. La cola es regular, con pennas muy puntiagudas; los tarsos bastante largos y fuertes, y el plumaje compacto y brillante.

EL DOLICONIX ORICÍVORO—DOLICHONYX ORIZIVORUS

CARACTÉRES.—Este pájaro (fig. 8), conocido en el comercio con los nombres de *charlatan* ó *boblink*, tiene 0",18 de largo por 0",26 de ala á ala; esta plegada mide 0",09 y la cola 0",06. Su plumaje varia mucho, según el sexo y la estación: en el período del celo tiene el macho la parte anterior y superior de la cabeza negras, y lo mismo la cara inferior del cuerpo y la cola; la espaldilla y la rabadilla, blancas, con visos amarillentos; las rémiges y las cobijas superiores de las alas negras orilladas de amarillo; el iris pardo; la mandíbula superior del mismo matiz, pero mas oscuro; la inferior de un gris azulado, y las patas de azul claro.

La hembra, algo mas pequeña que el macho, tiene el lomo pardo amarillento claro, siendo los tallos de las plumas oscuros; el vientre de un amarillo gris pálido; los costados listados de negro; las mejillas pardas; una línea sub-ocular amarilla; las pennas de las alas y de la cola, mas claras que en el macho. Este último reviste en invierno el mismo plumaje que la hembra, poco mas ó menos: en los pequeños los matices son mas empañados y tiran mucho mas al gris.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—El doliconix oricívoro llega todos los veranos á la América del norte, de donde parte en invierno para dirigirse á la América central, á las Antillas, y acaso á la parte norte de la América del sur. Parece, sin embargo, que no avanza hasta el Brasil.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—En el Estado de Nueva-York se ven llegar á principios de mayo bandadas de doliconix, que no tardan en cubrir literalmente todo el país. Es imposible, según Audubon, encontrar un solo campo que no esté habitado por estos pájaros; y por lo mismo son aborrecidos de los cultivadores; mas para aquel que no tiene contra ellos motivos de queja, ofrecen los doliconix interesantes particularidades. Son muy sociables, hasta en la época del celo; las parejas anidan unas cerca de otras; el nido está situado en el suelo, en medio de los tallos de los cereales. Mientras que las hembras ponen y cubren, vagan los machos por los aires cantando, contéstales los otros, y bien pronto se ve toda la bandada imitarles, subir y bajar, produciendo los mismos sonidos. Con justa razón elogian los americanos su canto; es muy variado, y las notas tan rápidas y mezcladas, que muchas veces se cree estar oyendo á media docena de pájaros, cuando no es mas que uno el que produce los sonidos. Wilson dice que se puede formar una idea de este canto, tocando rápidamente las teclas de un piano.

El doliconix es un pájaro muy vivaz en todos sus movimientos; por la tierra se desliza, mas bien que salta; vuela con facilidad y rapidez, y trepa como un hortelano por los tallos de los cereales.

A fines de mayo se encuentran en el nido de este pájaro de cuatro á seis huevos blanquizcos de 0",022 de largo por 0",16 de grueso y cubiertos de puntos compactos de un azul oscuro, que se mezclan irregularmente con otros negruzcos; cada pareja solo anida una vez al año, si no le quitan los huevos. Los hijuelos se alimentan de insectos; crecen con mucha rapidez; abandonan el nido, y se reúnen con sus semejantes para formar grandes bandadas. Entonces aparece el doliconix bajo otro aspecto: ya no canta; el macho pierde su hermoso plumaje; y abandonando las parejas su acantona-

miento, andan errantes por el país. Aquella es la época de las devastaciones; los doliconix vuelan de campo en campo; los cubren casi del todo, se comen los granos mas sazonados y mejores de los cereales, ocasionando grandes destrozos. Los cultivadores les hacen la guerra sin tregua ni descanso, y matan miles de individuos, pero todo es inútil, pues la devastación sigue su curso. Ahuyentados de un campo, se trasladan á otro, y una vez saqueados los países del norte, van al sur á continuar su obra destructora. Así viven durante algunas semanas, pasando el día en el campo y durmiendo por la noche en los bosques de cañaverales. Después se marchan poco á poco hácia el sur.

CAUTIVIDAD.—El boblink acepta en la jaula el alimento apenas se le ofrecen, y pronto se le ve tan alegre y contento como en libertad; trepa, ejecuta varios ejercicios y canta del modo mas divertido, pero solo se conserva algunos años cuando no se le da demasiado de comer.

LOS AGELAYOS Ó TRUPIALES—AGELAIUS

CARACTÉRES.—Los agelayos tienen el pico en forma de cono prolongado, algo comprimido lateralmente, muy agudo, y de arista que se prolonga en punta sobre la frente; el cuerpo es grueso; las alas de un largo regular, y mas prolongadas las pennas segunda y tercera; la cola es bastante larga y redondeada, y el plumaje blanco y brillante.

EL AGELAYO ENCARNADO Ó DE CHARRETERAS ROJAS—AGELAIUS PHŒNICEUS

CARACTÉRES.—Es casi tan común este pájaro (fig. 9) como el doliconix oricívoro: cuando está en celo es negro oscuro el plumaje del macho, con las espaldillas de un hermoso rojo escarlata; los ojos de un pardo oscuro; y el pico y las patas de un negro azulado. El pájaro mide 0",22 de largo por 0",36 de punta á punta de ala; esta plegada tiene 0",12 y la cola 0",05.

La hembra tiene el lomo pardo negruzco y el vientre pardo agrisado, con las plumas orilladas de gris leonado claro, con manchas longitudinales oscuras.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Este pájaro es común en toda la América del norte.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Por sus costumbres se asemeja mucho al doliconix; todos los veranos se reproduce en los Estados del norte, y solo permanece algún tiempo en los del sur.

Audubon nos ha dado interesantes detalles acerca de las costumbres de este trupial; de ellos tomaremos algunos.

A principios de la primavera, los agelayos encarnados abandonan los Estados del sur, donde pasan el invierno, y se dirigen hácia el norte formando bandadas mas ó menos numerosas. Los machos abren la marcha cantando, como para invitar á las hembras á que les sigan; detienen de vez en cuando sobre los árboles que encuentran, ladean la cola, alisan su plumaje y dejan oír su voz clara y sonora, principalmente por la mañana, antes de abandonar el sitio donde han pasado la noche, pues solo viajan de día.

Apenas llegan las hembras, comienzan á poner: varios machos persiguen á una hasta que cualquiera de ellos la conquista, y entonces le presta su ayuda para construir el nido. Una vez aisladas las parejas, buscan un sitio conveniente á orillas de algún estanque ó en una pradera pantanosa. Un pequeño matorral, una espesura de yerbas ó de juncos es lugar á propósito para formar el nido, que consiste en una masa de cañas secas por fuera, y relleno interiormente de

yerbas esparcidas y de crines. Cada nido contiene de cuatro á seis huevos de color pardo claro, cubiertos de manchas oscuras diseminadas. «En aquel momento, dice Audubon, puede apreciarse la fidelidad y el valor del macho: vela cuidadosamente por su compañera; si alguien se aproxima, le rechaza con sus gritos amenazadores y de angustia; á menudo se acerca al hombre que voluntaria ó involuntariamente turba su tranquilidad, ó bien se posa en una rama sobre el nido, y lanza gritos tan planíderos, que se necesita ser muy cruel para no dejar tranquilos á los pobres pájaros.»



Fig. 8.—EL DOLICONIX ORICÍVORO

Cuando los hijuelos llegan á ser grandes, se reúnen á millares con sus semejantes, y vagan de un punto á otro, mientras que los padres se ocupan en la segunda incubación. Los primeros hijuelos comienzan á volar á fines de junio, y los de la segunda puesta á principios de agosto. Cuando la cosecha está casi madura, los agelayos caen sobre los campos, y en vano procura el hombre ahuyentar las bandadas, pues el inmenso número de pájaros inutiliza sus esfuerzos. Cuando los granos están del todo maduros, los trupiales abandonan los campos; reúnen en las praderas y á orillas de las corrientes; mézclanse con los tordos y los doliconix, y constituyen bandadas tan numerosas que parecen nubes. No es dado formar una idea de los pájaros que entonces se matan. Audubon asegura que una vez cayeron cincuenta de un solo tiro, y dice haber matado él mismo varios centenares en medio día; mas á pesar de todo no parece disminuir el número de individuos. A semejanza de los estorninos, estos agelayos se retiran á la caída de la noche á las espesuras de cañas para dormir allí libres de la persecución de sus enemigos.

CAUTIVIDAD.—A causa de su belleza se conserva á menudo este pájaro en cautividad; tiene pocas exigencias, canta mucho, es alegre, vivaz y pacífico, á lo menos cuando sus compañeros tienen igual fuerza; y no hay adorno mas grande en una pajarera, pues no solo cautiva la vista, sino tambien el oido. No se ha reproducido hasta ahora en la jaula, lo cual prueba que aun no le hemos proporcionado todas las condiciones necesarias para su bienestar.

LOS MOLOBROS—MOLOBRUS

CARACTÉRES.—Este género se distingue por el pico corto, cónico, muy puntiagudo, de arista recta y borde bucal muy entrante; alas bastante largas y puntiagudas, cuyas tres primeras rémiges tienen igual extension; cola de un largo regular, truncada en ángulo recto, con pennas que se ensanchan un poco hácia su extremidad; patas delgadas de mediana altura; y plumaje blando, de un azul de acero con reflejos metálicos en el adulto y pardo ó pardusco en el pequeño.

EL MOLOBRO DE LOS GANADOS—MOLOBRUS PECORIS

CARACTERES.—El molobro de los ganados (fig. 10) representa la especie mas conocida: el macho adulto es un hermoso pájaro, aunque de plumaje muy sencillo. Tiene la cabeza y el cuello de un color pardo de orin, y el resto del cuerpo negro pardusco, con reflejos azulados en el pecho, y azules y verdes en el lomo. El iris es pardo oscuro; el pico y las patas de un negro pardusco. Este pájaro mide 0",19 de largo por 0",30 de punta á punta de alas; estas miden 0",11 y la cola 0",08.

La hembra es un poco mas pequeña que el macho; tiene el plumaje de color pardo de orin bastante uniforme, con el lomo algo mas oscuro que el vientre.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—Habita una gran parte de la América del norte, donde es muy comun, al menos en ciertos países.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Prefiere permanecer en los pantanos y los pastos, en medio de los bueyes y caballos; pasa la noche en las breñas y los cañaverales á orillas de los rios. Aparece en el norte de los Estados-Unidos á fines de marzo ó á principios de abril, y no se va hasta fin de setiembre, por lo regular en compañía de otras aves.

Se alimenta lo mismo que sus congéneres, y tambien tiene la costumbre de posarse en el lomo de los animales de cuernos para comer los parásitos que allí se fijan.

Todo esto apenas seria digno de mencion, despues de lo dicho anteriormente, si este pájaro no se distinguiese por otro concepto. Tanto su especie como las demás del género no cubren por sí mismas los huevos, sino que los confian al cuidado de otras aves; desconocen tambien, como nuestro cucillo, las leyes del matrimonio, y son poligamas. Durante el período de la reproduccion se las ve reunidas lo mismo que en las demás estaciones, unas veces en número par y otras en impar; de modo que algunas bandadas tienen mas hembras que machos y vice-versa.

«Cuando una de las primeras se aleja de la bandada, dice Potter, no se nota su ausencia; ninguno de sus compañeros le acompaña ni se contrasta; ningun grito de amor ni de ternura saluda su vuelta. Los molobros no manifiestan profesarse ningun afecto; viven con la mayor independencia, y cada cual hace lo que quiere. Cuando se les observa durante la estacion del celo, se puede ver cómo la hembra abandona á su compañero, vaga de un lado á otro, y se detiene al fin en cualquier punto desde donde pueda vigilar los actos de los

demás pájaros. Cierta dia vi una hembra que se alejaba asi, como si buscara alguna cosa; curioso por averiguar lo que trataba de hacer, monté á caballo y la seguí; de vez en cuando la perdía de vista, mas no tardaba en aparecer de nuevo. Dirigiase hácia todas las arboledas, registrándolas atentamente, sobre todo en los puntos donde acostumbran á formar su nido los pajarillos, y al fin se precipitó en una espesa breña de alisos y de zarzas; estuvo allí cinco ó seis minutos y salió despues para ir á reunirse con sus compañeros. En la breña encontré el nido de un amarillito (*Sylvia marylandica*)



Fig. 9.—EL AGELAYO ENCARNADO

que contenia un huevo de esta especie, al lado del cual estaba el del molobro de los ganados. Volando siempre de un punto á otro, aquella hembra se dirigió hácia un cedro, y la vi desaparecer varias veces en medio del ramaje, antes de decidirse á salir del todo para alejarse. Allí encontré un gorrión en su nido, y no me cabe duda que la hembra hubiera puesto allí otro huevo á no hallarse aquel ocupado. Yo creo que el pájaro se introduce algunas veces en un nido valiéndose de la fuerza, y que ahuyenta á los individuos que encuentra; en caso de apuro, trata de obtener por la astucia lo que no es fácil consiga de otro modo. La hembra del amarillito llegó mientras me hallaba todavía cerca de su nido, y huyó bien pronto, para volver á poco acompañada del macho. Los dos gorjeaban con energía, cual si hablaran animadamente ó se consultasen acerca de lo que acababa de suceder.»

El huevo del molobro de los ganados es mas pequeño de lo que debiera esperarse, atendida la talla del pájaro; tiene 0",025 de largo por 0",016 de grueso. Su color varia poco; es

de un gris azul pálido, sembrado de manchas y pequeñas rayas pardas, sobre todo en el extremo grueso. Segun Audubon, el molobro solo pone un huevo en el mismo nido.

Al cabo de quince dias sale el polluelo, y entonces, tanto los padres adoptivos como aquel, se conducen del mismo modo que ya hemos indicado al hablar del cucillo.

Wilson refiere el hecho siguiente: «En junio cogí en un nido un pequeño molobro de los ganados; lo llevé á casa, y lo puse en la misma jaula con un tangara. Este miró algun tiempo con curiosidad al recién venido, que acosado por el hambre, gritaba con fuerza; y adoptándole al momento, dióle de comer y le cuidó cariñosamente con el mayor celo. Si era demasiado grande el pedazo que llevaba á su protegido, rompíale, lo trituraba un poco para remojarle y le introducía en el pico los fragmentos uno á uno. A menudo le examinaba cuidadosamente por todas partes, y limpiábale las plumas en ciertos sitios en donde se habian ensuciado; despues le

llamaba para comer, y hacia todo lo posible á fin de que pudiera prescindir de sus cuidados. En el momento de escribir estas líneas el molobro ha cumplido seis meses; tiene todas sus plumas, y parece estar agradecido á las atenciones del tangara, pues repite con frecuencia su canto. No tiene nada de agradable, pero es muy particular: el pájaro tiende las alas, infla el cuerpo como una bola, levanta las plumas como el pavo, y cual si hiciese un gran esfuerzo, lanza algunas notas sonoras y profundas. Luego se pasea con mucha gravedad por delante del tangara, que parece escucharle con atencion; pero como excelente cantor que es, no puede encontrar en aquellos sonidos guturales mas encanto que el amor y el reconocimiento que parecen expresar.»

LOS ICTERINOS—ICTERINUS

CARACTÉRES.—El segundo grupo de la familia de los




Fig. 10.—EL MOLOBRO DE LOS GANADOS

ictéridos se diferencia del de los agelayos, en que los pájaros que le forman tienen mayor talla, pico largo, estrecho, muy puntiagudo y con arista recta; alas de un largo regular; cola prolongada; patas robustas; dedos bastante fuertes; uñas sumamente corvas, y plumaje blando, de color amarillo por lo general. Los dos sexos tienen casi el mismo plumaje, si bien en los pequeños no está bien marcado.

DISTRIBUCION GEOGRÁFICA.—La mayor parte de los icterinos habitan la América del sur; solo algunos la del norte.

USOS, COSTUMBRES Y RÉGIMEN.—Viven por reducidas bandadas en los bosques y en las breñas; prestan animacion á las localidades que habitan, y su canto resuena en el bosque, halagando el oido del cazador. Aliméntanse comunmente de frutos é insectos: sus nidos, artísticamente contruidos, aparecen pendientes en un mismo árbol, y con frecuencia en gran número.

CAUTIVIDAD.—Casi todos estos pájaros son muy buscados para conservarlos en habitacion; se recomiendan por su hermoso plumaje, su viveza y armonioso canto.

LOS TRUPIALES—ICTERUS

CARACTÉRES.—Las especies de este género, rico en especies, se distinguen por su pico delgado, de punta fina, redondeado en la arista, que se inserta en el plumaje de la frente como el de la chocha, caracterizándose además por el ángulo alto en la parte inferior de la boca; los tarsos son bastante robustos; los dedos largos; las uñas altas y muy corvas; la segunda rémige forma la punta de las alas, que son

bastante largas, así como la cola, que es redondeada y escalonada lateralmente; en el plumaje predomina el color amarillo.

EL TRUPIAL DE BALTIMORE—ICTERUS BALTIMORE

CARACTERES.—Esta especie, tipo del género, es la mas conocida de la sub familia. La cabeza, el cuello, la barba, la garganta, el manto, los hombros, las alas y las dos rectrices del centro son de un negro oscuro; las tectrices superiores de las alas, las de la cola y el resto de las regiones inferiores de un color de naranja rojizo; las rémiges presentan bordes anchos; las primarias los tienen estrechos de color blanco en las barbas exteriores; las tectrices de la mano son blancas en la mitad extrema y forman una ancha faja transversal; las rectrices son de color anaranjado, con anchas fajas negras en la base. Los ojos son pardos; el pico de un negro gris de plomo, mas claro en los bordes; y los piés de un gris de plomo. La longitud de esta especie es de 0",20 por 0",30 de ancho de punta á punta de las alas; estas miden 0",09 y la cola 0",08. La hembra tiene las regiones superiores de un gris pardusco aceituna; las plumas del manto están ornadas de líneas longitudinales mas oscuras; las partes inferiores son de un amarillo anaranjado; las tectrices superiores de la cola de color aceituna; las de las rémiges secundarias y las mayores de las otras tectrices de las alas, blancas en la punta, formando dos fajas transversales en las alas; todas las demás partes son de un color mas opaco ó pálido que en el macho (fig. 11).